

Səyyarə İbadullayeva, Ramiz Ələkbərov

DƏRMAN BİTKİLƏRİ

(Etnobotanika və Fitoterapiya)

Medicinal plants

(Ethnobotany and Phytoterapy)

“Təhsil” EİM

Bakı-2013

Elmi redaktor: İ.M.Hüseynova,
*Biologiya elmləri doktoru, professor,
AMEA müxbir üzvü*

Rəyçilər:

T.H.Talıbov,
*Biologiya elmləri doktoru, professor,
AMEA müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi*

S.V.Sərkərov,
*Kimya elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi*

M.N.Vəliyeva,
Əczaçılıq elmləri doktoru, professor

ÖN SÖZ

Bitkilərin müalicəvi xüsusiyyətləri insanlara qədim zamanlardan məlumdur. "Min dərddə varsa, min bir dərmanı var" deyən ulularımız bitki örtüyündəki minlərlə otlardan, gül-çiçəklərdən, bitki köklərindən, tərəvəz və meyvələrdən istifadə etmiş və öz azar-bezarlarını bitkilərdən hazırladıqları dərmanlarla müalicə etmişlər. Belə təbii dərmanları insanların tanımaları və onlardan istifadə etmələri zamanın sınağından uğurla çıxmış və bugünkü elmi-texniki tərəqqi əsrində də öz əhəmiyyətini itirməyib daha da artırmışdır. Hətta bir vaxt xalq təbabətinə - türkəçarəyə qısqançılıqla yanaşan elmi təbabət də bu gün onun əhəmiyyətini etiraf edir.

Yalnız XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq kimya elminin və yüngül sənayenin sürətlə inkişafı kimyəvi preparatların yüksək dərəcədə istehsalını və tətbiqini genişləndirdi. Nəticədə bəzi xəstəliklər, xüsusilə yoluxucu xəstəliklər keçmişdə kəskin formada keçirdisə, sonralar xroniki formalarda rast gəlinməyə başladı. Bunun da əsas səbəbi xəstəliklər zamanı kimyəvi dərman preparatlarının həddən çox və lüzumsuz yerə tətbiq olunması idi.

Bütün bunlar nəzərə alınaraq son 10 ildə dünyada etnobioloji üsulların effektivliyi öyrənilməyə başlandı. Belə qənaətdə gəlinirdi ki, etnobiologiyanın bir qolu sayılan etnobotanikadan, başqa sözlə, xalq təbabətindən istifadə etmək daha effektiv və ziansızdır.

Hal-hazırda dərman bitkilərindən istifadə o qədər təkmilləşdirilmiş və dərin elmi məlumatlar əsasında aparılır ki, bu da hər bir xəstəliyin tezliklə aradan qaldırılmasına zəmin yaradır. Bu gün dərman bitkilərindən istifadə üsulları çoxcəhətlidir: dərman

bitkilərinin şirələrinin, çiy halda salatların, dəmləmə, bişirmə, məlhəm və s. istifadə olunması, onların bioloji fəal maddələrinin təsirinin birbaşa patoloji proses baş verən nəhiyələrə çatdırılması xəstənin müalicəsi ilə yanaşı, orqanizmin müdafiə durumunun yüksəlməsinə də şərait yaranır. Qeyd etmək lazımdır ki, bitkilərdən hazırlanan dərmanlar heç vaxt fəsad törətmirlər.

Dərman bitkilərindən istifadə olunması, əhalinin bu müalicə üsuluna inamının yaranması ekoloji cəhətdən də az əhəmiyyətli deyil. Belə ki, bitkilərin insan həyatındakı əhəmiyyətini və onun müalicəvi təsirini öz üzərində sınaqdan keçirmiş şəxs, təbiətin bu cür zənginliyinə heç vaxt biganə qalmaz və onu ürəklə qoruyar.

Bu baxımdan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan bu kitab bitki ilə müalicənin üstünlüklərini hamı üçün anlaşılan çox sadə dildə açıb göstərir, xalq təbabətinin tarixən məlum olan təcrübələrini müasir fitoterapiya və bitkilərin kimyəvi tərkibinin açıqlanması ilə bir daha təsdiq edir.

İ.M.Hüseynova

GİRİŞ

Dünya təbabətinin atası sayılan filosof və həkim Əbu Əli İbn-Sina deyirdi: «Həkimin üç silahı vardır: söz, bitki və bıçaq».

Dərman bitkilərinin öyrənilməsi və ondan istifadə olunması ən qədim tarixi dövrlərdən - ibtidai icma dövründən başlamışdır. Hələ ibtidai insan öz həyatını qorumaq və baş verən xəstəlikləri aradan qaldırmaq üçün bitkilərdən geniş istifadə etməyə çalışmışdır. Yazı icad olunana qədər dərman bitkiləri haqqındakı məlumatlar nəsildən-nəsilə şifahi surətdə keçirdi. Bundan sonra isə dərman bitkiləri haqqında külliyyatlar yazılmışdır. Şumrilər üç fənn əsasında (astronomiya, din və riyaziyyat) dərman bitkilərinin təsirlərini də əlavə etməklə tibb elmləri yaradaraq, maraqlı məlumatlar vermişlər. Eramızdan 4 min il əvvəl şumriləri əvəz edən babillər daha sonra isə assoriyalılar şumrilərin tibb və əczaçılıq elmləri sahəsində qazandıqları nailiyyətləri ələ keçirib daha da inkişaf etdirdilər. Bitki tərkibli dərmanlarla müalicə işini nizamlı şəkllə salmaq məqsədilə tibb təcrübəsində ölçü və cəki üsullarını tətbiq edir, yazı sistemini səliqəyə salır və dərman bitkilərinin daha geniş öyrənilməsinə zəmin yaradırdılar. Misirlilərin «Papius-Ebersa» adlı 7 cildədən ibarət tibb külliyyatı dərman bitkilərinin öyrənilməsinə və istifadə olunmasına həsr edilmiş, olduqca dəyərli tarixi bir əsərdir. Bu əsərdə ayrı-ayrı dərman bitkilərinin elmi adları, müxtəlif xəstəliklərdə qəbul edilmə vaxtı və istifadə olunma qaydaları xüsusi səliqə ilə təsvir edilmişdir. Dərman bitkilərinin öyrənilməsi sahəsində qədim Hindistan, Çin, Yunanıstan, Misir, İran və Romanın böyük rolu olmuşdur. Qədim Çin təbabətində insanın bir çox xəstəlikləri və onlara qarşı bitkilərdən istifadə etməklə müalicə qaydaları göstərilmişdir.

Hindistan təbabətinin ən qədim və məşhur külliyyatı «Ayur Veda» (Həyat elmi) eramızdan 2600 il əvvəl yazılmışdır. Bu əsərdə Hindistan həkimi Suşurta Asklipidanın işlərinə qədər olan

bütün tibb və əczaçılıq ədəbiyyatları ümumiləşdirmişdir. Burada ayrı-ayrı dərman bitkilərinin botaniki təsviri, coğrafi yayılmaları, toplanma vaxtı, müxtəlif xəstəliklərə qarşı işlədilməsi qaydaları göstərilmişdir. Dərman bitkilərindən olan rəvənd, darçın, zəncəfil, jen-şen, tiryək bu dövrlərdə artıq dünya bazarına məlum idi.

Dünyanın qədim kitabxanalarında Assuriya çarı Aşşurbanipalın Ninevidəki (b.e.ə. 660 illər) gil lövhələr üzərində dərman bitkiləri haqqında məlumatları mövcuddur. Bu yazılarda dərman bitkilərindən ayrı-ayrı xəstəliklərdə necə istifadə olunması qaydaları göstərilmişdir.

Təəssüf ki, arxeoloji qazıntılar bizim üçün qədim dərman bitkilərini tam şəkildə açıqlaya bilmir. Hindistanda və Çində mezarlıq abidələrinin üzərindəki ilk yazılar bizə bitkilərin müalicə məqsədilə istifadə olunmasından xəbər verir. Bitkilərdən xüsusi istifadə olunması haqqında maraqlı məlumatlara Sankrist, qədim yəhudi, Çin, Yunan, Roma mədəniyyət abidələrində rast gəlinmişdir.

Tibb və əczaçılıq elminin inkişafında qədim Yunanıstanın da böyük rolu olmuşdur. Tibb elmi öz inkişafına Hippokratın (b.e.ə. 460-377 illər) dövründə başlamışdır. O özünün həkimlik fəaliyyətində «Corpus Hippocraticum» külliyyatını yazmış, bu külliyyat dərman bitkiləri və tibb elminin inkişafında mühüm rol oynamış, indiyə qədər də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Görünür ki, bu məlumatların bəziləri Misir tibbindən götürülmüşdür. Hippokrat qədim Yunan tibbində müalicəvi vasitə kimi istifadə olunan 236 bitki göstərmişdir.

İlk tibb ensiklopediyası və ya müalicə ensiklopediyası Avlu Korneliyu Tselsuya (b.e.ə. I əsrin sonu və b.e. I əsrin başlanğıcı) məxsusdur. Bizim eranın I yüzilliyinin yarısında Roma ordusunun həkimi Azii Dioskorid o dövrdə məlum olan və geniş şəkildə istifadə olunan 500 qədər dərman bitkilərinin siyahısını vermişdir. Bu kitab təkcə botaniklər üçün deyil, həm də farmakoloqlar üçün də özünəməxsus klassik mənbə rolunu oynayır.

Yeni dərman bitkilərinin öyrənilməsində məşhur həkim və əcaçı qədim romalı Klavdius Qalenin (b.e.ə. 129 - 201 illər) böyük xidməti olmuşdur. O, dərman formaları texnologiyası elminin banisi kimi tibb sahəsində 200–ə qədər əsər yazmışdır. Bunlardan ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən və tibbdə böyük rol oynayan iki əsəri nəbatat elminə aiddir. K.Qalenin əsərləri dəfələrlə ərəb, fars və qədim yəhudi dillərinə tərcümə olunmuşdur. O, ilk dəfə olaraq bitki xammalından preparatlar, məhlullar və ekstraktların alınmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Hazırda tibbdə bu dərman preparatları «*Qalen preparatları*» adı ilə indiyə qədər də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.

Əl-kimyaçıların hakimiyyəti dövründə tacik xalqının məşhur oğlu həkim və əcaçı Əbu-Əli İbn-Sinanın tibb və əcaçılıq elmləri sahəsində yaratdığı əsərlər bütün dünyada şöhrət qazanmışdır. Tibb məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olan İbn-Sinanın anadan olmasının 1000 illiyini 1980 ildə bütün dünya qeyd etmişdir. Onun 5 cilddən ibarət «Tibb elminin qanunları» külliyyatı dəfələrlə dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunmuş və orta əsrlərdə Ərəb və Avropa alimlərinin stolüstü kitabına çevrilmişdir. İbn-Sina öz kitablarında 900 qədər dərman bitkisi haqqında geniş məlumat vermişdir.

Ərəblər ilk dəfə olaraq əcaçılıq elmini müstəqil şəkə salmış və bu sahədə ixtisas verən məktəblər açmışdır. «Qərabəddin Kəbir» adlı farmokopeya kitabı yazılmış, dərman bitkilərinin istifadə olunması və öyrənilməsinə aid bir sıra nəzəri və əməli işlər görmüşlər. IV əsrdə botanika - latın tərtibatçısı Arileem meydana çıxmışdır.

Qədim çin məktəbinin yetirməsi olan Li-Şi-Çjeniya (1522-1596) «Famokoqnoziyanın əsasları» kitabında çoxsaylı müalicə vasitələrinin xassələri haqqında ətraflı məlumat vermişdir.

Qədim Hindistan həkimləri bir çox xəstəlikləri qanalma və qançıxarma ilə yanaşı, bitki mənşəli dərmanlarla da müalicə etmişlər. Eyni zamanda Hindistanda olan bitkiləri (xüsusən, yeməli) Roma imperiyasına daşımışlar. Bu bitkilərdən bir çoxu -

çibibuxa, ilankölgəsi çoxdan Avropanın tibb praktikasına daxil edilmişdir. Əgər tibbi nöqtəyi nəzərdən baxılsa, dərman bitkiləri haqqında bunu demək olar: «biz bitkilər aləmində yaşayırıq». Bu söz vaxtilə qədim budda tibb sirlərində də səslənmişdir.

IX-X əsrlərdə Dioskoridin, Qalenin və Arileemin nəbatat haqqındakı əsərləri ilk dəfə olaraq Avropa dillərinə (italiyan, fransız, ingilis və alman) tərcümə olunmuşdur. Lakin Avropa nəbatatı haqqındakı orijinal əsərlər bundan çox sonra XV-XVI əsrlərdə meydana gəldi. Buradakı məlumatlar müəyyən dərəcədə yunan və latın nəbatatçılarından götürülmüşdür.

XI əsrdə dərman bitkilərini öyrənmək və onlardan müalicə məqsədilə istifadə etmək işi ilə rus monarxları da məşğul olmuşdur.

XVII əsrin əvvəllərində Moskvada – Kremldə «Аптекарьски приказ» adlı bir müəssisə təşkil olunmuşdur ki, bu müəssisə Rusiyada tibb və əczaçılıq işlərinə rəhbərlik etmişdir. XVIII əsrin əvvəllərində Rusiyada dərman bitkilərini öyrənmək məqsədilə məşhur lekar Messerşmid Sibirə ekspedisiyaya göndərilir.

Dərman bitkilərinin tətbiqi haqqında ən geniş məlumatlara XIX əsrdə alman – misirşünas tədqiqatçı Georgi Ebersson papirusu araşdırarkən nail olmuşdur. Tədqiqatçı «Orqanizmin bütün hissələri üçün dərmanların hazırlanması» kitabını ayrı-ayrı hissələr şəklində bir yerə toplamışdır. Burada bir çox xəstəliklərin müalicəsi üçün qədim misirlilərin istifadə etdiyi çoxsaylı reseptlər vardır. Onlar çox mürəkkəb tərkibli müxtəlif məlhəmlər və miksturalardan ibarətdir. Artıq bu dövrdə Misirdə iyli yağlar, balzamlar, qətranlar geniş yayılmışdır. Bitkilərdən isə əzvey, bağayarpağı, gənəgərçək və s. kimi bitkilərin müalicəvi əhəmiyyəti məlum idi. XIX əsrin sonlarında Sibirin məşhur botaniki P.N.Krıllov Sibir və Altayın yerli dərman bitkiləri haqqında müfəssəl məlumat verən bir külliyyat buraxmışdır. Bu illərdə Rusiyada 180-ə qədər müxtəlif dərman bitkisi tedarük olunurdu.

Azərbaycanda isə hələ 850 il bundan əvvəl Nizami Gəncəvi, sonralar isə Məhəmməd Füzulinin əsərlərində bir çox dərman

bitkilərinin adları və istifadə qaydaları göstərilmişdir. N.Gəncəvinin məşhur «Xəmsə»sində mumiyanın (orqanın zədələnməsində), zəfəranı (üşütmə və qızdırmada), balqabağı (qurd və ishala qarşı), yarpızın (mədə-bağırsaq xəstəliyində) müalicəvi əhəmiyyəti göstərilmişdir. XVI əsrdə yaşayan Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri M.Füzuli «Səhhət və Məraz», «Səhbətül əsmar» əsərlərində geniş tibbi məlumatlar vermişdir. «Səhbətül əsmar» əsərində meyvələrin müalicəvi əhəmiyyətindən, faydalı və zərərli cəhətlərindən bəhs edilir.

Azərbaycan Respublikasında tədqiq olunan dərman bitkiləri botaniklər, fitokimyacılar, farmakoloq və klinistlər tərəfindən kompleks şəkildə öyrənilir, onlardan tibbi məqsədlər üçün istifadə etməyə zəmin yaradılır. Belə bitkilərdən oleandr, dağ turpu, pişikotu, adi zirinc, qatırquyruğu, qaraqınıq, gülümbahar, damotu, səhləb, yemişan, itburnu meyvəsi, qafqaz xanımotu və digər bitkiləri misal göstərmək olar.

Azərbaycan Respublikası Avrasiyanın Qafqaz regionunda ən böyük ölkədir. Cənubi Qafqazda, Avropa və Mərkəzi Asiyanın kəsişməsində olan Xəzər dənizi hövzəsində yerləşir. Sahəsi 86 600 m² olan respublika ərazisinin 11,5% meşələr, 1,6% su hövzələri, 50,0% becərilən torpaqlar, o cümlədən 27,0% otlarlar, 36,9% təsərrüfatlardan ibarətdir.

Azərbaycanın təbiəti özünəməxsus rəngarəngliyi ilə fərqlənir, ərazidə zəngin flora və ahəngdar bitki örtüyü formalaşmışdır. By qədim ölkədə 1100-ə qədər cins, 200-dan çox fəsiləyə aid 5000 – ə qədər ali sporly, çıpaq və örtülü toxumlu - çiçəkli bitki növləri formalaşmışdır ki, o da Qafqaz florasının təqribən 70%-ni təşkil edir. Azərbaycanın flora biomüxtəlifliyində həlledici rol çoxillik otlara mənsubdur (66,4%), 2-ci yerdə birillik efemer və efemeroidlərdir (23,4%), qalanları isə digər bitkilərdir. Eləcə də Azərbaycan florası 435 növ olduqca zəngin ağac və kol bitkiləri ilə də fərqlənir. Bunların 5% -i xüsusi statuslu (370 növ) regional endemik və nadir bitkilərdir. Bu bitkilər xüsusi bitki örtüyü formalaşdırmışdır və ümumi Qafqaz regionunda olan bü-

tün areal tiplərinə rast gəlinir: qədim, meşə, səhra, yarımsəhra, boreal, qafqaz, bozqır, kserofil, adventiv və s.

Azərbaycan florasına dərman, efir yağlı, ümumiyyətlə desək, bioloji fəal maddələrlə zəngin bitkilər xammalı mənbəyi kimi baxmaq olar. Azərbaycanın bitki örtüyündən istifadə etməklə, effektiv tibbi yardım göstərmək üçün, yeni müalicəvi-profilaktik dərman vasitələrinin hazırlanması və istifadəsi günün ən vacib və aktual məsələsidir.

Azərbaycan florasında dərman bitkiləri və onların bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadəsi haqqında ta qədim dövrlərə aid məlumatlar olmasına baxmayaraq, daha geniş məlumatlar XIII-XVIII əsrlərə aiddir. Lakin Azərbaycanda dərman və aromatik bitkilərin müasir anlamda elmi tədqiqi ötən əsrin 20-ci illərindən başlanılmışdır. Ölkəmizdə botanika elminin inkişafında xüsusi xidmətləri olan R.Y.Rzazadə, A.A.Fyodrov, A.A. Qrosşyem, L.İ.Prilipko, İ.İ.Karyagin, İ.Y.Hacıyev, Y.M.İsayev, E.X.Xəlilov, Q.F.Axundov, İ.A.Dəmirov, V.C.Hacıyev, N.M.İsmayılov, F.Y.Qasımov, E.R.Əhmədova, hazırda AMEA Botanika İnstitutunun və Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşlarından S.V.Sərkərov, E.N.Novruzov, Y.B.Kərimov, M.Ə.Qasımov, M.N.Vəliyeva, S.C.İbadullayeva, T.S.Süleymanov, A.N.Ələsgərova, F.A.Rəsulov, A.Ş.Şixiyev, N.P.Mehdiyeva, S.Ə.Zeynalova, S.C.Mustafayeva, L.X.Mustafayeva və başqaları floramızda olan dərman bitkiləri üzrə elmi tədqiqat işləri aparmışlar. Mütəxəssislər uzun illərdən bəri Respublikanın regionlarına mütəmadi ekspedisiya səyahətləri etmiş, toplanılan bitkilərin kimyəvi tərkibi və farmaseptik xüsusiyyətləri öyrənilmiş, bir sıra preparatlar hazırlanmış və dəyərli nəticələr əldə edilmişdir. Floramızdan ilkin inventarizasiya zamanı 800 növ dərman, 850 növ efiryağlı bitkilər toplanaraq təyin edilmişdir.

Hazırda Azərbaycan alimlərinin apardıqları elmi tədqiqatlar nəticəsində ölkədə 178 fəsilə və 740 cinsi təmsil edən 1500-dən artıq dərman (o cümlədən 315 növ alkaloidli, 150 növ kumarinli, 1000 növ efiryağlı) bitkisi aşkar edilmişdir, onların 400-ə qədəri

təbabətdə sınaqdan keçirilmiş, 55 növün sənaye əhəmiyyəti aşkar edilmişdir. 100-dən çox alkaloid, kumarin, aromatik, terpen birləşmələri, seskviterpen laktonları və lekorin, salosodin, efedrin, melliktin, berberin, tauremizin, santonin, seslozid, radiotinin, radiotinol, plümbaqin, şafranol, koçotimol kimi qiymətli dərman maddələrinin yeni mənbələri aşkar edilmişdir. Alınan maddələr və dərman preparatları patentləşdirilmişdir.

Biokimyəvi tədqiqatlar dərman bitkilərində təsiredici maddələrin (alkaloid, kumarin, saponin, efir yağı və s.) toplanmasında olan qarşılıqlı münasibətin, xarici mühit amilləri təsirindən maddələr mübadiləsindən asılı olaraq hansı istiqamətdə dəyişilməsinin aşkar edilməsinə, efir yağlı bitkilərin qarşılıqlı seleksiyasına yönəldilmişdir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində geniş yayılmış, ən qiymətli və hərtərəfli öyrənilən efir yağlı bitkilərdən pişiknanəsi, kəklikotu, mərzə, dağnanəsi, yovşan, birgöz, boymadərən və Kərəvüzkimilər fəsiləsinin nümayəndələrindən – qrammoskiadium, baldırqan, yalançı cırə, cacıq, zirə, cırə, dağ kişnişi və s. (83 növ) növlər hərtərəfli öyrənilmiş və onlardan nəinki qida qatqısı, həm də dərman məqsədilə istifadə edilmənin imkan və yolları aydınlaşdırılmışdır.

Aparılan sisteməlik tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, faydalı bitkilərin 95% Magniofita şöbəsinə aiddir.

Dərman bitkilərindən Respublikada 5 min *t* biyan kökü, 50-60 *t* kitrə (astraqal), 15 *t* zirinc kökü, 27 *t* yemişan meyvəsi və 4 *t* çiçəyi, 400 *t* çaytikanı meyvəsi, 30 *t* andız kökü, 220 *t* baldırqan, 136 *t* dazı otu, 7 *t* murdarça meyvəsi, 6 *t* cökə çiçəyi, 23 *t* boyaqotu, 54 *t* sumax, 15 *t* vəlgə yarpağı, 500 *t* itburnu meyvəsi, 8 *t* somazçiçək, 10 *t* boymadərən və s. digər qiymətli bitkilərin ehtiyatı müəyyən edilmiş, onların areal xəritələri tərtib olunmuşdur.

Bioloji və ekoloji tədqiqatlar nəticəsində 350 növ aromatik bitkinin introduksiya edilməsinin mümkünlüyü aşkar edilmişdir. Bəcərilən bitkilərdən zəfəran, nərgiz, ətirşah, qızılgül, kəkotu və s. efir yağının kimyəvi tərkibi və aromatik xassələri tədqiq edi-

lərək, istehsalata tövsiyyə olunmuşdur. Ölkəmizdə Qızılgülün məhsuldar növləri (Qazanlıq, Qırmızı, Krım, Raduqa) Botanika İnstitutunun Zaqatala efiryağlı bitkiçilik təsərrüfatında vaxılə 10 hektarlarla əkilmiş, onlardan qiymətli efir yağı alınaraq, xeyli iqtisadi səmərə əldə olunmuşdur.

Efir yağları uzun illərdən bəri bir çox məqsədlərlə qədim insanlar tərəfindən istifadə olunan, xüsusilə dünyada elmi və ticari olaraq bir çox istehsal müəssisələrində işlədilən təbii maddələr məcmusudur. Bunlar əsasən kosmetik, dərman, qida sənayesi, aromaterapiya və fitoterapevtik məqsədlər daşıyır. Hələ birinci dünya müharibəsində həkimlər dərman qıtlığı zamanı qonqrenaları, vəremi efir yağları ilə müalicə etmişdirlər. Efir yağları geniş istifadə edildiyi üçün son zamanlar bir çox alimlərin maraq dairəsi olmuş və bu yağların kimyəvi tərkibi tədqiq edilməyə başlanılmış, onların tərkibində olan bioloji fəal maddələr geniş maraq doğurmuşdur.

Bizim aldığımız efir yağları Azərbaycanın ən böyük şirkətlərindən biri olan AZƏRSUN Holdingin elmi araşdırmalar bölümündə maraq doğurmuş, çayların, ət konservlərinin ətiləndirilməsi üçün sınaqdan keçirilmiş, profilaktik məqsədlər üçün spirtli kolonyalar, lasyonlar hazırlanmış (sauna və digər məişət yerlərində antivirus, antibakterial və antiseptik vasitə) və hazırda şirkətin AR-GE (elmi araşdırmalar) bölümü bu təbii vasitələrin istehsalı yönümündə tədqiqatlar aparır. Digər tərəfdən efir yağları güclü antioksidant, antibakterial və antivirus xassələrə malikdir ki, bu da konservləşmədə əvəzedilməz təbii və zişansız bir vasitə hesab olunur. AR-GE bölümündə dərman bitkiləri ilə hazırlanmış müxtəlif çeşidli çaylar və sərinləşdirici içkilər də sınaqdan keçirilmişdir.

AZERSUN bitki mənşəli məhsullarının çeşidləri elmi və praktiki cəhətdən ənənəvi xalq təbabəti təcrübəsinə əsaslanır, ən yeni texnologiyaları, yüksək ixtisaslı kadrların vəhdətini özündə cəmləşdirir. Fitovasitələrin istehsalçılarının əsas məqsədi, beynəlxalq standartlara cavab verə biləcək ekoloji cəhətdən təmiz,

hazırlanmış yüksək keyfiyyətli məhsulları bütün dünya istifadəçilərinə əlverişli şərtlərlə realizə etməkdir.

Günümüzdə dərman bitkilərinin və bu bitkilərə aid efir yağlarının əldə edilib dəyərləndirilməsi həm elmi, həm də iqtisadi cəhətdən olduqca vacibdir. Azərbaycan alimləri tərəfindən əldə edilən nəticələr sübut edir ki, regiona məxsus efiryağlı bitkilərdən alınan efir yağlarının antimikrob, antivirus, antioksidant və antifunqal fəallığı, onlardan dərman preparatları hazırlanması üçün dəyərlidir. Bununla yanaşı efir yağlarının farmakoloji əhəmiyyəti də araşdırılaraq tibb, kosmetik və digər sahələrdə istifadə imkanlarının yararlı ola biləcəyi tərəfimizdən aşkar edilmişdir.

Azərbaycan florasında dərman əhəmiyyətli aşılایıcı xassəli bir çox bitkilərin böyük ehtiyatı vardır ki, bu da onlardan həm dərman kimi, həm də gön-dəri sənayesində istifadə edilməsinə imkan yaradır. Rəvənd, dəvəayağı və s. bitki ekstraktları istehsalata tövsiyyə olunmuş, nar qabığından alınan ekstrakt isə sənayedə istifadə olunur və eyni zamanda bu bitkilərin aşılایıcı xüsusiyyətləri əczaçılıqda tətbiq edilir.

İnsan cəmiyyəti yarandığı vaxtdan yabani floradan istifadə etməyə başlamışdır. Yeyilən yabani bitkilərin böyük əksəriyyətini yabani tərəvəz bitkiləri təşkil edir. Belə ki, dünyada 5000 yeyilən bitki növü yayılmışdır ki, bunun da 78 fəsiləyə mənsub olan 1200 növü tərəvəz bitkiləridir, onlardan 59 fəsilə (861 növ) ikiləpəlilər sinfinə, 19 fəsilə (336 növ) isə birləpəlilər sinfinə aiddir. Bu tərəvəz bitkilərinin 700 növü yabani, 500 növü isə mədəni floradadır. Azərbaycan florasında 600-dən çox yabani qida bitkisi vardır ki, bunun da 300 növü yabani tərəvəzlərdir. Son illərdə təkcə Naxçıvan MR florasından etnobotaniki sorğularla 200-ə qədər tərəvəz bitkisi toplanılmışdır.

Deyilənlərdən aydın olur ki Azərbaycan florası təkcə dərman və aromatik bitkilər kimi deyil, eyni zamanda digər faydalı xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən bitkilərlə də zəngindir.

Lakin ərazilərimizə, yer adlarımıza, musiqimizə və s. əl uzadan ermənilər indi də tez-tez tarixən Azərbaycana məxsus olan bitkilərimizə də şəriq çıxmaq istəyirlər. Nar bitkisi Azərbaycan torpaqlarının relikt bitkisi olmasına rəğmən son zamanlar internet səhifələrində onu da “erməniləşdirməyə” başlamışdılar. Belə məsələlər yolverilməzdir və bunun qarşısının alınması üçün öz floramızı, relikt, endemik bitkilərimizi dünyaya tanıtmmaq biz alimlərin üzərinə düşür.

Dünya ticarətində istifadə edilən bitkilərin 50%-i qida, 25% kosmetik, 25% isə dərman məqsədi daşıyır. Azərbaycan florasında yayılan 5000 bitkinin 1000-ə qədəri ətirli, yəni efiryağlı, bir o qədər də dərman bitkiləri olduğu halda dövlət bundan ixrac məqsədli gəlir əldə edə bilmir. İxrac məqsədilə bu bitkilərdən istifadə edilərsə ölkəmizə xeyli miqdarda gəlir gətirmək olar.

Elmi-mədəni tərəqqinin yalnız intellektual nailiyyətlərinin inkişafından aslı olması, cəmiyyətdə yalnız fikir doğurar. Miflər ərzində ulu əcdadlarımızın yaratdığı yaşayış təpzi və təbii amillərə əsaslanan qanunauyğunluqların nə qədər düzgün olması hamıya bəllidir. Qədim əlyazmalarda öz əksini tapmış Azərbaycan xalqının çoxəsrlik-tibb, fəlsəfə, tarix, filologiya, hüquq, riyaziyyat, astronomiya və s. sahələri əhatə edən elmi-mədəni tarixi sübut edir ki, ölkəmizdə elmi araşdırmalar çox qədim köklərə malikdir. Dünya sivilizasiyasında Azərbaycan alimləri və təbirləri öz dünyəvi baxışları və tədqiqatları ilə dəyərli izlər qoymuşlar. Bütün bunlardan və əhalidən toplanılan etnobioloji fikirlərdən istifadə edilmiş, o cümlədən Azərbaycan alimləri tərəfindən təklif edilən «Sağlam həyat tərzi» konsepsiyasına əsaslanaraq bu kitab hazırlanmışdır.

INNAB – ZIZIPHUS JUJUBA MILL.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvə, yarpaq və gövdəsi. (**Şək.1.**)

Kimyəvi tərkibi: Meyvəsinin tərkibi -şəkərlər (30% qədər), üzvi turşular (0,2-3,0%), aşı maddələri (1,5%), C vitamini (400-800mq%), karotin, rutin və kumarin törəmələrindən (2,35%) ibarətdir. Yarpaqlarında alkaloidlər (0,06%), qlükozidlər, saponinlər, aşı maddələri- pirkatexin qrupu (4,6%), qətranlı maddələr (4,0%), üzvi turşular (alma turşusu 1,13%), C vitamini (59mq% quru maddədə), kverçitrin flavanoidi, hiperozid, rutin və kumarin törəmələri (0,3%) vardır. Köklərində 12-15% aşı maddəsi tapılmışdır.

Xalq təbabətində: təzyiqin normallaşdırılması üçün geniş istifadə edilir. Innabın ununun balla (qarışığı) (1:2) böyrək və sidik kisəsinin ağrısında, stomatitdə, yuxusuzluqda olduqca faydalıdır.

Fitoterapevtik göstəriş: Meyvələrinin dəmləməsi müxtəlif səbəblərdən yaranan öskürəklərdə, hipertoniya, qan dövranının fəallaşdırılmasında, qan damarlarından xolesterinin və duzların təmizlənməsində effektiv müalicəvi təsir göstərir.

ƏRIK – *ARMENIACA VULGARIS* LAM.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvə və toxumları (şək.2).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibi saxaroza (27%), qalaktoza (44%), arabinoza (41% qədər), qlükon turşusu (16% qədər), zülali maddələr (0,6%), kitre və mineral maddələrdən (2,5% qədər) ibarətdir. Bundan başqa bitkidə C vitamini 12-20mq%, P vitamini 20-450mq%, mikroelementlərdən Na-30 mq%, K-305 mq%, Ca-28 mq%, P-26 mq%, Fe-2,1 mq% vardır. Bitkiyə xüsusi rəng verən karotin maddəsi onun tərkibində 0,2-3,2 mq%-dir. Quru ərik meyvələrində (qaysı, kuraqa) 50% şəkər, 1,4-3,4% üzvü turşular, 1,3-2,1% pektin maddəsi, askorbin turşusu -4 mq%, PP vitamini -3 mq%, karotin - 3,5 m%, vitaminlərdən- B₁, B₂, B₁₅; elementlərdən fosfor, kalsium, kalium tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Meyvəsi həzm gücləndirici, hərarətsalıcı, öskürək zamanı bəlgəmgətirici, zəif işlədici kimi tətbiq edilir. Quru meyvələrində ürək aritmiyasını nizama salan çoxlu miqdarda kalium vardır.

Pakistan tədqiqatçılarına görə əriyi çox qəbul etmək insan ömrünü uzadır. Onların son rəyinə görə 100 q əriyin qanyaranmadakı rolu 40 q dəmir və ya 250 q təzə qaraciyərə bərabərdir. Pakistan xalq təbabəti göstərir ki, uşaqların qida rasionunda əriyin olması boy artımına və orqanizmin möhkəmləndirilməsinə kömək edir.

Əks göstəriş: İshal halları.

HEYVA – *CYDONIA OBLONGA* MILL.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvə, toxum və yarpaqları (şək.3).

Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində selik (22,8%), amiqdalın qlikozidi (0,530- 0,505%), aşı maddələri, fitonsidlər, piroqol (5,66%) şəkərlər, zülali maddələr, piyli maddələr, (16,92-20,0%) və s. vardır.

Xalq təbabətində: Ödqovucu və sidikqovucu, qanazlığı, və-rəm xəstəliyində qanhayırma zamanı müvəffəqiyyətlə işlədilir. Heyva yarpaqlarının və meyvənin daxilindəki toxumların dəmləməsi sinəyumşaldıcı dərman çayı kimi geniş istifadə olunur. Onun yarpaqlarından azərbaycanlıların milli yeməklərindən olan “dolma” bişirilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Mədə-bağırsaq, uşaqlarda kolit, soyuqdəymə, zökəm, bronxit xəstəliklərində yumşaldıcı, təmizləyici vasitə kimi işlədilir.

Hazırlanması: Qalen preparatı kimi yarpaqlarının spirtli məhlulu (1:5), ekstrakt (1:1) kimi ürək-damar xəstəliklərində, hipotenziv xüsusiyyətinə görə işlədilir. Yarpağının sulu məhlulu (5:200,0) bronxial astma pristuplarını kəsir.

ZEYTUN – *OLEA EUROPAEA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri (şək.4).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində yağ (50-70%) - olein (80% qədər), linol, palmitin (10%), stearin (5-8%) qliseridləri vardır. Toxumlarının tərkibində 30% qədər piyli yağ vardır.

Xalq təbabətində: Zehnin aydınlaşdırılmasında, qanın şlaklardan və mədə-bağırsağın çöküntülərdən təmislənməsində işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Təmiz rafinad olunmamış zeytun yağı mədə-bağırsaq xəstəliklərində mədə divarına yayılaraq bürüyücü, yumşaldıcı və zəif işlədici kimi istifadə edilir. Yarpaqlardan alınan ekstrakt orqanizmə hipotenziv təsir göstərir. Tərkibi həm də fitonsidlərlə zəngindir.

BADAM – *AMYGDALUS COMMUNIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Toxumları (şək.5).

Kimyəvi tərkibi: Əsasən tərkibində yağ (45-62%) - olein (83% qədər), linol (16%) qliseridləri vardır. Toxumlarının tərkibində selik, saxaroza (2,97%), pentoza (3,1-3,8%), aleyron (20% qədər), xolin, asparagin, B₂ və C vitaminləri, kül elementi (4,9%) və kalsium, kalium, maqnezium fosfatlar vardır. Toxumlarının tərkibi acı amiqdalin qlikozidi (3-4%), benzoy və sianid (C-amiqdalin) turşusundan ibarətdir. Ədəbiyyat mənbələrinə əsasən demək olar ki, yabanı badam qamma şüalanmanın mənbəyidir, tərkibindən bir neçə radioaktiv elementlərin izotopu tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Badam yağı yumşaldıcı və işlədici maddə kimi mədə-bağırsaq xəstəliklərində istifadə edilir. Orqanizmin möhkəmləndirilməsi üçün şirin badamdan halva, müxtəlif çərəzlər və digər yeyinti məhsulları hazırlanır.

Fitoterapevtik göstəriş: Acı badam yağı bronxial astma, difteriya, ağ ciyər, burun-qulaq-boğaz xəstəliklərində və güclü öskürmələrdə tətbiq edilir.

IYDƏ – *ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq və meyvələri (şək.6).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində 40% karbohidrat, selik, zülal, fruktoza, glükoza, polisaxaridlər, aşı maddələri, C vitamini, üzvü turşular və rəngləyici maddələr vardır. Meyvələrinin tərkibində eyni zamanda kalium və fosforlu duzlar vardır. Kök və budaqlarında alkaloidlər tapılmışdır: eleagnin (0,1%), tetrahydroqarmol (0,05%), N-tetrahydroqarmol (0,001%), aşılayıcı və rəngləyici maddələr və qətran.

Fitoterapevtik göstəriş: Ödqovucu, büzücü və iltihabi xəstəliklərdə işlədilir.

Hazırlanması: Birinci gün meyvə və yarpaqların məlhəmini 1 çay qaşığı gündə bir-iki dəfə, ikinci gündən sonra gündə 5 çay qaşığı qəbul etmək olar. Müalicə müddəti 1 aydır.

AĞ TUT – *MORUS ALBA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Tibbi məqsədlərlə yetişmiş meyvələrindən, yarpaqlarından, gövdə və köklərinin qabığından istifadə olunur (şək.7).

Kimyəvi tərkibi: Ağ tutun yarpaqlarında üzvi maddələr, C vitamini, şəkərli maddələr, aşı maddələri və s., meyvələrində şəkər, üzvi turşular, pektin maddələri, C, B₁ vitaminləri, müxtəlif amin turşuları, flavonoidlər, efir yağları (izi), karotin, toxumlarında isə 24-35% piyli yağ vardır.

Xalq təbabətində: Ağ tut yarpaqlarının sulu dəmləməsindən, təzə meyvələrindən və onların qatılaşdırılmış şirələrindən (doşab və ya bəhməz) ürək-damar sisteminin xəstəliklərində, qanazlığında, skarlatinada, məxmərəkdə, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, angina zamanı qarqara kimi işlədilir. Meyvələrinin vannasından revmatizmdə istifadə olunur.

Kökün qabığının sulu dəmləməsindən qurdqovucu kimi, yarpaqlarının sulu dəmləməsindən soyuqdəymələrdə qızdırmasalıcı kimi və epilepsiyada, yarpaq və qabığından hazırlanmış məlhəmdən isə qoturluq xəstəliyində istifadə olunur.

Hazırlanması: Dəmləməsi 1:2

Vannada qatı ekstraktı suya əlavə edilir.

Meyvələr əzilərək oynaqlara yaxma kimi işlədilir. 1 saatdan sonra isti su ilə yumaq lazımdır.

TURŞ ALBALI – *CERASUS AUSTERA* (L.) BORKH.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri. (şək.8).

Kimyəvi tərkibi: Təzə meyvələrinin tərkibində şəkər (8,8-13,7mq%), inozit, pektin maddələri, boyayıcı maddələrdən – kerasianin xlorid, mekazianin, xrizantemin, zülali maddələr (0,8%), yağlar (0,4%), üzvi turşular (1,0-1,21%, alma turşusu), aşı maddələr, karotin (1 q-da 3,-9,4 qamma), B₂ vitamini (150 qamma), C vitamini (15mq%) vardır. Toxumlarının tərkibində amiqdalin qlikozidi vardır ki, distillə zamanı bundan acı badam iyi verən sianid zəhərli maddəsi ayrılır. Gövdəsinində kitrə vardır. Bu maddə soyuq suda pis həll olur.

Xalq təbabətində: Meyvələri sidik yolları, böyrəkdaşı, mədə-bağırsaq xəstəliklərində tətbiq edilir. Sökündən şəkərli diabet, qara ciyər və maddələr mübadiləsi pozğunluğu xəstəliklərini müvəffəqiyyətlə müalicə etmək mümkündür.

Fitoterapevtik göstəriş: Meyvələrindən elmi təbabətdə siroplar və mayeli dərmanlar hazırlanmasında istifadə olunur.

Əks göstəriş: Hipotoniya.

ŞƏRQ KÜKNARI – *PICEA ORIENTALIS* (L) LİNK.

Bitkinin istifadə orqanı: Tumurcuqları və qozaları (şək.9).

Kimyəvi tərkibi: Qozalarında mürəkkəb tərkibli efir yağı, aşı maddələri, pinipikrin, gövdəsində isə askorbin turşusu (0,3%), efir yağı və aşı maddələri, nitrat turşusu (35%), dekstropimar (18% qədər), levopimar (36% qədər) tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Sulu dəmləmələri dəri xəstəliklərində işlədilir. Psixoloji pozuntular zamanı müqəddəs ağac kimi dini inanclarla tətbiq edilir və yüksək effekt verir. Almanlar belə hesab edirdilər ki, küknar budaqlarında insanlara xeyir gətirən, ədalətin qoruyucusu olan “**meşə ruhu**” yaşayır.

Fitoterapevtik göstəriş: Bronxit pnevmoniya, bronxoektaziya, revmatizm, revmatodik artrit, xolesistit, xolangit, pielonefrit və sistit xəstəliklərində təyin edilir. Skipidar küknarın oduncağından alınır ki, antiseptik olmaqla, radikulit, miozit, oynaq xəstəliklərində, bronxoektaziya, bronxit və ağ ciyər vərəmində geniş tətbiq edilir. Küknardan alınan şirə məlhəmlərin tərkibində dəri xəstəliklərində xaricə yaxma kimi istifadə edilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı tumurcuqları 0,5 l qaynar suda dəmləyərək (termosda) gecə yatmadan əvvəl gündə 1 dəfə 20-40 dəqiqə müddətində yavaş-yavaş isti halda içmək lazımdır (gündəlik doza).

Təmizlənmiş skipidar (*Oleum Terebinthinae rectificatum*)

Rp.: Ol. Terebinthinae rectificatum 10 ml

D.S.10-15 damcı isti suya əlavə edilərək içilir.

Əks göstəriş: Qlomerulonefrit, hepatit və hamiləlik.

AĞ SÖYÜD – *SALIX ALBA L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Kökləri (şək.10).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində salisin qlükozidi, qətranlı maddələr, ağır su, 200mq vitamin C və katexin vardır. Köklərində 21% aş maddələri, 5% qədər salisin qlikozidi, salisil turşusu və flavonoidlər tapılmışdır.

Xalq təbabəti: Dəri xəstəliklərində, trofik yaralarda, burun-udlaq xəstəliklərində, eyni zamanda istiliksalıcı, büzücü, ağrıkəsici kimi tətbiq edilir. Bundan başqa dəmləməsi saçın uzanmasında işlədilir. Köklərinin dəmləməsi sınımış sümüklərin bərpa edilməsində olduqca vacibdir.

Fitoterapevtik göstəriş: Tibb elmi bu bitkini geniş şəkildə öyrənməmişdir. Bəzi ölkələrdə asteniya və iştahsızlıqda təyin edilir. Bolqar təbabətində infeksiyon xəstəliklərdə (malyariyada xininlə birlikdə), ishalda, oynaqların revmatik zədələnmələrində və podaqrada işlədilir. Kəskin revmatizmdə, qankəsici və qur-dqovucu kimi də işlədilir. Podaqra, ishal, vərəm, diatez, ensefalit zamanı tonusu yüksəldir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı bitki 2 stəkan qaynanmış suda dəmlənir. Dəmlənmə zəif od üzərində 15-20 dəqiqə ərzində və ya soyuq suda 8 saat ərzində aparılmalıdır. Gündə 3-4 dəfə xaricə vanna şəklində verilir.

1 qram bitki kökünün tozunu gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul etməklə əzələ gərginliyini aradan qaldırmaq olar.

SALLAQ TOZAĞACI - *BETULA PENDULA* ROTH.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçək qrupu, tumurcuq və yarpaqları (şək.11).

Kimyəvi tərkibi: Tumurcuqların tərkibində efir yağı, qətran, aşı maddələri, saponinlər, C vitamini, flavonoidlər vardır. Yarpaqlarının tərkibindən karotin və askorbin turşusu, tozağacı şirəsi – şəkər (pevulez), aşı maddələri, flavonoidlər, saponinlər, efir yağı, betuloretin turşusu alınmışdır.

Xalq təbabətində: Bişmə və dəmləməsindən sidik və ödqovucu kimi, hipo və avitaminozlarda istifadə edilir.

Spirтли dəmləməsindən yaraların müalicəsində, kəskin və xroniki ekzemalarda, revmatizmdə, qoturluqda, leyşmaniozlarda, mədə ağrılarında, mədə xoralarında, ödemlərdə, qurdqovucu kimi (askarida və bizquyruqda) istifadə edilir. Yaz vaxtı təzə şirəsindən revmatizmdə, podaqrada, sinqa xəstəliyində, ödemlər olduqda istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Yaraların müalicəsində işlədilən Vişnevski, qoturluqda işlədilən Velkinson məlhəmlərinin tərkibinə daxildir.

Hazırlanması: Spirтли dəmləməsi -1(90%-li spirt):5 (su) nisbətində.

AĞ TOZAĞACI – *BETULA ALBA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kök, yarpaq, tumurcuq və şirəsi (şək. 12).

Kimyəvi tərkibi: Tozağacının yarpaq və tumurcuqlarında saponin, aşı maddələri, smol, şəkər, vitaminlər, efir yağları, triterpen spirti, inozit, flavonoid və fitonsid tərkibli maddələr vardır.

Xalq təbabətində: Kök, yarpaq və tumurcuqlarından (iyli və acıdır) sidikqovucu və qantəmləyici dərman kimi istifadə edilir. Yarpaqları həm də hərarətlə müşayiət olunan xəstəliklərdə tətbiq edilir. Kök, yarpaq və tumurcuqları eyni zamanda podaqra, revmatizm, dəri səpgiləri, ekzema və yanıqlarda xaricə yaxma kimi tətbiq edilir. Qan patologiyalarında, maddələr mübadiləsi pozğunluğunda, xroniki dispepsiya və meteorizm hallarında tozağacının şirəsindən müvəffəqiyyətə çatdırılaraq istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Tozağacının yarpaq və tumurcuqları ürək və böyrək mənşəli ödemləri orqanizmdən xaric etmək üçün yüksək effektiv sidikqovucudur. Eyni zamanda kəskin və xroniki hepatitlərdə tətbiq edilən zəif ödqovucudur. Yarpaq və tumurcuqlarından hazırlanmış preparatlardan nefrit, pielonefrit, sistit, böyrəkdaşı xəstəliklərini müalicə olunur. Bitkinin şirəsi anemiyada, ümumi halsızlıqda, podaqrada, revmatizmdə, frunkulyozda, iltihabsorucu və yarasagaldıcı kimi tətbiq edilir. Dərinin yanıq və digər iltihabi xəstəliklərində işlədilər. “Vişnevski”, “Vilkison” məlhəmlərinin tərkibi də məhz bu bitkidən alınmış maddələrdən hazırlanmışdır. Tibbdə istifadə edilən aktivləşdirici kömür bitkinin gövdəsindən alınır. Karbolen adı ilə tanınan bu dərman meteorizm, zəhərlənmələr əməliyyatlardan əvvəlki hazırlanmalarında istifadə edilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı cavan yarpaqları 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənir. 1/2 stəkan gündə 3-4 dəfə 20-40 dəqiqə yeməkdən əvvəl qəbul edilməlidir. Termosda 2 çay qaşığı tumurcuq 1 stəkan qaynamış suda həll edilərək, gündə 2-3 dəfə; 2-3 həftə südlə-bitki qarışığı dəmlənərək qəbul edilməlidir. Tozağacı şirəsi ilə qoyunun piyi və ya donuzun salası bərabər miqdarda qarışdırılaraq dəri yaralanmalarında və yanıqlarında yaxma kimi işlədilir.

Əks göstəriş: Tətbiq edilən zaman sidiyin təhlilinə ciddi nəzarət etmək lazımdır.

ADI PALID – *QUERCUS ROBUR L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Cavan bitkinin kök, gövdə və budaqları (şək.13).

Kimyəvi tərkibi: Gövdəsində çoxlu miqdarda aşı maddələri, flavonoidlər, pektadon, pektin, kraxmal (40%), qal turşusu, şəkər, piy, selik və zülali maddələr vardır. Yarpaqlarının tərkibində kvarsetin, kversetrin, aşı maddələri və pentoza tapılmışdır.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində aşı və güclü iltihabsorucu maddələr olduğu üçün kəskin və xroniki enterkolit, uzunmüddətli ishal və müxtəlif tipli qanaxmalarda tətbiq edilir. Bitkinin gövdəsinin bişirilməsi - gingivit, stomatit, ağızda pis dad və qoxunun olması zamanı tətbiq edilir. Həm də yanıqlar, ekzema və tər ifrazını artırmaq üçün gecə vannaları qəbul edilir. Uşaqlığın eroziya və kolidləri zamanı irriqasiya etmək üçün palıd gövdəsindən istifadə edilir.

Hazırlanması: 1 çay qaşığı bitki kökü 0,5 stəkan qaynanmış suda zəif od üzərində 15-20 dəqiqə ərzində dəmlənələrək, gündə 3-4 dəfə 0,5 stəkan yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. 4-5 xörək qaşığı bitki kökü 0,5 litr suda həll edərək, xaricə işlədilir.

D.S. Qarqara üçün - Rp.: Dec. corticis Quercus 20,0 : 200,0

YUNAN QOZU – *JUGLANS REGIA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq və meyvələri (şək.14).

Kimyəvi tərkibi: Yunan qozundan yuqlon adlı dərman alınır ki, bu dəri vərəminin və ekzemanın ağır formalarında, paradontozun müalicəsində tətbiq edilir.

Xalq təbabətində: Mədə-bağırsaq, ishal, raxit, eksudativ diatez, metabolik artrit, şəkərli diabet və yeni törəmələrin əmələ gəlməsində istifadə edilir. Yanıq zamanı xaricə tətbiqi yaraların sürətlə sağaldılmasına kömək edir. Yarpaqlarının qatı məhlulu ilə saç yuduqda tükləri möhkəmləndirir. Oynaq xəstəlikləri və dəri səpkiləri zamanı xaricə tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Qədim Yunan həkimi Hippokrat bu bitkinin yüksək müalicəvi xüsusiyyətlərini qeyd etmişdir. Yarpaqlarının kəskin iyinə görə həşaratların qovulmasında istifadə edilir. Ateroskleroz, bağırsaq, qaraciyər xəstəliklərində, fiziki yorğunluqlarda və əməliyyatdan sonrakı zəifliklərdə istifadəsi məsləhətdir. Maddələr mübadiləsini normallaşdırır, qanda qlükozanın miqdarını azaldır, büzücü və qurdqovucu təsir edir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı bitkini 0,5 litr qaynar suda dəmləyərək (termosda) içmək lazımdır (gündəlik doza).

AT ŞABALIDI – *AESCULUS HIPPOCASTANUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq, çiçək, toxum, kök, gövdə və budaqlar (şək.15).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində qlükozidlər, fraksin, eskulin, tri-terpen saponini, aşı maddələri və yağlar vardır. Yarpaqlarında flavonoidlərdən-kversitrin, izokversitrin, kversetin, rutin, spireozid, aspralqin və karotinoidlər tapılmışdır. At pıtrağının çiçəklərində flavonoidərdən - rutin və digər birləşmələr vardır. Toxumlarında bi- və trioizidlər kversetin və kempferol, essin saponini, atressin, yağlar (6,45%), nişasta (49,5%) və aşı maddələr tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Revmatizmada, qaraciyər xəstəlikləri, venaların varikoz genişlənməsində, hemorroy, tromboflebit, ginekoloji xəstəliklərin müalicəsində tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Arterial hipertenziya, ürək-damar xəstəlikləri, ateroskleroz, tromboz və emboliyanın profilaktika və müalicəsində işlədilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı çiçək 2 hissə spirtdə həll edilərək, 1 çay qaşığı gündə 3-4 dəfə su ilə qarışdırılaraq qəbul edilir.

Preparat - *Quru çiçəklərin spirtə məhlulu* (40 q çiçək 1 litrdə) revmatizmde, artrit ağrılarında kompres kimi işlədilir.

Eskuzan (Aescusan) Vena damarlarının tonuslandırıcı və tromb əleyhinə dərman kimi hemorroy, tromboflebit və baldır venalarının genişlənməsində 10-20 damcı gündə 3 dəfə yeməkdən sonra qəbul edilir. Müalicə zamanı qan laxtalanmasına nəzarət etmək lazımdır.

Esflazid (Aesflazidum). Flebit, hemorroy və tromboflebitin müalicəsində işlənir. 1 tabletkə gündə 1-2 dəfə olmaqla qəbul edilir. Müalicə 2 gün edilir, sonra 3-4 gündən sonra təkrar edilir. Baldır venalarının genişlənməsində müalicə 2 həftədən 2-3 aya qədər, hemorroyda isə 1-4 həftə davam edir. Residiv zamanı müalicə kursu təkrar edilir.

ÜRƏKŞƏKILLI ÇÖKƏ – *TILIA CORDATA* MILL.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçəkləri (çiçəkyanlığı) və yarpaqları (şəkl6).

Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində tiliasin qlükozidi, flavanoidlər, aşı maddələri, saponinlər, selik, vitaminlər və şəkər vardır. Bitkiyə özünəməxsus iy verən tərkibində efir yağlarının, seskviterpen laktonları, alifatik farnezol spirtinin olmasıdır.

Xalq təbabətində: Tərlədici, öskürəkkəsici, ağrıkəsici, mədə spazmlarında, böyrək daşında, sidikqovucu kimi, podaqra və nevrozlarda istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Nevroz, yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı, angina və qrip xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Sidikqovucu, ağrıkəsici və iltihabəleyhinə maddə kimi pielonefrit və sistit, revmatizma, podaqra, mədə və bağırsaq spazmları, böyrəkdaşı və öddəşi sancıları, qadın cinsiyyət orqanlarının iltihabı xəstəliklərinin müalicəsində təyin edilir. Xarici vasitə kimi saç tökülmələrində, ağız və badamcıqların iltihabı xəstəliklərində, aromatik vannaların qəbul edilməsində, mastit, xora, yanıq, hemorroy və oynaq ağrılarında tətbiq edilir. Bitkidən hazırlanmış aktivləşmiş kömür zəhərlənmələrdə, meteorizm (köp) və ishalda işlədilir. Bolqar həkimləri çökənin çiçəklərini tərlədici, temperatur salıcı, bakterisid, sidikqovucu və spazmolotik xüsusiyyətinə görə istifadə edirlər. Alman həkimləri çökənin çiçəyindən tərlədici, qarqara və xaricə vanna kimi istifadə edilməsini məsləhət görürlər. Polşa həkimləri çökənin çiçəyindən tənəffüs yolları, oynaq revmatizmi, angina, nevrалgiya, baş ağrısı və tüklərin bərkidilməsində istifadə edirlər. Çökənin çiçəyindən likyor və konyakların hazırlanmasında istifadə edilir. Bütün türk dünyası ondan rahatlayıcı və sakitləşdirici çay kimi istifadə edir.

Hazırlanması: 2-3 xörək qaşığı bitki çiçəyi 2 stəkan qaynar suda dəmlənərək (termosda), qəbul edilməlidir. Xaricə qəbul etmək üçün 4-5 xörək qaşığı bitki çiçəyi 2 stəkan qaynar suda dəmlənərək müalicə aparılır.

ADI ARDIC – *JUNIPERUS COMMUNIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri və budaqları (şək.17).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində şəkər (40%-ə qədər), qətran (9,5%), efir yağı (2%), rəngləyici maddələr, piyli yağlar, üzvi turşular (alma, qarışqa və sirkə), köklərində aşı maddələri, efir yağları, askorbin turşusu (266 mq%) vardır. Oduncağının tərkibində diterpen spirti tapılmışdır.

Xalq təbabətində və fitoterapevtik göstəriş: Meyvələri tonuslandırıcı, ümumi möhkəmləndirici, iltihabsorucu, öskürəkkəsici, yumşaldıcı və güclü diuretik təsirə malikdir. Asteniya, qanazlığı, frunkulyoz, oynaq xəstəlikləri, dərinin xroniki xəstəlikləri, öddəsi və böyrəkdaşı xəstəlikləri, podaqrada istifadə edilir. Qara ciyər, böyrək və sidikyolu xəstəliklərinin (xroniki nefrit, pielonefrit, sistit, nefrolitiaz, kəskin və xroniki uretrit) və öd xəstəliklərinin müalicəsində geniş işlədilir. Yüksək keyfiyyətli diuretik maddə kimi müxtəlif etiologiyalı ödemlərin müalicəsində istifadə edilir. Müxtəlif oynaq xəstəliklərində meyvə və budaqlarının məhlulunun (200-300 q xammal 1 litr su) vanna şəklində qəbulu, budaqlarından müxtəlif yoluxucu xəstəliklərdə dizinfeksiya məqsədilə istifadə edilir. Efir yağlı olduğundan həzm sistemini qıcıqlandırır, peristaltikanı artırır, bəlgəmi dürləşdirir və diurezi artırır. Antibakterial xüsusiyyəti vardır. Meyvələri keyfiyyətli sidikqovucu, dizinfeksiyaedici olduğundan, böyrək daşı, qaraciyər xəstəliklərində və bəlgəmgətirmə üçün istifadə edilir. Lakin böyrək parenximinin xəstəliklərində (nefrit) qəbulu əks göstərişdir. Revmatizm, oynaq və əzələ xəstəliklərində meyvələri istifadə edilir. Alman və fransız həkimləri mədə, dəri (leysmaniya, qoturluq, dəri səpkiləri) qaraciyər, böyrək xəstəliklərində istifadə edirlər.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı bitki 1 stəkan qaynar suda 6 saat ərzində dəmləyərək (termosda) içilir (gündəlik doza). Gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl $1\frac{1}{3}$ stəkan qəbul etmək məsləhətdir. 100 qram meyvələri 400 ml həlməşik olana qədər dəmlənilməlidir. Gündə 3 dəfə hər dəfə 1 çay qaşığı yeməkdən əvvəl qəbul edilməlidir. Podaqra və revmatizmdə 200 qram quru meyvələri 2 litr suda həll edilərək qəbul edilir.

Rp.: Inf. baccarum Juniperi 10,0 : 200 ml

D.S. 1 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə qəbul etmək.

Əks göstəriş: Böyük dozada uzunmüddət istifadə etmək böyrək parenximasını qıcıqlandırır, hematuriya (sidikdə qan) yaradır. Böyrəklərin parenxima (kəskin nefrit, nefrozonefrit) xəstəliklərində meyvələrinin dərman kimi qəbulu qadağandır.

ŞƏRQ TUYASI – *THUJA OCCIDENTALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Gövdəsi (şək.18).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində efir yağı və aşı maddələri vardır.

Şərq tuyasının kimyəvi tərkibi az öyrənilmişdir.

Xalq təbabətində: Yeni yaranan törəmələrin və şişlərin müalicəsində istifadə edilir. Böyrək, qaraciyər, allergik reaksiyalarda və maddələr mübadiləsi pozğunluğu zamanı işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Metabolik artrit, osteoxondroz, hepatoxolesistit, öddəşi xəstəliyi, sistit, uretrit, xroniki prostatit və prostatın adenomasında təyin edilir. Sidikqovucu olduğundan ödemlərdə və dəyirmi qurdların qovulmasında istifadə edilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı bitkini 200 ml qaynar suda dəmləmək (termosda) lazımdır (gündəlik doza). Gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək olar. Spirtli məhlulu 1: 10 nisbətində hazırlanır. 10-15 damcı gündə 3-4 dəfə xaricə işlədilir.

Əks göstəriş: Az zəhərli olduğundan hamiləlikdə tətbiq etmək olmaz.

ŞƏRQ FISTIĞI – *FAGUS ORIENTALIS* LIPSKY.

Bitkinin istifadə orqanı: Oduncaq və fındıqçaları (şək.19).

Kimyəvi tərkibi: Fısdığın oduncağının quru destilləsindən qətran alınır. Qətranın tərkibində sirkə turşusu və müxtəlif fenollardan təşkil olunmuş kreozit vardır. Qabığı təmizlənmiş fındıqçalarının tərkibində piyli yağ, azotlu maddələr və s. vardır. Fındıqçalar yeməlidir.

Xalq təbabətində: Ağ ciyərin irinli-iltihablı xəstəliklərində, vərəmin ilk stadiyalarında, dərinin müxtəlif xəstəliklərində tətbiq olunur.

Fitoterapevtik göstəriş: Qətranın tərkibindəki kreozit güclü bakteriosid və antiparazitar təsirə malikdir. Ondan həb formasında yuxarı tənəffüs yollarının katarında istifadə edilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı bitkini 100 ml qaynar suda dəmləmək (termosda) lazımdır (gündəlik doza). Gündə 2 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək olar.

ÜZÜM – *VITIS VINIFERA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri (şək.20).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində üzüm şəkəri (10-40%), saxaroza (5% qədər), pektin maddələri, üzvi turşular (2,5% qədər)- alma turşusu (60%), çaxır turşusu (40%), oksalat (izləri), salisil turşusu (metil efiri), azotlu maddələr (1% qədər), zülali maddələr, aminlər, amin turşuları, aşı maddələri (5% qədər), qal turşusu, antosian (enin, delfinidin), flavanoidlər (kversetrin), karotin, C (7,-12,5mq%), K və B₁ vitaminləri, fol turşusu, fermentlər (invertaza, enonidaza) və mineral maddələr vardır.

Toxumlarının tərkibində aşı maddələri (1,8-10%), selik, pentozə, piyli yağlar (15-20%) stearin, olein, linol qliseridləri, flo-bafen, lesitin, vanilin, sirkə turşusu, yod və azotlu maddələr vardır.

Yarpaqlarının tərkibində aşı maddələri (5% qədər), şəkər (2% qədər), inozit, kversetin, betain, alma və çaxır turşuları, karotin, C vitamini (103,8-403mq%) vardır.

Köklərinin tərkibində alkaloidlər (0,038%), qlikozid (0,12-18%), kumarin, saponin, aşı maddələri (1,86% qədər), qətran (1,33%), C vitamini (87,7mq%) vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Elmi və xalq təbabətində üzümün meyvələri, meyvələrindən hazırlanmış şirə və çaxır ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsində əvəzsiz dərmandır. Üzüm ürək və damarların tonusunu artırır. Toxumaların oksigenə qarşı tələbatını azaldır. Diurezi artırır, qan təzyiqini yüksəldir və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Təzə meyvələri, həm də kişmiş və-rəm, bronxoektaziya, qaraciyər, öd yolları, xroniki bronxit, laringit, faringit, plevrit, ağciyər – ürək çatışmamazlığı xəstəliklərini müalicə edir. Qanda hemoglobinin və eritrositlərin miqdarını artırır, eritrositlərin osmotik rezistentliyini yüksəldir, eritrositlərin çökmə reaksiyasını aşağı salır. Mədə-bağırsaq xəstəliklərində pəhriz kimi, mədə turşuluğunu azaldır. Babasil və qaraciyər xəstəliklərində faydalıdır. Şirəsi qanazlığında möhkəmləndirici, bronxial astma, vərəm, lipid və duz mübadiləsi, ateros-

kleroz, xroniki nefrit, podaqra, hipertoniyanın ilkin mərhələlərində tətbiq edilir.

Hazırlanması və istifadəsi: Şirəsinin müalicə müddəti 1-1,5 aydır. Üzümlə müalicə zamanı süd, digər meyvələr, alkoqol, kvas və mineral sular qadağan olunmalıdır.

Əks göstəriş: Şəkərli diabet, piylənmə, xora xəstəliyinin kəskinləşmə dövrü, ağciyərin xroniki xəstəlikləri, ürək çatışmamazlıqları, ödem, hipertoniya, bağırsaqların qıcqırma xəstəliklərinin kəskinləşməsində qəbul edilməməlidir.

NAR – *PUNICA GRANATUM L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvə, meyvə qabığı, kökü və gövdəsi (şəkl.21).

Kimyəvi tərkibi: Yabanı narın toxumlarının tərkibində 5-6% limon və digər üzvi turşular vardır. Tibb praktikasında limon turşusunun natrium duzundan donor qanının konservləşdirilməsində istifadə edilir. Meyvə qabığında mədə-bağırsaq traktının bakterial xəstəliklərinə təsir edən aşı maddələri (25%) vardır. Kök və gövdəsində piridin törəmələri (pelleterin, izopelleterin, metilpelleterin, psevdopelleterin, metilizopelleterin), piperedin alkaloidi, aşı və digər maddələr vardır. Bu maddələr əsasən lentşəkilli qurdların qovulmasına çox yaxşı təsir edir.

Xalq təbabətində: Böyrək və mədə ağrılarında, şəkərli diabetdə müvəffəqiyyətlə işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Yabanı nar şirəsinin şəkərlə qarışığı «nar-şərab» kimi iştahasızlıqda, sinqə, babasil, yanq, angina, ishal, həra-rətsalıcı və qurd əleyhinə vasitə kimi geniş şəkildə işlədilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı meyvə qabığını 1 stəkan suda həll edərək, gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Meyvə qabığının çay kimi dəmləməsi ishalda olduqca faydalıdır.

LIMON – *CITRUS LIMON* BURM.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvə, meyvə qabığı və yarpaqları (şək.22).

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarında efir yağı (0,24%), P və C vitamini (55-884mq%) vardır. Meyvələrində limon turşusu (6-8%), şəkər (2,06-3,78%), qlükoza (0,8%), fruktoza (0,61%), saxaroza (0,74%), B₁, B₂ və C vitamini (55-83mq%) vardır. Meyvə qabığında flavanoidlər (0,3%), diosmin, hesperidin, 7-ramnozid, eriodiktiol (P vitaminin analoqu), kumarin törəmələri: limettin, aurapten, biakanqelisın, berqamottin, efir yağı (0,4-0,5%), d limonen (90% qədər), heranilol spirti və onun aldehidi vardır. Limon şirəsinin əsas hissəsi limon turşusu, C və P vitaminlərindən ibarətdir.

Xalq təbabətində: Malyariya, sinqa, müxtəlif səbəblərdən yaranan yüksək hərarətdə, avitaminozda və qusmada, eyni zamanda qaraciyər xəstəliklərində işlədilir. Böyrək və öddəşi xəstəliklərində, şəkərli diabetdə, qanın təmizlənməsində, sidikqovucu, sarılıq, hipertoniya və hamiləlik zamanı yaranan ürəkbulanmalarda işlədilir.

İtifadəsi: İldə 150-200 limondan istifadə edilə bilər.

MORUQ – *RUBUS IDAEUS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq və meyvələri (şək.23).

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində limon, kapron, qarışqa, alma, askorbin (45mq%) turşuları, az miqdarda vitamin (B qrup), saxaroza, fruktoza, sianid-xlorid, benzaldehyd və aşı maddələri vardır.

Xalq təbabətində: Təzə meyvələri alkoqol zəhərlənmələrdə, hipermenorreyada, hemorroyda və dəri səpkilərində istifadə edilir. Yarpaqlarının dəmləməsi ağız və boğaz xəstəliklərində qarqara, dərinin qızartı və səpkilərində, konyuktivitdə olduqca səmərəlidir. Meyvələri tərlədici və istiliksalıcı kimi, yarpaqları isə büzücü dərman kimi ishal və qanaxmalarda tətbiq edilir. Yarpaqlarının dəmləmə və bişirməsi öskürək və angina yumşaldıcı kimi, yarpaqlarının və çiçəklərinin dəmləməsi isə babasil və qadın xəstəliklərində istifadə edilir. Moruğun təzə yarpaqlarından dəri sızanaq və səpkilərində məlhəm hazırlanır. Çiçəklərinin dəmləməsi sızanaq, qızılyel iltihabında və konyuktivitdə tətbiq edilir. Moruğun çiçək, meyvə və yarpaqlarından antisklerotik, iltihabsalıcı, temperaturasalıcı və bol vitaminli maddə kimi hipertoniya və ateroskleroz xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Moruq yaxşı tərqovucu olduğundan, bir çox yolxucu xəstəliklərin müalicəsində qəbul edilir. Yarpaq və meyvələrinin tərkibi vitaminlərlə zəngin və ətirli olduğundan qarışıqların tərkibinə daxil edilir. Nevrasteniya və nevrozlarda, ishalda qankəsici maddə kimi, maddələr mübadiləsinin pozğunluğunda, hipertoniya xəstəliyi və aterosklerozda istifadə edilir. Qurudulmuş meyvələrinin tərqovucu xüsusiyyəti vardır. Bolqar həkimləri moruğun yarpaqlarını iltihabsorucu maddə kimi mədəbağırsaq xəstəliklərində, mədə qanaxmasında, diarreyada və tənəffüs orqanları xəstəliklərində istifadə edirlər. Tibet təbabətində yarpaq, meyvə və gövdəsi nevrasteniyada və qızdırmada istifadə edilir. Avstriya həkimləri yarpaq və meyvələrini vitaminli içki

kimi və öskürək əleyhinə istifadə edilməsini məsləhət görürlər. Alman həkimləri yarpaqlarını büzücü maddə kimi ishalda, boğaz xəstəliklərində istifadə edilməsini məsləhət bilirlər.

Hazırlanması: 2-3 xörək qaşığı meyvə və yarpaqları 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək içilir (gündəlik doza). Bu tərkib həm də bitki xaricə tətbiq edilə bilər. 1 xörək qaşığı kökü 2 stəkan suda həll edərək qəbul edilməsi bronxitin müalicəsində yaxşı səmərə verir. Angina və dəri xəstəliklərində 6q bitki kökünü 250 ml suda dəmləməsi qarqara kimi istifadə edilir və yuyulur.

Əks göstəriş: Bitkiyə həssaslıq halları.

BOZUMTUL BÖYÜRTKƏN- *RUBUS CAESIUS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kök, meyvə və cavan budaqları (şək.24).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində qlükoza (3,6 % qədər), fruktoza (3,2 % qədər), saxaroza (0,6 % qədər), askorbin turşusu (1,8mq%), karotin, K vitamini, üzvü turşular (2,2 % qədər), aşı və aromatik maddələr, yarpaqlarının tərkibində isə askorbin turşusu (8 - 272 mq%), toxumlarında alkaloidlər (12,9%) vardır.

Xalq təbabətində: Yarpaq və çiçəklərinin dəmləməsi nevroz, ishal, gastrit, öskürək, qaraciyər, mədə və onikibarmağın xora xəstəliyində istifadə olunur. Köklərinin dəmləməsi isə sidik-qovucu təsirə malikdir. Bolqar xalq təbabətində mədə qanaxmalarında təyin olunur. Fransa xalq təbabətində isə qankəsici dərman kimi XII əsrdən istifadə olunur.

Fitoterapevtik göstəriş: Ibn-Sina yazırdı ki, böyürtkən güclü qankəsici (xüsusən babasil) təsirə malikdir. Lakin müasir fitoterapiyada işlədilmir.

Əks göstəriş: Şəkərli diabetdə istifadəsi məhdudlaşdırılır.

GƏNƏGƏRÇƏK – *RICINUS COMMUNIS L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Toxumları (şək.25).

Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində 40-60% rəngsiz, xoşa gəlməyən iyə və dada malik yağ vardır. Başlıca tərkibi 80-85% qliseridlərdən, stearin, olein, linol, dioksistearin turşularından, lipaza fermentindən, zülali (14-17%) və azotsuz maddələrdən (10-12%) ibarətdir. Zülali maddələrin tərkibindəki zəhərli alkaloidrisin (0,1%) maddəsi vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Gənəgərçək yağı yoğun bağırsağın peristaltikasını artırır. Belə ki, kəskin qəbizlik və zəhərlənmələrdə qəbulundan 5-6 saat sonra işlədici təsir göstərir. Xoşagəlməz dadı olduğundan jelatin kapsullarda qəbul edilir. Dərinin yanıq, yara və xoralarında işlədilir, Vişnevski məlhəminin tərkibinə daxil edilir.

Əks göstəriş: İshal, qusma.

QAFQAZ QUŞARMUDU – *SORBUS CAUCASIGENA* KOM.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri (Şək.26).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibi acı və aşı maddələri, şəkər (qlükoza 2,33-3,76%, fruktoza 3,14-4,28%, saxaroza 0,68-4,3%), efir yağı, parasorbit turşusu, üzvü turşular (alma, limon və çaxır), karotin (18%), C (40-200 mq%) və P vitaminindən ibarətdir.

Xalq təbabətində: Mədə xəstəliklərində tətbiq etmək məqsədəuyğun sayılır.

Fitoterapevtik göstəriş: Təzə meyvələrinin şirəsi və bişirməsi mədə-bağırsaq dizinteriya, şəkərli diabet, babasil, xəstəliklərində, maye ekstraktı isə yumşaldıcı və qanyaradıcı dərman kimi istifadə edilir. Dəmləməsi isə tərəqovucu və iştahartırıcı xüsusiyyətə malikdir. Tərkibində polivitaminlər olduğundan sinqa və avitaminozlarda istifadə edilir.

Hazırlanması: 120q püresinin üzərinə azacıq su əlavə edərək, od üzərində yüngülcə qızdıraraq, bərabər miqdarda şəkər əlavə etmək və 200ml ağ çaxırla qarışdırmaq lazımdır.

1 xörək qaşığı meyvəni 250ml qaynar suda 8-10 dəqiqə qapalı qabda dəmləmək lazımdır. İshal zamanı gündə 2 dəfə hər dəfə 1 fincan qəbul etmək lazımdır.

Əks göstəriş: Qəbizliyə meyillik halları.

ADI QUŞARMUDU – *SORBUS AUCUPARIA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri (şək.27).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində vitaminlər (askorbin turşusu 200 mq%, P vitamini, karotin), spirt (sorbit və idit), üzvü turşular, flavanoidlər (izokversitrin, kversitrin), aşı maddələri, parasorbosid qlükozidi, epikatexin, epiqallokatexin, lakton və digər fizioloji fəal maddələr vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Meyvələri kifayət qədər vitaminlərlə zəngin olduğu üçün asteniya, qanazlığı və avitaminozlarda işlədilir. Qanəkəsicə və maddələr mübadiləsini normallaşdıran xüsusiyyəti də vardır. Arterial hipertenziya, ateroskleroz, podaqra, revmatizm, hemorroy, dismenorreyə xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə işlədilir. Yüngül işlədici və sidikqovucu xüsusiyyətinə görə böyrək, sidikyolu, böyrəkdaşı və hepasid gastritlərdə təyin edilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı quru meyvələri 1,5 stəkan qaynar suda dəmlənərək (termosda), gündə 3 dəfə içilir. Şəkərlə qarışdırılmış (1 kq meyvə 1,5 kq şəkər) meyvəni, 1 xörək qaşığı gündə 3 -5 dəfə içmək lazımdır.

QARAMEYVƏ – *ARONIA MELANOCARPA* (MINCH.)

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri (şək.28).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində 4,6-10,2 % şəkər (qlükoza, fruktoza, saxaroza), aşı maddələri, P vitamini, karotin, askorbin turşusu, flavanoidlər, antosian və yod vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində çoxlu miqdarda P vitamini olduğundan asteniya, qanazlığı və avitaminozlarda təyin edilir. Hipotenziv və orqanizm möhkəmləndirici olduğundan hipertoniya və ateroskleroz xəstəliklərində işlədilir.

Hazırlanması: 2-4 xörək qaşığı quru meyvələri 2 stəkan qaynar suda dəmlənərək (termosda), gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl içilir. Təzə meyvələri (*Fructus Aronia nigra*) 100 q gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Payızda meyvələrin mürəbbəsini (1 kq meyvə, 1,5 kq şəkər) hazırlayaraq il boyu qəbul etmək olar.

Əks göstəriş: Hepasid gastrit, mədə və onikibarmaq bağırsaq xorası və hipotenziya.

ADI YASƏMƏN – *SYRINGA VULGARIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq, çiçək və tumurcuqları (şək. 29).

Kimyəvi tərkibi az öyrənilmişdir. Çiçəklərində efir yağları, siringin fenollikozidi, siringopikrin, farnezol, kök, gövdə və yarpaqlarında isə siringin qlikozidi vardır. Yasəmənin 1 kq yarpaqlarında 126 mq sianid turşusu vardır.

Xalq təbabətində: Yarpaq və çiçəklərindən qızdırma xəstəliklərində tərqovucu və iltihabsorucu kimi işlədilir. Xüsusən grip və malyariyada təyin edilir. Epilepsiya xəstəliyinin müalicəsində çox yaxşı təsir edir. Yasəmənin tumurcuqlarının dəmləməsini qəbul etmək (yazda toplamaq) şəkərli diabetdə olduqca səmərəlidir. Eyni zamanda böyrəklərdən qum və daşların parçalanaraq tökülməsinə kömək edir.

Fitoterapevtik göstəriş: Şəkərli diabet, malyariya, böyrəyin iltihabı (böyrəkdaşı) xəstəlikləri, astma, ishal, bronxit, bronxial astma, pnevmoniya, yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı xəstəlikləri, ağciyər vərəmi, revmatizm, radikulit, grip, soyuqdəymə, aybaşı pozğunluqları, epilepsiya, xora, irinli yaralar, dəri səpkiləri, mədə yarası, difteriya, təngnəfəslik, nevrалgiya, oturaq sinirin iltihabı, artrit, osteoxondroz, podaqra və oynaqların duzlaşması zamanı istifadə edilir.

Hazırlanması: Şəkərli diabetdə 1 xörək qaşığı yarpaq, çiçək və tumurcuqları 1 litr qaynar suda 20 dəqiqə dəmlənərək, gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 xörək qaşığı qəbul edilir (gündəlik doza). Digər xəstəliklərdə 1 çay qaşığı tumurcuqlarını 0,5 litr qaynanmış suda 20 dəqiqə dəmləyərək, 1/3 stəkan səhər, yeməkdən 15 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir.

Əks göstəriş: Zəhərli bitki olduğundan, dozadan artıq istifadə etmək olmaz.

QARA QARAĞAT – *RİBES NIGRUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq və meyvələri (şək.30).

Kimyəvi tərkibi: Qara qarağatın meyvələrindən çoxlu miqdarda askorbin turşusu (120 mq%), aşı maddələri, üzvi turşular (limon və alma), şəkər (6,2%), vitaminlər (B₂, B₆, D, E, P, K), pektin, qlikozid və mikroelementlər (yod, dəmir, sink, kobalt, mis, manqan, barium) alınmışdır. Yarpaqlarında askorbin turşusu (0,25 %), P vitamini, fitonsidlər və az miqdarda efir yağı vardır.

Xalq təbabətində: Revmatizm, xroniki dəri xəstəliyi, qızılyel, ödəm, difteriya, podaqra, limfa vərəmi, mədə, bağırsaq, qaraciyər və böyrək xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Yarpaq və meyvələri ümumi möhkəmləndirici, sidikqovucu, büzücü, iltihab əleyhinə və tərqovucu kimi istifadə edilir. Vitaminlərlə zəngin olduğundan hipo və avitaminoz, asteniya, qanazlığı və iştahlandırıcı təsir göstərir. Eyni zamanda yarpaq və meyvələri vitaminli bitkilərin siyahısına daxildir. Şirəsini qəbul etmək müalicəvidir.

Hazırlanması: 1-2 xörək qaşığı yarpağı 250ml suda tədricən qızdıraraq dəmləmək lazımdır (gündəlik doza).

Meyvələrindən şəkərlə birlikdə (1 kq meyvə 1,5-2 kq şəkər) mürəbbə hazırlanır.

MEŞƏ GILASI – *PRUNUS PADUS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri və bəzən kökü (şək.31).

Kimyəvi tərkibi: Meşə gilasının çiçək və yarpaqlarında acı badam yağı, askorbin turşusu (200 mq% qədər), meyvələrində üzvi turşular (alma və limon), flavanoidlər, antosian və prulaurazin qlikozidi vardır. Kök, yarpaq, çiçək və toxumlarında amigdalin qlikozidi tapılmışdır. Bu qlikozid parçalandıqda benzaldehid, sianid turşusu və qlükozaya çevrilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Başlıca olaraq büzücü xüsusiyyətinə elmi tibbdə istifadə edilir. İstənilən etiologiyalı ishal xəstəliklərində məhlul şəklində, meyvələrindən təzə hazırlanmış kisel kimi istifadə edilməsi olduqca faydalıdır. Meyvələri eyni zamanda konyuktivitdə, kök, yarpaq, çiçəkləri dəmləmə şəklində tərqovucu və sidikqovucu dərman kimi istifadə edilir.

Hazırlanması: Daxilə 2 xörək qaşığı meyvəsi 0,5 litr qaynar suda 6 saat ərzində dəmlənilərək (termosda) məhlul şəklində qəbul edilir (gündəlik doza).

Təzə meyvələri 0,5 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir.

ÇILPAQ BIYAN – *GLYCYRRHIZA GLABRA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökü və gövdələri (şək.32).

Kimyəvi tərkibi: Şirin dadlı biyan köklərində saponinlər – qlisirrazin (şəkərdən dəfələrlə şirin, 23% qədər), flavanoidlər (4% qədər) (likviratin, likviritigenin, izolikviritin), qlserritin turşusu, askorbin turşusu, steroidlər, efir yağı, şəkər, piqment, kamed, aspargin və selik maddələri vardır. Bitkinin yerüstü hissəsində aşı maddələri, flavanoidlər, efir yağı, şəkər, piqmentləri tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Öskürəklə müşayət olunan soyuqdəymələrdə 0,5 çay qaşığı biyan kökü 1 çay qaşığı bal ilə qarışdırılaraq gündə 3 dəfə qəbul edilir. Mədə yarası və müxtəlif öd xəstəliklərində kökünü gün ərzində 5-7 dəfə çəynəmək lazımdır.

Fitoterapevtik göstəriş: Qlisirrazin və qlisiritin turşusu dezoksikortikosteronun tənzimlənməsində iştirak edir. Bitkinin tərkibində olan flavanoidlər iltihab əleyhinə və spazmolitik, selik, kamed isə işlədici və öskürəkkəsici təsir göstərir. Kökləri güclü bürüyücü, öskürəkkəsici, yumşaldıcı, iltihab əleyhinə, sidikqovucu, desensibilizasiyaedici və spazmolitiktir. Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı, allergik rinit, faringit, difteriya və bronxial astma xəstəliklərində istifadə edilir. Eyni zamanda qəbizliklə müşayət olunan qastrit və mədə xorasında və qida zəhərlənmələrində, uşaq xəstəlikləri praktikasında yüngül işlədici kimi, böyrək və sidik yolları, hətta böyrəkdaşı xəstəliyində təyin edilir. Bundan başqa diatezlərdə, allergik dermatit və ekzemalarda işlədilir. Tərkibində olan qlisirrazin turşusu steroid hormonlarının yaranmasında iştirak edir.

Hazırlanması: 2-çay qaşığı xammal 1,5 stəkan qaynar suda dəmlənərək (termosda) içilir (gündəlik doza). Müalicə müddəti 3-4 həftədir. 1-1,5 aydan sonra müalicə təkrar edilə bilər.

Əks göstəriş: Hamiləlik. İshal yarandıqda ehtiyatla işlətmək lazımdır. Xəşagəlməz təsirləri – uzun müddət qəbulu zamanı orqanizmdə, xüsusən üzdə və oynaqalarda şişkinlik əmələ gətirir. Biyan kökünü uzun müddət orqanizmdən kalium ionunu itirən diuretiklərlə birlikdə işlətmək məsləhət görülmür. Belə bir hal yarandıqda ürək qlikozidlərinin təsiri güclənə bilər. Belə olduqda xəstə kaliumla bol olan qidalar (banan, kişmiş, ərik) qəbul etməlidir.

BEŞYUVALI YEMIŞAN -*CRATAEGUS PENTAGYNA* W. ET KİT.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçəkləri və meyvələri (şək.33).

Kimyəvi tərkibi: Yemişanın meyvə, yarpaq və çiçəklərində üzvi turşular (ursol, olein, kofein), flavonoidlər, qlikozidlər, saponinlər, xolin, aşı maddələri və yağlar vardır. Tərkibi sedativ, kardiotonik, hipotenziv maddələrlə zəngindir.

Xalq təbabətində: Ta qədim zamanlardan ürək xəstələri və qan təzyiqi yüksək olan şəxslər dəmləmə şəklində çiçəklərindən istifadə edir. Meyvələri 10-20 ədəddən çox olmayaraq yeyildikdə təzyiqlə bağlı baş-beyin spazmlarını aradan qaldırır.

Fitoterapevtik göstəriş: Qanda xolesterinin miqdarını aşağı saldığı üçün aterosklerozda müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Yemişan koronar damarlarda qan dövrənini nizamlayır, hipertoniya, stenokardiya, miokarditlərdə, I-II dərəcəli ürək-damar çatmazlığında, klimakterik hallarda işlədilir. Çiçək və meyvələri vena və kapilliyarlarda yaranan spazmanı aradan qaldırır. Zəif sidikqovucu xüsusiyyəti də vardır.

Hazırlanması: Ev şəraitində çiçək və quru meyvələrindən istifadə olunur. Gündəlik doza – 1 xörək qaşığı çiçək və ya 20-25 ədəd meyvə 1,5 stəkan qaynar suda dəmlənilir, gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Təzə meyvələri (15-20 ədəd) adi qaydada yeyilə bilər.

Preparat – Aptekdə yemişan tinkurası satılır: (T-ae Crataegi) 30-50 damcı gündə 3-4 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul edilir. Yemişanın sulu məhlulu: (*Extr. Crataegi fluidi*) 20-30 damcı gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul edilir. Asteniya, ürək nevrozu, angionevroz və nevrogen xarakterli ürək artmiyalarında işlədilir.

Əks göstəriş: Arterial hipotenziya.

QAFQAZ YEMİŞANI – *CRATAEGUS CAUCASICA* C.KOCH.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçək, yarpaq və meyvələri (şək.34).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində flavanoidlər (hiperozid, kversetin, vitexsin), terpenli saponinlər, ursol və olein turşuları, aşı maddələri, oksiakantin, xolin, asetilxolin, antosian, sorbit, şəkərli və zülali maddələr, karotin, C vitamini (200mq%), β sitosterin vardır. Yumşaq meyvələrinin tərkibində çaxırdaşı və limon turşusu, meyvələrinin tərkibində isə yağ və amiqdalin qlikozidi tapılmışdır. Meyvələrinin tərkibi əsasən flavanoid və terpenli saponinlərdən ibarətdir. Çiçəklərinin tərkibində hiperozid və kversetin flavanoidləri, efir yağı (0,15%), xolin, asetilxolin və trimetilamin maddələri vardır. Bitkinin meyvələri polisa-xaridlərlə zəngindir.

Xalq təbabətində: Sulu məhlulu ishal əleyhinə və mədə-bağırsağı qüvvətləndirən dərmandır. Cavan yarpaqlarının dəmləməsi ürək ağrılarındə, meyvələrinin şirəsi isə hərarətsalıcı dərman kimi işlədilir. Ürək nevrozunda özələ möhkəmləndirici vasitə kimi tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Spirtli məhlulu laktosion (qadınlarda süd ifrazının çoxalması) maddədir. Əsasən ürək-damar xəstəliklərində istifadə edilir. Qədim preparat olub, möhkəmləndirici və sağaldıcı təsir vasitəsidir. Degenerasiya etmiş və skelerotik koronar damarları yeniləşdirir, aritmiya və hipertoniyanın sağılmasına kömək edir. Infarktdan sonra koronar damarları normallaşdırır, hüceyrələrin oksigenə olan tələbatını azaldır. Terpenli saponinlər fraksiyaları qanda xolesterinin miqdarını aşağı salır, flavanoidlər isə qan dövranını nizama salır və ürəyin işini normallaşdırır. Farmokoloji təsirinə görə yemişan antiaterogen və kardiotonik dərman kimi tətbiq edilir. Yemişanın çiçək və meyvələri sulu dəmləmə, spirtli məhlul və ekstraktı stenokardiya, səyridici aritmiya, hipertoniya, ürək nevrozu, angina, revmatizm və qrip xəstəliklərində işlədilir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı yarpaq və çiçəkləri 250 ml qaynanmış suda 20 dəqiqə ərzində dəmlənərək gündə 2-3 dəfə, hər dəfə 1 fincan bal və çaytikanı şirəsi ilə qəbul edilməlidir.

Əks göstəriş: Bradikardiya.

ÇAYTIKANI – *HIPPOPHAE RHAMNOIDES* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq, meyvə və toxumları. Meyvələrini şaxta vurduqdan sonra toplamaq daha sərfəlidir (şək.35).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində flavanoidlər, mineral və üzvi maddələr, polivitaminlər, antosian, karotinoid (60 mq%), karotin (10,9mq%), kriptoksantin, fizalein, B₁ (0,035 mq%), B₂ (0,056mq%), C (200-900mq%), E, F, P vitaminləri, fol turşusu (0,79mq%), aşı maddələri (0,12-0,6%), şəkər (2,9-6,8%), qlükoza (1,96%), fruktoza (1,0%), alma və çaxır turşusu (2,94%), toxumlarının tərkibində isə yağ turşuları (olein, stearin, linol və palmitin 8-9%) vardır. Toxumlarının tərkibindən yağ turşusu (12,5mq%), B₁ (28mq%), B₂ (0,38 mq%), E vitaminləri (14,3mq%), karotin (0,3mq%) alınmışdır. Meyvələrinin ətli hissəsində karotin (40-100mq%), karotinoidlər (180-250mq%), E (110-165mq%) və A vitamini vardır.

Yarpaqlarından aşı maddələri (8-10%), C vitamini (230-262mq%), ursol və olein turşuları alınmışdır. Köklərində hippofain alkaloidi (0,3-0,4%) və aşı maddələri (10%) vardır.

Xalq təbabətində: Meyvəsinin ətli hissəsindən alınan çaytikani yağı dərinin yara, travma, ekzema, qurdeşənəyi xəstəliklərində olduqca dəyərlidir. Soyuqdəymələrdə yaranan temperaturalarda meyvələrindən hazırlanmış şirəsindən və püresindən 1 xörək qaşığı gündə 3 dəfə olmaqla qəbul etmək məqsədəuyğundur. Yağı iltihaba qarşı, yarasagaldıcı və ağrıkəsici olmaqla, epitel toxumalarının təzələnməsində iştirak edir. Xüsusilə yanıqların tez sağalmasında effektiv təsir göstərir.

Fitoterapevtik göstəriş: Yarpaqlarında çox vitamin olduğundan sinqa, hipo və avitaminozlarda, dərinin yanıq, donvurma, səpgi və yaranma hallarında işlədilir.

Xərçəng xəstəliyinin (mədə xərçəngi) şüa ilə profilaktika və müalicəsində çaytikani yağından müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Bundan başqa mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, mamalıq praktikasında uşaqlıq boynunun eroziya və kolpitlərində təyin edilir.

ARMUD - *PYRUS COMMUNIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvə və yarpaqları (şək.36).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində 87% su, 0,4% zülal, 11% karbohidrat, 0,3-1,3% üzvü turşular, 5-20mq% C vitamini, az miqdarda B₁, B₂, PP vitaminləri, karotin və çoxlu miqdarda mineral duzlar vardır. Bunlar əsasən natrium (155mq%), kalsium (14 mq%), fosfor (19 mq%), maqnezium (16 mq%) və dəmirdir (2,4 mq%) .

Xalq təbabətində: Mədə-bağırsaq xəstəliklərində büzücü xüsusiyyətinə görə qəbul edilir. Şirəsi və dəmləməsi böyrək, qızdırma və ürək xəstəlikləri zamanı orqanizmdə duz itkisi zamanı qəbul edilir. Qurudulmuş meyvələri yulaflla birlikdə dəmlənərək, uşaqlarda ishal zamanı olduqca faydalıdır. Şəkərli diabetdə pəhriz qidalandırıcı hesab olunur. Təzə meyvələrindən povidlə, cem, mürəbbə və kompotlar, bundan başqa çaxır, sirkə və kvas da hazırlanır.

Fitoterapevtik göstəriş: Vitamin və mineral duz ehtiyatı kimi istifadə edilir. Böyrəkdaşı, böyrək və sidik yollarının irinli (piupiya, pielonefrit) xəstəliklərində çox yaxşı təsir edir.

Əks göstəriş: Qəbizlik halları.

QARA GƏNDƏLAŞ – *SAMBUCUS NIGRA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçəkləri və toxumları (şək.42).

Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərində efir yağları, qlükozid, selik, tanin və xolin vardır. Meyvələrində üzvi turşular və rəngləyici maddələr aşkar edilmişdir. Tərkibində tərlədici, sidikqovucu və iltihabsorucu maddələr də vardır.

Xalq təbabətində: Şəkərli diabetdə, revmatizm, podaqra, yanıq, frunkulyoz və trofik yaralarda tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Soyuqdəymədə və bronxial astmada istifadə edilir. Toxumları ödqovucu olduğundan qaraciyər və ödyolu xəstəliklərində işlədilir. Çiçəklərinin dəmləməsi böyrək, sidikyoğunun iltihabi xəstəliklərində sidikqovucu və spamolitik vasitə kimi tətbiq edilir. Pediatriyada meyvələrinin dəmləmə və kiselindən işlədici dərman kimi istifadə edilir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı çiçəkləri 1,5 stəkan suda 15 dəqiqə dəmlənilir, gündə 5-6 dəfə 2 xörək qaşığı qəbul edilir.

ƏNCİR- *FICUS CARICA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvə və yarpaqları (şək.37).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində 40% şəkər, 0,7q zülal, 0,16q yağ, karotin, C və B qrup vitaminləri, kumarin, mineral duzlar (1000mq%), ürək-damar sistemini nizama salan kalium (220mq%), kalsium (115mq%), maqnezium (263mq%), fosfor (43 mq%), dəmir (0,5 mq%) və üzvü turşular vardır.

Xalq təbabətində: Əncir ürək - qamar sisteminə olduqca müsbət təsir edir. Tərkibində olan bolluca kalium fitinin miqdarını nizamlayır ki, bu da trombozun, dəmir isə anemiyanın qarşısını alır. Meyvələrindən mürəbbə və konservlər hazırlanır.

Fitoterapevtik göstəriş: Böyrəkdaşı xəstəliyində, meteorizmdə, mədə-bağırsaq xəstəliklərində, diabet və podaqrada şəkəri və oksalat turşusunu nizama salır. Elmi təbabətdə meyvə və yarpaqlarından istifadə edilir.

Əks göstəriş: Şəkərli diabet.

ZOĞAL – *CORNUS MAS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvə və yarpaqları (şək.38).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrin tərkibini aşı maddələri (10,0%), kornin qlikozidi, acı və rəngləyici maddələr, şəkərli maddələr (9,21%), qlükoza və fruktoza, pektinli maddələr (5,0% qədər), alma turşusu (2,28%), C vitamini (55 mq%) təşkil edir. Yarpaqlarında (7-17,6%) və gövdəsində (5,84%) aşı maddələri vardır.

Xalq təbabətində: Yarpaqlarının dəmləməsi ishal xəstəliyində işlədilir. Qızdırılmış günəbaxan yağını bal ilə qarışdırıb, üzərinə zoğal meyvəsini (tumsuz) və təzə yumurtanın sarısını əlavə edib, ishal əleyhinə qarşı işlətmək olar. Bundan başqa ishal zamanı zoğalın mürəbbə və ya kiseli (kartof unu ilə) qəbul edilir. Təzə meyvəsindən soyuq suda hazırlanan şirəsi malyariya xəstəliyində olduqca səmərəlidir. Şəkər xəstəliyində meyvə və yarpaqlarının dəmləməsi, həm də şirə, lavaş, mürəbbəsi işlədilir. Eyni zamanda meyvəsindən «zoğal turşusu» hazırlanır. Bişirməsi orqanizmin möhkəmləndirici kimi və frunkulda çox səmərəlidir.

Əks göstəriş: Qəbizlik.

ADI ZIRINC – *BERBERIS VULGARIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökü və yarpaqları (şək.39).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrində askorbin, alma, limon və çaxır turşuları vardır. Eyni zamanda kök və yarpaqlarının tərkibində efir yağları, katexin, alkaloidlərdən berberin, berbamin və aşı maddələri tapılmışdır.

Xalq təbabəti: Köklərindən podagra, revmatizm, böyrək və qaraciyər xəstəliklərindən- sarılıq, böyrəkdaşı, böyrək iltihabı və sidik yolu xəstəliklərində tətbiq edilir. Yüksək qan təzyiqinə qarşı, şəkərli diabet və qadın xəstəliklərində işlədilir. Bolqar xalq təbabətində istiliksalıcı, sedativ və mikrob əleyhinə vasitə kimi istifadə edilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Su-duz mübadiləsində, metabolik aritrlərdə, osteoxondrozda, öddəsi və böyrəkdaşı xəstəliklərində tətbiq edilir. İltihabəleyhinə, ağrıkəsici və ödqovucu xüsusiyyətinin yüksək effektivinə görə qaraciyər və öd xəstəliklərinin, hepatit (A, B, C), xolesistit, xolangit və hətta xolesistoektomik sindromda və xroniki pankreatitdə istifadə olunur. Mamalıq və genekoloji xəstəliklərdə uşaqlıq qanaxmalarında, mədə-bağırsaq qanaxmalarında, xroniki ishal xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir.

Hazırlanması: 1-2 xörək qaşığı zirinc kökü 0,5 litr qaynanmış suda həll edilir. 1/2 stəkan gündə 3 dəfə 20-40 dəqiqə yeməkdən sonra qəbul edilməlidir.

Preparat – Berberin bisulfat tabletkalar 0,005q dozalarda buraxılır. Müalicəvi doza 5-20mq gündə 2-3 dəfə aparılır. Təkrar kursu 5-10 gündən sonra aparmaq olar.

ADI QARAGİLƏ – *VACCINUM MYRTILLUS L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq və meyvələri (şək.40).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində antosian, mirtillin qlikozidləri, definidin, malvidin, aşı maddələri (7-12%), pirokatexin qrupu, üzvü turşular (alma 0,6 - 0,8%, limon 1,0%, kəhraba, xinin, oksalat, süd turşuları 20,0% qədər), şəkər, karotin (0,75-1,6 mq%), B (0,04 mq %), C (6 mq%) vitaminləri vardır. Toxumları 31% yağ və 18% proteindən ibarətdir. Yarpaqlarında arbutin qlikozidi (1,6% qədər), hidroxinon (1% qədər), amorf, mirtillin qlikozidi (1%), flavanoidlər (kversetin qlikozidi, kversetin 3 arabinozid, kversitrin), aşı maddələri (20%), efir yağının izləri, triterpen spirti, olein, ursol, xinin turşuları, C vitamini (250 mq%) vardır.

Xalq təbabətində: Kəskin görmə zəifliyində, mədə və bağırsaq xəstəliklərində, ishal və əksinə xroniki qəbizliklərdə müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Meyvələri hemorroyda məlhəm, təpitmə kimi işlədilir. Yarpaq və meyvələrinin dəmləməsi ağız və boğaz, angina və dəri xəstəliklərində çox səmərəlidir. Ekzemada isti suya salınmış meyvələri tənzifin arasında müvafiq xəstə dəri üzərinə qoyulur.

Fitoterapevtik göstəriş: Yarpaq və meyvələri möhkəmləndirici, duz mübadiləsini normallaşdıran, büzücü, iltihabsorucu, sidikqovucu, ödqovucu, qankəsici və zəif spazmolitik təsirə malik dərman maddəsidir. Dəmləmə və bişirməsindən kəskin və xroniki mədə-bağırsaq xəstəlikləri, gastrit, dizinteriya və büzücü dərmanların hazırlanmasında işlədilir. Meyvələri (təzə və quru) uşaq və yeniyetmələrdə kəskin və xroniki ishal, hipogastritdə, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, enterkolit, spesifik olmayan yaralı kolit, anemiya, sistit, böyrəkdaşı xəstəliyi və psariozun (dərinin ala xəstəliyi) müalicəsində təyin edilir. Qaragilə şəkər xəstəliyinin yüngül formalarında qanda şəkərin miqdarını aşağı salır və onu tənzimləyir.

Hazırlanması : Təzə meyvələri 2-3 stəkan suda həll edilərək (0,5 stəkan gündə 4-5 dəfə yeməkdən əvvəl) qəbul edilir. 3 xörək qaşığı quru meyvələri 1,2 litr soyuq suda saxlandıqdan sonra 10 dəqiqə qaynama temperaturuna qədər qızdıraraq qəbul edilməlidir. Xaricə tətbiq etmək üçün 5-6 xörək qaşığı bitki xammalı 2 stəkan suda həll edilməlidir. 1-2 çay qaşığı yarpaqlarını 250ml qaynanmış suda 10 dəqiqə dəmlədikdən sonra gündə 2-3 dəfə çay kimi hər dəfə 1 fincan qəbul etmək və ya psariozuda (dərinin ala xəstəliyi) kompress qoymaq lazımdır.

MƏRCANGİLƏ – *VACCINUM VITIS IDAEA L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq və meyvələri (şək.41).

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində arbutin qlükozidi, turşulardan -xinna, ursol, çaxırdaşı, askorbin, hiperozid flavonoidi, aşı maddələri vardır. Meyvələrinin tərkibindən vitaminlər (askorbin turşusu), üzvi turşu, şəkərlər, qlükozidlər (arbutin və vaksinin) tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Yarpaqlarının dəmləməsi gecə yuxuda sidiyi saxlaya bilmədikdə və eyni zamanda qankəsici maddə kimi işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Şirəsi zəif sedativ təsirə malik maddə olduğundan arterial hipotenziv, sidikqovucu, hərarətsalıcı və bağırsaqların peristatikasını artırıcı kimi işlədilir.

Təzə meyvələri - sidikqovucu vasitə kimi, podaqra və revmatizm, duz mübadiləsi pozğunluğu, öddəsi və böyrəkdaşı xəstəliklərində, aterosklerozun müalicəsində istifadə edilir.

Yarpaqları əsasən böyrək və sidikyolu xəstəliklərində işlədilir, sidikdə turşuluğun artmasına kömək edir. Şəkərli diabet, osteoxondroz, podaqra, revmatizm, böyrəkdaşı xəstəliyi, ishal və qastritdə turşuluq azlığında tətbiq edilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı meyvələri 1,5 stəkan suda tədricən qaynadılır, gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Termosda da dəmlənə bilər.

Sidiyin saxlana bilməməsi zamanı mərcangilə yarpaqlarının üzərinə 2 hissə daziotu yarpaqları əlavə edərək, 3 stəkan suda 10 dəqiqə müddətində dəmləmək və gün ərzində axşam yuxusuna qədər 3 stəkan 4 saatdan bir olmaqla qəbul etmək müalicəvi təsir vasitəsidir.

AĞACŞƏKILLI ALOE (YÜZILLIK, ƏZVAY) – ALOE ARBORESCENS MILL.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpağı. Əzvayın təzə dərilmiş yarpaqlarından hazırlanmış şirə “sabur” adlanır (Şək.43).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində qlikozidlər, aqlikon, qətran, efir yağları, fermentlər və vitaminlər vardır.

Xalq təbabəti: Nevrozda, etiologiyası məlum olmayan baş ağrılarında istifadə edilir. Sokunun bal və çaxırla qarışığı xroniki bronxit, pnevmoniya, patoloji klimaksda, amonoreyada, iltihabı xəstəliklərdə və ağciyər vərəmində işlədilir. Şirə kimi qəbulundan 8-10 saat sonra bağırsaqları yumşaldır və zəif işlədici təsir göstərir.

Fitoterapevtik göstəriş: Aloe bitkisi geniş şəkildə göz (miopatiya, blefarit, konyuktivit, keratit, irit) və burun-boğaz xəstəliklərində, yanıqlarda, infiltrativ yaralarda, dərinin infeksiya, şüa və qurdeşənəyi xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Çox geniş şəkildə mədə-bağırsaq xəstəliklərində (xroniki qastrit, kolit, onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, spazmda), qəbizlikdə müvəffəqiyyətli tətbiq edilir.

Hazırlanması və istifadəsi: Bitkinin şirəsi, bal və çaxırla (kaqor) birlikdə (200q şirə, 300q bal, 350q çaxır) hazırlanır. Qarışıq 5-7 gün otaq temperaturunda qaranlıq yerdə saxlanılır. Sonra 1-2 çay qaşığı gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursunun müddəti 3-4 həftədir.

Preparat – tibb praktikasında məhlul, şirə və sirop şəklində işlədilir. Məhlul aloe (sabur) – 10-20 damcı gündə 3 dəfə, şirə şəklində 1 çay qaşığı gündə 2-3 dəfə yeməkdən əvvəl; aloe şirəsi dəmirli ekstraksiya olunaraq gündə 2-3 dəfə 30 damcı; quru ekstrakt şəklində 1tabletka gündə 2 dəfə qəbul edilir.

Əks göstəriş: Qara ciyər, öd, böyrək və sidik yolları xəstəlikləri, ishal, qanaxma, hamiləlik və ağır ürək-damar xəstəlikləri olanlara istifadəsi məhduddur.

İŞLƏDİCİ MURDARÇA – *RHAMNUS CATHARTICA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin meyvələri (şək.44).

Kimyəvi tərkibi: Təkimində selik, üzvi turşular, şəkərlər, flavonoidlər, qlikozidlər, pektin maddələri, kitrə vardır. Kökündə ramnikozid, xrizofan turşusu, çoxlu aşı maddələri, yarpaqlarından 31% askorbin turşusu tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Ödem, podaqra, dəri səpgilərində tətbiq edilir. Meyvələri şiş əleyhinə dərman kimi bir sıra ölkələrin xalq təbabətində işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Murdarça yaxşı işlədicidir. Yoğun bağırsağın peristaltikasını artırır və qida qəbulundan 10-14 saat sonra stul yaranır. Məhlulu, dəmləməsi və təzə meyvələri spastik və atonik qəbizliklərdə, hemorroy, düz bağırsağın bayıra çıxmasında işlədilir. Sidikqovucu təsiri də vardır. Dəmləməsi və quru halda yüngül işlədici dərman kimi atonik və spastik qəbizliklərdə 8-10 saata təsir göstərir. Babasil və anus çatlarında işlədilməsi daha faydalıdır. Bu zaman 1 xörək qaşığı meyvəsi (15-20 ədəd) 10-15 dəqiqə 1 stəkan suda qaynadılıraq, axşamlar yarım stəkan qəbul edilir. Tibb praktikasında «*ramnil*» adı ilə işlədilir.

Hazırlanması: Məhlulunu hazırlamaq üçün 1 xörək qaşığı bitki 1 stəkan qaynanmış suda 2 saat ərzində dəmlənilir. Gecə 0,5 stəkan qəbul edilməlidir.

Ramnil (Rhamnilum) murdarçanın standart tabletkasıdır. Gecələr 1-2 tabletka qəbul edilməlidir.

Əks göstəriş: İshal və buna meyillik.

MEŞƏ ÇİYƏLƏYİ – *FRAGARIA VESCA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq və meyvələri (şək.45).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində aşı maddələri (0,2-0,4%), antosian, efir yağının izləri, şəkər (qlükoza-2,79%, fruktoza-3,29%, saxaroza-0,41%), pentoza (0,87-0,91%), pektin maddələri (0,68-1,5%) piyli yağ (0,53%), üzvi turşular (1,42%, alma, limon, xinin, salisil), karotin (0,3-0,5mq%), B₁, C, (54 mq%) vitaminləri vardır. Təzə yarpaqlarında aşı maddələri, C (250-280mq%) vitamini, kök və kökümsovlarında aromatik, mineral (kalium, fosfor, kalsium, dəmir, maqnezium) və aşı maddələri, nişasta və qətran, provitamin A, toxumlarında yağlar (16-19%) və yod (192 mq%) vardır.

Xalq təbabətində: Ödqovucu və sidikqovucu xüsusiyyətinə görə müxtəlif bitkilərlə qarışığından qaraciyər, böyrək və dalaq (splenit) xəstəliklərində istifadə edilir. Kompres və qarqara formasında qanayan yara, ağızda olan iltihabi xəstəliklər zamanı xaricə tətbiq edilir. Yarpaqlarının tərkibində vitamin olduğu üçün çay kimi qəbul edilir. Təzə meyvələrinin şirəsi, yarpağının dəmləməsi, ətli meyvələri kosmetik vasitə kimi piqmentin və dərinin yeniləşdirilməsində maska kimi işlədilir. Bu prosedurdan sonra yağlı krem sürtmək məsləhətdir.

Fitoterapevtik göstəriş: Yarpaq və meyvələri maddələr mübadiləsini normallaşdırır, böyrəkdaşı və öddəsi xəstəliyində, podaqra, ekzema, arterial hipertenziya, ateroskleroz və bronxial astma xəstəliklərində istifadə edilir. Sinir xəstəliklərində, digər bitkilərlə qarışıq halında nevroz, isteriya, halsızlıq, kardionevroz, stenokardiya, qanazlığı, sinqa və avitaminozlarda işlədilir. Meyvə və yarpaqlarından gastritlərdə iştahartırıcı vasitə kimi, enterkolit, ishal və qəbizliklərdə tətbiq edilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı bitki yarpağı 2 stəkan qaynanmış suda dəmlənilir. Giləmeyvələri çiymə və bişmiş halda yeyildikdə belə müalicəvi təsir göstərir. 2 xörək qaşığı meyvə və ya yarpaqlarını 1 stəkan

suda həll edərək, gündə 3 dəfə ciddi dietada (qanazlığı, vərəm, avitaminoz) qəbul etmək lazımdır. Meyvələrinin çay kimi dəmləməsi şəkərli diabetdə olduqca faydalıdır.

Əks göstəriş: Hamiləlik, allergik reaksiyalar.

ADI BAŞINAĞACI – *VIBURNUM OPULUS L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq, çiçək, meyvə və kökləri (Şək.46).

Kimyəvi tərkibi: Kökündə kalın, qlükozidlər və viburnin, eyni zamanda üzvi turşulardan - sirkə, linolin, izovalerian, valerian, qarışqa, kapril, palmitin, askorbin və s., K vitamini, acı maddələr, qətran, aşı maddələri tapılmışdır. Meyvələrində çoxlu pektin maddələri, şəkər (32%), aşı maddələri və vitaminlər vardır.

Xalq təbabətində: Meyvələri qanda şəkərin miqdarını aşağı salır, mürəbbəsi isə öskürək, angina, ishal, sarılıq və diatezlərdə tətbiq edilir. Kökü güclü qankəsici təsirə malik olduğundan spirtli ekstraktlar şəklində mamalıqda, uşaqliq qanaxmalarında, isteriya, epilepsiya, nevroz, kardial tipli neyrosirkulyar distoniyalarda işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Kökün tərkibində olan kalın qlükozidi və viburnin uşaqliqın tonusunu artırır, damarbüzücü və qankəsici təsir edir. Meyvələrinin tərkibində keyfiyyətli hərarətsalıcı, tər ifrazını yüksəldici, vitaminli və zəif işlədici maddələr vardır. Meyvələri mədə-bağırsaq xorası, polipi və hiposekresiyasında spazmolotik məqsədlə istifadə edilir.

Hazırlanması: Meyvə şirəsi şəkərlə birlikdə (1kq şirəyə 2kq şəkər əlavə edilir) qarışdırılır. 2-3 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə su ilə qəbul edilir. Quru meyvələri 3-4 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış su ilə termosda dəmlənilərək içilir (gündəlik doza).

Rp.: Extr. Viburni fluidi 2 . Gündə 3-4 dəfə 20-30 damcı.

QƏHVƏYİ ITBURNU – *ROSA CINNAMOMEAE* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yalançı meyvələri (Şək.47).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində bolluca vitaminlər, askorbin turşusu, filloxinon, piqment (rubiksantin, likopin), dəmir, kalsium, manqan, maqnezium, fosfor, mikroelementləri, riboflavin, provitamin A, vitamin K, P, E vardır. Bundan başqa, 2,46-5,520% C vitamini, 9,75mq% karotin, 14,1% pektin maddələri, 1,58% limon turşusu, 23,97% ümumi şəkər, 18,56% invert şəkər, 5,09% saxaroza, 8,92% pentoza vardır. Kök və yarpaqlarında aşı maddələri (80% qədər), toxumunda vanilin tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Kökünün dəmləməsi orqanizmdən bütün daş və duzları təmizləyir, malyariya plazmodiumlarının zəiflədilərək məhv edilməsində tətbiq edilir. Meyvə və toxumları lentşəkilli qurdların, sidik yolunda olan daşların qovulmasında, sidikqovucu, revmatizm və podaqra əleyhinə qiymətli dərmandır.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində olan bolluca C vitamini antitelin yaranmasını stimullaşdırır və orqanizmin infeksiyaya qarşı müdafiə qabiliyyətini gücləndirir, yaraların sağalmasını sürətləndirir. Əsasən sedativ, antimikrob, büzücü, iltihabəleyhinə, qankəsici, sidikqovucu və mədə-bağırsaq xəstəliklərində işlədilir. Nevroz, asteniya, qanazlığı, mübadilə, hipertoniya xəstəliyi və ateroskleroz xəstəliklərinin müalicəsində təyin edilir. Yaranma və sınıqlarda, yoluxucu xəstəliklərdə orqanizmin müqavimətini artırır. İstənilən qarışıqların tərkibinə daxil edilə bilər.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı meyvəsini 2 stəkan qaynanmış suda 25 dəqiqə ərzində dəmləmək (termosda dəmləmək daha yaxşıdır) və gündə 3 dəfə, yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır. Itburnu meyvəsi (toxumlarla birlikdə) 2 çay qaşığı

250ml soyuq suda qaynayana qədər qızdıraraq 5-10 dəqiqə gözləmək lazımdır. İsti halda 1 çay qaşığı bal və ya limon soku ilə gündə 2-3 dəfə qəbul etmək olar. 2 xörək qaşığı narın doğranmış kökünü 200 qram qaynanmış suda 15 dəqiqə dəmləmək və günəşli 3 dəfə hər dəfə 1 ştəkan qəbul etmək lazımdır.

QIZILGÜL – *ROSA DAMASCENA* MILL.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçəkləri səhər və axşam tam çiçəkləyən zaman toplanılır (şək.48).

Kimyəvi tərkibi: Xüsusi aromat iyli, tərkibində əsasən heranilol (50% qədər), herol, sitronemol və feniletlen spirti (1%) vardır. Ləçəklərinin tərkibində şəkər, kversetin, acı maddə, antosian, efir yağı və üzvi turşular toplanılır.

Xalq təbabətində: Qızılgül yağından xaricə iltihabəleyhinə və antiseptik kimi təyin edilir. Bolqar təbabətində yağından bronxial astma xəstəliyində işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Ləçəklərində çoxlu miqdarda vitaminlər, ümumi möhkəmləndirici və tonuslandırıcı maddələr vardır. Əsasən iltihabəleyhinə, yumşaldıcı, qurd əleyhinə, antiseptik, yarasagaldıcı və büzücü təsiri vardır. Xaricə konyuktivit, stomatit və angina xəstəliklərinin müalicəsində qızılgül dəmləməsindən (Aqua Rosae) istifadə edilir.

Hazırlanması: 2-3 xörək qaşığı ləçəkləri 2 ştəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda), gündə 3 dəfə 20-40 dəqiqə yeməkdən əvvəl isti halda içmək lazımdır.

BATAQLIQ MƏRCANI – *OXYCOCCUS* *QUADRIPETALUS* GALİB.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri payızda soyuq düşdükdən sonra və ya erkən yazda yığılmalıdır (şək.49).

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində turşular (xinin, limon, benzoy, olein, ursol), şəkər; C vitamini (22mq % qədər), vaksinin qlükozidi, pektin maddələri və piqmentlər vardır.

Xalq təbabətində: Əsasən böyrək və sidik yolları xəstəliklərində istifadə edilir. Böyrək xəstəliklərində duzsuz dieta tətbiq edilməlidir. Qidaya natrium xloridi əvəz edə biləcək bataqlıq mərcanı bitkisi əlavə edilərsə, duz balansı ödənəcəkdir. Çünki bu bitkinin tərkibində kifayət qədər xörək duzu vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Qızdırma xəstəliklərində keyfiyyətli hərarət salıcı, vitaminli, susuzluğu aradan qaldıran, angina, qrip, revmatizm, malyariya və stenokardiyada istifadə edilir.

Hazırlanması: Meyvələrinə şəkər və ya bal qarışdırılaraq sirop, çirə və turş içkilər hazırlanır.

OVALŞƏKILLI MURDARÇA – *FRANGULA ALNUS* MILL.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökləri (şək.50).

Kimyəvi tərkibi: Kökünün tərkibində triterpen qlükozidləri, antranol, qətran, aşı maddələri, xrizofan turşusu, efir yağları, ant-raxinon (8% qədər) və rəngləyici maddələr vardır.

Xalq təbabətində: İşlədici kimi istifadə edilir. Artıq çəkiddən azad olmaq üçün də tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Səna və rəvənd bitkisi kimi bu bitkinin də tərkibində zəif işlədici maddələr vardır. Qəbul etdikdən 8-12 saat sonra təsir edir. Qəbizlikdə, spastik kolitdə, hemarroyda, düz bağırsaq çatlarında, hamiləlik qəbizliklərində istifadə edilir. İltihabsorucu və tərlədici xüsusiyyəti vardır.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı bitki kökünü, 1 stəkan qaynar suda 10-15 dəqiqə ərzində zəif odda dəmləyərək, 1/2 stəkan gündə 2 dəfə səhər və axşam içmək olar. Ovalşəkilli murdarçanın mayeli ekstraktını (Extr. Frangulae fluidum) gündə 20-40 damcı qəbul etmək lazımdır. Ovalşəkilli murdarçanın quru ekstraktı (Extr. Frangulae siccum) tablet şəklində gecələr 0,2 dozada qəbul edilir.

Əks göstəriş: Hamiləlik.

ADI AYIQUĞAĞI – *ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI* (L.) SPRENG.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaqları (şək.51).

Kimyəvi tərkibi: Ayıqulağının yarpaqlarında 35%-ə qədər aşı maddələri, piroqal qrupu, turşu (qal, ellaqa, qarışqa və ursol), arbutin, metilarbutin, flavanoidlər, hidroxinin, ellaqotanin, rəng-ləyici maddələr, uvaol, hiperozid, kversetin, izokversetin, C vitamini və az miqdarda efir yağları vardır.

Xalq təbabətində: Büzücü xüsusiyyətinə görə ishalda, bundan başqa xolesistit və podaqrada təyin edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Böyrək və sidikyolu xəstəliklərində keyfiyyətli və effektiv sidikqovucu, dizinfeksiyaedici və iltihab-sorucu dərmandır. Kəskin və xroniki pielonefrit, sistit, böyrək vərəmi və uretrit xəstəlikləri zamanı müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Qəbul zamanı sidiyi turşlaşdırır.

Yarpaqlarının dəmləməsi antiseptik, sidikqovucu və büzücü təsirə malikdir. Tərkibində arbutin qlikozidi vardır. Dəmləməsi və ekstraktı dizinfeksiyaedici, sistit, pielit, uretrit və iltihabi proseslərdə sidikqovucu təsir göstərir.

Bolqar həkimləri yarpaqlarının dəmləməsindən sidikqovucu, büzücü təsir vasitəsi kimi istifadə edir. Əsasən podaqrada işlədilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı bitkini 250 ml soyuq suda 12-24 saat dəmləmək (termosda) lazımdır (gündəlik doza). Gündə 2-3 dəfə, hər dəfə 1 fincan qəbul edilməlidir.

Əks göstəriş: Hamiləlik. Gicitanla birlikdə təyini də yolverilməzdir.

QARA QUŞÜZÜMÜ – *SOLANUM NIGRUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Cavan budaqları və meyvələri (şək.52).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində kifayət qədər askorbin turşusu (353,2 mq%), zəhərli glikoalkoloid solanin, yarpaqlarında askorbin turşusu (815 mq%), saponinlər, steroalkoloidlər, qlikozidlər, acı, aşı maddələri, karotin və limon turşusu vardır.

Xalq təbabətində: Bolqar xalq təbabətində qara quşüzümü difteriya, spastik öskürəklərdə və bronxial astmada işlədilir. Təzə yarpaq və meyvələrinin bitki yağları ilə qarışığı irinli yaraların sağaldılmasında tətbiq edilir. Dəmləməsi ağız və böğaz xəstəliklərini müalicə edir.

Fitoterapevtik göstəriş: Elmi təbabətdə tam tətbiq edilməsə də həkimlər tərəfindən - sinir sistemində xolinergik, hipotenziv və yerli ağrıkəsici kimi təyin edilir. Hipertoniya, ateroskelkroz, baş ağrıları, nevroz, epilepsiya, bronxit, astma, revmatizm, assit, ekzema, isteriya, podagra və revmatik ağrılarda, öd və böyrək xəstəliklərində də təyin edilir. Maddələr mübadiləsinin nizamlanmasında olduqca əhəmiyyətlidir.

Hazırlanması: 3 q bitkini 1 stəkan qaynar suda 10-15 dəqiqə aşağı temperaturda dəmləyərək, 1 çay qaşığı gündə 3 dəfə içmək lazımdır (gündəlik doza). Islatma şəklinə istifadə etdikdə 4 xörək qaşığı bitkini 0,5 litr qaynar suda dəmləmək lazımdır. Hipertoniya və ateroskeloroz zamanı meyvələrini həkim nəzarəti ilə sutqada 5-6 q qəbul etmək səmərəlidir.

Əks göstəriş: Zəhərli bitkidir. Uşaqlara tətbiq edilə bilməz. Yarpaq və meyvələri az və ehtiyatla işlədilməlidir. Düzgün doza qəbul etmədikdə çətinləşmiş udma, təngənəfəslik, başgicəllənməsi törədir. Xüsusən yetişməmiş meyvələri olduqca zəhərlidir.

ÇIN CİRLIMONU – *SCHISANDRA CHINENSIS* (TURCZ.) BAILL.

Bitkinin istifadə orqanı: Kök, gövdə və meyvəsi (şək.53).

Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində piyli yağ (26,9%), efir yağları (1,6%), sxizandrin (0,12%), sxizandrol, linoleyin qliseridi və olein turşusu vardır. Bioloji fəallığı sxizandrin və sxizandrol maddələrinin təsiri ilə baş verir.

Fitoterapevtik göstəriş: Ürək və tənəffüsü stimula edərək, mərkəzi sinir sistemini tonuslandırır, zehni və fiziki gərginliyi azaldır, impotensiyayı tədricən aradan qaldırır. Periferik və mərkəzi sinir sisteminin fəallığını yüksəldir. Əksər kəskin və xroniki xəstəliklərin - mədə-bağırsağın, tənəffüs sisteminin, böyrək və qan xəstəliklərinin sağlmasına kömək edir.

Hazırlanması: Uzaq Şərqdə yaşayan yerli əhali bitkinin meyvələrini çay kimi dəmləyərək içirlər.

Aptek preparatı – Cirlimon məhlulu – 10-30 damcı gündə 2-3 dəfə yeməkdən əvvəl su ilə qəbul edilir. Şüşə flakonlarda 25-50 ml buraxılır.

Cirlimonu meyvələrinin parosoku – 0,5 q gündə 2 dəfə qəbul edilir.

Cirlimonu meyvələrinin tabletkası - 0,5 q gündə 1-2 dəfə qəbul edilir.

Əks göstəriş: Hipertoniya xəstəliyi

BÖYÜK PITRAQ – *ARCTIUM LAPPA L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Kök, bəzən yarpaq və meyvələri (şək.54).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində polisaxarid inulin (45%), protein (12,3 %), efir yağları (0,17%), stearin və palmitin turşuları, zülal, selik, aş maddələri və qətran, çox miqdarda askorbin turşusu vardır.

Xalq təbabətində: Böyrəkdaşı və öddəsi xəstəliklərində, oynaq xəstəlikləri və osteoxondroz, ödem (istisqa), qəbizliklə müşayət olunan entterkolit, şəkərli diabet xəstəliklərində istifadə edilir. Xoşxassəli və bədxassəli yeni törəmələrdə şiş əleyhinə maddə kimi tətbiq edilir. Oynaq ağrılarında və mastiopatiyada, travmalarda yarpaqlarını əzərək müvafiq nahiyyəyə qoyulur. Ekzema və tüklərin uzanmasında da müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Böyrəkdaşında, diabetdə, podaqra, revmatizm, ödem, babasil, raxit, xənazir, frunkulyoz, xroniki ekzema, qəbizlik, cəvə preparatları ilə zəhərlənmələr, ilan sancması, zöhrəvi xəstəliklər, oynaq ağrılarında müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Bolqar təbibləri sidikqovucu xüsusiyyətinə görə maddələr mübadiləsi pozğunluqlarında, böyrək və sidik yolları daşlarında, qastrit və mədə xorasında məsləhət görürlər. Bundan başqa dermatitdə və dəri qaşınmalarında kompres kimi istifadə edilir. Badam yağı ilə qarışdırıldıqda «ayıpəncəsi yağı» adında tüklərin bərkidilməsində işlədilir. Yaponiyada kulturada «qobo» adı ilə əkilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Kəskin hərarətdə, intoksikasiyalarda, ilın, əqrəb sənemələrində istifadə edilir. Kökünün dəmləməsi və həlimi sidik və tərqovucu xüsusiyyətə malikdir. Podaqra (duz mübadiləsinin pozulması) xəstəliyində olduqca səmərəlidir. Cavan yarpaqları antibakterial aktivliyə malikdir. Köklərindəki maddələr qaraciyərdə qlikogenin miqdarını artırır. Polşa və Alman həkimləri kökünün şirəsindən sidikqovucu və tərqovucu vasitə kimi istifadə edirlər. Eyni zamanda dəri xəstəliklərində və tüklərin bərkidilməsində işlədilir. Avstriya təbibləri ikiillik köklərindən yumşaldıcı və ödqovucu dərman kimi istifadə edirlər. Həlim, ekstrakt, tinktura və parəşək şəklində istifadə etməyi məsləhət görürlər. Çin təbibləri cavan bitkinin yarpaq və toxumlarını ödəmlərdə sidikqovucu kimi istifadə edirlər. Eyni zamanda digər bitkilərlə birlikdə siflisin müalicəsində və ilanvurmalarında geniş şəkildə istifadə edilir. Xaricə ekzema, frunkul, skrofulodermada və cinsiyyət orqanlarının müxtəlif xəstəliklərinin sağaldılmasında tətbiq edilir.

ADI KASNI – *CICHORIUM INTYBUS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökü və çiçəkləri (şək.55).

Kimyəvi tərkibi: Acı maddələr-intibin (0,20%), lavuleza (10-20%), fruktoza (4,5-9,5%), pentoza, inulin (20% qədər) və xolindən ibarətdir.

Xalq təbabətində: Başlıca olaraq «böyrək çayı» kimi işlədilir. Qara ciyər, xolesistit və öd yollarının diskeneziyasının müalicəsində tətbiq edilir. Bu zaman kəsnı solmazçiçək, dazıotu, çoban yastığı, qarğıdalı saçağı ilə birlikdə təyin edilməlidir. Kəsnının kökləri iştahı artırır, dispepsiyalarda, xüsusən mədə ağrıları, qaraciyər, ödqovucu, bağırsaq, böyrək, isteriya, diabet və qanın tərkibinin təmzlənməsində istifadə edilir. Əbu Əli İbn Sina ekzema, dəri səpkiləri, mədə-bağırsaq xəstəlikləri, təngənəfəslik və göz ağrılarındakı istifadə edilməsini, köklərinin dəmləməsi oynaq revmatizmi, podaqra xəstəliklərində və xərcəng, arı, kərtənkələ və ilan sancmalarında olduqca faydalı olduğu haqqında məlumat vermişdir. Bitkinin kökləri spirt alınmasında xammal sayılır.

Fitoterapevtik göstəriş: Maddələr mübadiləsini normallaşdırır. Qanda xolesterin mübadiləsini azaldır, mədəaltı vəzinin işini stimullaşdırır, ödqovucu, iltihab sorucu, desensibilizasiyaedici, büzücü, sedativ və kardiotonik təsir edir. Aterosklerozda, piylənmədə, maddələr mübadiləsi pozğunluğunda, böyrək və öddaşı xəstəliyində, podaqra, osteoxondroz və oynaq xəstəliklərində tətbiq edilir. Mədə-bağırsaq, nevroz, isteriya, asteniya, mədəaltı vəzi və iştahasızlıq zamanı işlədilir. Diabet zamanı tətbiqi qanda şəkərin miqdarını aşağı salır. Dəmləməsi mikrob öleyhinə və büzücü dərmandır. Sinir sistemini sakitləşdirir, ürəyin işini gücləndirir və ürək ritmini seyrəldir. Bolqar təbabətində qaraciyər və sarılıqda istifadə edilir. Ödqovucu kimi öd yollarındakı daş və qumun parçalanaraq tökülməsinə səbəb olur. Avstriya təbabətində sidikqovucu, mədədə həzmi asanlaşdırıcı dərman kimi istifadə edilir. Almaniya təbabətində maddələr mübadiləsi pozğunluqlarında (meteorizm, iştah azalması, kəskin baş ağrıları) işlədilir.

Hazırlanması: 1 çay qaşığı bitkini 250ml qaynanmış soyuq suda qaynanma dərəcəsinə qədər qızdırmaq lazımdır.

Kasni 20q, zəncirotu 20q və nanə 10q qarışdırılır. 2 çay qaşığı qarışığı 250 ml soyuq suda qaynamaya qədər qızdırmaq lazımdır. Gündə 1-2 dəfə hər dəfə 1 fincan qəbul etmək məsləhətdir. Müalicə müddəti 3-6 həftədir.

Xaricə işlətmək üçün: 3-4 xörək qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmləmək lazımdır.

ŞƏRQ KÜNCÜTÜ – *SESAMUM INDICUM* L. (= *S. ORIENTALE* L.)

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri –toxumları (şək.56).

Kimyəvi tərkibi: Küncütün toxumlarında piyli yağ, üzvi maddələr, az miqdarda C və E vitamini, T faktoru, kül elementləri, fenola oxşar maddələr - sezamol, izamin, izamolin və s. vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: T - faktoru qanda trombositlərin miqdarını artırmaqla qanın laxtalanmasını sürətləndirir.

Küncüt Dövlət Farmakopiyasına daxil edilmişdir. Bundan uşaqlarda Verlhov xəstəliyinin, trombopenik purpuranın, essential trombopeniyanın, hemorrargik diatezin müalicəsində effektiv vasitə kimi istifadə olunur.

Küncütdən alınan yağ açıq sarı rəngdə olub, yarımquruyan yağlardandır, tərkibində olein və linal turşularının triqliseridləri vardır ki, bunlar da təbabətdə məhləmlərin tərkibində verilir.

ZAQAFQAZIYA KƏKOTUSU – *THYMUS* *TRANSCAUCASICUS* RONN.

Bitkinin istifadə orqanı: Tibbi məqsədlə yerüstü hissəsindən istifadə olunur (şək.57).

Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində timolla zəngin olan efir yağı, flavonoidlər, acı maddə, aşı maddələri, qətran, piyli yağlar, külündə mis birləşmələri, yeraltı cayan hissələrində C vitamini vardır.

Xalq təbabətində: Kəkotunun sulu dəmləməsindən daxilə me-teorizmdə, qarın sancılarında, şəkərlə qarışığından dizenteriyada, həzmi yaxşılaşdıran, sidikqovucu, qurdqovucu vasitə kimi, ürək döyünmələrində (əsasən yeniyetmə dövrə), yuxusuzluqda, angi-nada (qarqara kimi), təpitmələrindən əzələ və oynaq ağrılarında istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Sulu dəmləməsindən və qarışıqların tərkibində bəlgəmgətirici və öskürək əleyhinə, soyuqdəymələrdə tərqovucu kimi, göy öskürəkdə, bronxiddə istifadə olunur. Bitki-dən alınmış efir yağının tərkibindəki timol güclü antiseptik və bakteriosid təsirə malikdir, bundan elmi təbabətdə preparatlar hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Kəkotu uşaqlarda öskürək əleyhinə çox istifadə olunan pertussinin tərkibinə də daxildir.

KƏKLİKOTU – *THYMUS SERPYLLUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçək və yarpaqları (şək.58).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində efir yağı, timol (50% qədər), karvakrol, α terpinin, α terpineol, singiberin və borneol maddələri vardır. Bundan əlavə bitkinin yerüstü hissəsindən aşı maddələri, flavanoidlər, qətran, ursol və olein turşuları tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Güclü iltihabsorucu (tərkibində timol vardır), qıcolma əleyhinə, sedativ, öskürəkkesici, ağrıkesici, yarasagaldıcı və qurdqovucu təsiri vardır. Hipertoniya xəstəliyi, ateroskleroz, nevrالgiya, radikulit, tireotoksikoz (zob), nevroz və istəriyə xəstəliklərində işlədilir. Qurdqovucu, tərlədici, maddə kimi nevrالgiya, mədə bağırsaq sancısında tətbiq edilir.

Azərbaycan təbabətində yarpaqlarının dəmləmə və məhlulu ürək xəstəliklərində, qəbizlik də, qaraciyər xəstəliklərində iltihabsorucu vasitə kimi olduqca çox işlədilir. Bundan başqa hipertoniya və ateroskleroz xəstəliklərində tətbiq edilir.

Şəxsi təcrübə -- Mədə narahatlığı və tutmaşəkilli öskürək hallarında aşağıdakı qarışıqlardan birini qəbul etmək olduqca səmərəlidir.

- 20 q kəklikotu çiçəkləri, 10 q bibər, 10 q boymadərən.
- 20 q kəklikotu çiçəkləri, 10 q bahar xoruzgülü, 10 q zirə toxumu, 10 q lansetşəkilli bağayarpağı, 10 q şəhçiçəyi.

Hər iki qarışıq 2 çay qaşığı 250ml suda 10 dəqiqə dəmlənərək, günəşırı 3 dəfə (150q) yeməkdən sonra qəbul edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində acı maddələr olduğundan iştahgətirici, mədə-bağırsaq, qaraciyər, mədəaltı vəzi xəstəlikləri zamanı sağaldıcı xüsusiyyətə malikdir. Dəmləmə, bişirmə və ekstrakt kimi yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəliklərində, vərəm, difteriya və bronxial astma xəstəliyində müvəffəqiyyətlə işlədilir. «Pertussin» adlı dərman preparatının əsas komponenti kəklikotundan alınır. Xaricə tətbiq kimi oynaq, əzələ və periferik sinir sistemi xəstəliklərində aromatik vanna kimi qəbul edilir. Dəmləmə və ekstraktları kəskin və xroniki tənəffüs yolları xəstə-

liklərində, bronxial astma və vərəmdə tətbiq edilir. Bakterisid xüsusiyyətlidir, qıcolma əleyhinə, möhkəmləndirici, ağrıkəsici, yarasagaldıcı, qurdəleyhinə dərman bitkisidir. Yaxşı balverən bitkidir. Eyni zamanda parfümepiyada işlədilir.

Bolqar təbabətində bronxial astma, xora xəstəliyində, iştahsızlıqda, meteorizm və diareyada bişirilməsindən istifadə edilir. Revmatizm, angina, sinir və dəri xəstəliklərində vanna şəklində qəbul edilməsi məsləhət görülür.

Alman təbabətində çiçəklərindən tənəffüs orqanları, öskürmədə, aromatik vannaların qəbul edilməsi göstərişdir.

Fransız təbabətində spazmolotik, qurd əleyhinə, epitel toxumalarını yeniləşdirici, turşulardan yaranan yanıqlarda, (10q- 1 litr hesabı ilə) məsləhət görülür.

Avstriya təbabətində dəmləmə və tinkturaları qastrit, metcorizm, qıcolma və qurdəleyhinə dizinfeksiyaedici kimi istifadə edilir.

Polşa təbabətində bakterisid, iltihabəleyhinə, böyrək, qaraciyər, nevrologiya, oynaq revmatizmi, bronxit və bronxial astmada istifadə edilir.

Hazırlanması: Uşaqların revmatizmində: bitkinin cövhəri 2q, rozmarin 1q, lavanda 1q, çay sodası 350,0 vanna şəklində qəbul edilir. Xaricə işlətmək üçün: 1-2 xörək qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmlənərək istifadə edilir.

Qatı dəmləməsi 5q bitki 250ml –də dəmlənir. Gündəlik dozası 500 qramdır.

Əks göstəriş: Qaraciyər, böyrək, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi, miksedema və hamiləlik.

ACI YOVŞAN – *ARTEMISIA ABSINTHIUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Zirvə yarpaqları və çiçəkləri (şək.59).

Kimyəvi tərkibi: Acı yovşanın xüsusi iyi onun tərkibindəki efir yağı (əsas tərkibi - tuyen, pinen, kadinen, fellandren, bizabolen, β kariofillin, γ sepinen), tuyoq spirti, hidrogen peroksid 10-dan çox seskviterpen laktonları (absintin, anabsintin, artabsin və s.) və digər mürəkkəb kimyəvi maddələr vardır. Bitkinin tərkibində aşı maddələri, artemitin flavanoidi, üzvi turşular, karotin və askorbin turşusu vardır. Kökünün tərkibindən inulin alınmışdır.

Fitoterapevtik göstəriş: Yovşan mərkəzi sinir və qanyaradıcı sistemin fəaliyyətini artırır, asteniya, zəiflik, anemiya və epilepsiya kimi xəstəliklərin tam müalicəsinə zəmanət verir. Tərkibində hərarətsalıcı və öskürəkkəsici maddələr olduğundan temperatura ilə müşayət olunan – malyariya, qrip və kəskin respirator xəstəliklərin profilaktika və müalicəsində istifadə edilir. Qastrit - xüsusən hipersekresiya ilə müşayət olunan mədə xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə təyin edilir. Eyni zamanda kəskin və xroniki hepatit, xolesistit, öddəsi xəstəliklərinin müalicəsində də tətbiq edilir. Yovşan həm də müxtəlif qaraciyər və ödyolu xəstəliklərini müalicə etmək üçün qarışıqların tərkiblərinə daxildir. Diuretik və iltihabəleyhinə maddələrlə zəngindir. Preparat meteorizm, dismenorreya, böyrək, böyrəkdaşı və qurqovucu xəstəliklərin profilaktika və müalicəsində istifadə edilir. Son illərdə yovşan yüngül işlədici kimi bağırsaq xəstəliklərində tətbiq edilir. Yovşan dəmləməsindən xaricə işlədilən preparat kimi kompres və islatmalar, bağırsaqlardan isə askarid və bizquyruq helmintlərinin qovulmasında imalə formasında istifadə edilir.

Hazırlanması: 1 çay qaşığı bitkini 250ml qaynar suda dəmləyərək, 10 dəqiqə soyudaraq gündə 3 dəfə yeməkdən 1,5 saat əvvəl və ya sonra içmək lazımdır (gündəlik doza). Müalicə kursu 2-3 həftədir. Preparat - Yovşanın məhlulu (T-ae Absinthii). 1:5 nisbətində 70% spirtli məhlulu:

Rp.: Herbae Absinthii 100,0

D.S. 1 çay qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda 20 dəqiqə dəmləyərək, 3 dəfə $1\frac{1}{4}$ stəkan yeməkdən əvvəl içmək lazımdır.

Rp.: T-ae Absinthii 25ml D.S. 15-20 damcı gündə 3 dəfə yeməkdən 15-20 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır.

Əks göstəriş: Hamiləlik, enterkolit. Yüksək dozası sinir sisteminin yüksək oyanmasına səbəb olur. Bəzən, hətta yüksək olmayan dozası belə anemiya, təngnəfəslik və qusma yaradır.

ADI YOVSAN - *ARTEMISIA VULGARIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Dərman kimi çiçəkləyən zaman zirvə yarpaqları, payızda isə kökləri toplanılır (şək.60).

Kimyəvi tərkibi: Acı dadlı absintin və anabsintin, antiseptik və iltihab əleyhinə maddələrlə zəngindir.

Fitoterapevtik göstəriş: Başlıca olaraq möhkəmləndirici, anti-septik, iltihab əleyhinə və hərarətsalıcı xüsusiyyəti vardır. Yarpaqlarının məhlulu nevroz, epilepsiya, tireotoksikoz, miqren və meningit xəstəliklərində təyin edilir.

Möhkəmləndirici və iştahartırıcı xüsusiyyətinə görə ağ ciyər, xroniki bronxit və bronxoektaziya xəstəliklərində tətbiq edilməsi daha çox vacibdir. Mədə-bağırsaq, qaraciyər və öddəşi xəstəliklərində işlənən qarışıqların tərkibinə verilir. Şiş əleyhinə bitkidir. Təzə yarpaqları dəri zədələnmələrində və yanıqlarda istifadə edilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı bitkini 0,5 l qaynar suda dəmləyərək, gündə 3 dəfə içmək lazımdır (gündəlik doza).

Əks göstəriş: Hamiləlik

ÜZƏRLİK – *PEGANUM HARMALA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Gövdə, yarpaq və toxum (şək. 61).

Kimyəvi tərkibi: Bütün orqanlarında harmin, harmalin, harmalol, peqanın (vazisin) alkaloidləri vardır. Yerüstü orqanlarında harmin və peqanın, köklərində harmin, çiçək və gövdəsində peqanın alkaloidləri tapılmışdır. Toxumlarının tərkibində 3-4% alkaloidlər – başlıca olaraq harmin vardır. Bundan başqa rəngləyici pıqmentlər və 14,25% piyli yağ alınmışdır.

Xalq təbabətində: Kök və əsəb xəstəliklərində - parkinsonizm (əsmə, iflic) və ensefalitdə müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Harmin alkaloidi mərkəzi sinir sistemində oyandırıcı təsir edir. Toxumu diş ağrılarında effektiv təsirə malikdir. İnsanlar bu bitkini müqəddəs hesab etdiyi üçün bir sıra baş ağrılarında və gözdəyməyə qarşı dini inaclarla istifadə edirlər.

KÜSTÜŞAM – *BRYONIA ALBA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökləri (şək.62).

Kimyəvi tərkibi: Köklərinin tərkibində iki amorf zəhərli – brionin və brionidin qlükozidləri vardır. Brionin qlükozidi parçalandıqda qlükoza və amorf brionidin maddələri əmələ gəlir. Köklərində azacıq miqdarda aşı maddələri, nişasta və qətran, həm də – L. brionisin, brioamirid, briodulkozid, briodulkozid alkaloidə-bənzər maddələr vardır. Brioamirid fermentativ parçalanma zamanı acı maddə olan kukurbitasin və qlükoza əmələ gəlir. Kukurbitasin tərkibinə görə acı dadlı, zəhərli triterpen törəmələrinə yaxındır. Tərkibi briopolioza və sterin polisaxaridlərdən ibarətdir.

Fitoterapevtik göstəriş: Eksperimental tədqiqatlarla sübut edilmişdir ki, tərkibində olan qlükozidlər ürək əzələsini möhkəmlədir və damarların tonusunu zəiflədərək qan təzyiqini azaldır. Brioninin spirtli ekstraktı zəif işlədici təsir edir.

Əks göstəriş: Tərkibində alkaloidlər (zəhərli) olduğundan qəbul edilməsi həkim məsləhəti ilə olmalıdır.

ÇAQA (AĞAC GÖBƏLƏYİ) – *INONOTUS OBLIQUUS* (PERS.) PIL.

Bitkinin istifadə orqanı: Göbələyin meyvə cismi (şək.63).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində üzvi turşular (vanil, paraoksi-benzol, sirkə, qarışqa, turşəng və s.) polisaxaridlər (liqnin, pterin), sərbəst fenol, sterin, silikat, dəmir, alüminium, kalsium, maqnezium, natrium, kalium, sink, mis və manqan vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Tozağacı göbələyi mədə və onikibarmaq bağırsağın bədxassəli şişlərində, hiposekresiya ilə gedən gastritlərdə, mədə və digər orqanların bədxassəli şişlərinin şüa ilə müalicəsindən sonra da istifadə edilir. Bu göbələyin tətbiqi zamanı ağrı xeyli azalır, onun inkişafı ləngiyir. Göbələyin tətbiqi zamanı ət və yağların, konserv və kolbasanın qəbulu dayanandırılır, əksinə südlü və tərəvəzli qidalar artırılır.

Hazırlanması: Ev şəraitində soyuq suda qaşovla xırdalayaraq 4 saat ərzində hazırlanır. Digər tələbə görə 1 hissə göbələk və 5 hissə temperaturu 50°C yüksək olmayan suda 48 saatdan çox olmayaraq hazırlanır və süzülür. Saxlanılma müddəti 4 gündür. 0,5 -1 stəkan hazırlanmış məhlulu gündə 3-4 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır. Apteklərdə «Befungin» adlı ekstrakt kimi satılır.

Rp.: Befungini 100,0

D.S. 3 çay qaşığı ekstrakt 150 ml suda həll edilərək, 1 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır.

ACILIQOTU- *EPHEDRA VULGARIS* (RICH.)

Bitkinin istifadə orqanı: Yerüstü orqanı (şək.64).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində efedrin, onun izomerlərinin alkoloidi və aşı maddələri vardır.

Xalq təbabətində: Revmatizm, malyariya, astma, hipertoniya, mədə-bağırsaq və assit yaradan xəstəliklərdə işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində təbii büzücü maddə vardır. Qan təzyiqini normallaşdırır. Yolxucu xəstəliklər zamanı istifadə edilir. Astma tutmalarını nomallaşdırır, bahar qızdırması, övrə və digər allergik xəstəliklərdə tətbiq edilir. Bundan başqa Avropada revmatizm, malyariya, astma və hipertoniya da tətbiq edilir.

Hazırlanması: 1 çay qaşığı bitkini 250ml stəkan suda 10 dəqiqə ərzində həll edərək, gündə 3 dəfə qəbul etmək və eyni zamanda həftədə 2 dəfə hər dəfə 1 fincan olmaqla istifadə etmək lazımdır.

Əks göstəriş: Miopatiya, hipotoniya.

ŞƏRQ ALMASI – *MALUS ORIENTALIS* UGLITZK.

Bitkinin istifadə orqanı: Tibbi məqsədlə meyvə və toxumlarından istifadə olunur.

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində, aşı, pektin maddələri, dəmir və fosforun üzvi birləşmələri, efir yağı, qarışqa, kapron turşuları, 13%-ə qədər şəkər (qlükoza, fruktoza, saxaroza), alma, limon, çaxır, xlorogen, arabin turşuları, karotin, B₁, C vitaminləri, kül elementləri vardır. Kül elementlərində isə kalium, natrium, kalsium, maqnezium, dəmir, fosfor və s. vardır. Qabığında isə flavonoidlər vardır.

Toxumlarında amiqdalin qlükozidi, 15%-ə qədər yodlu piy yağı, yarpaqlarında isə C vitamini və amiqdalin qlükozidi vardır.

Xalq təbabətində: Meyvələri çiy və ya əzilmiş halda kəskin və xroniki ishallarda, kolitlərdə, enterokolitlərdə, həzmin yaxşılaşmasında, qanazlığında, revmatizmada işlənir. Bir neçə meyvəsinin şirəsindən dizenteriyada, enteritdə, müxtəlif mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində, şəkərli diabetdə, tam yetişmiş meyvələrinin şirəsindən isə ürək xəstəliklərində, sedativ vasitə kimi, piylənmədə, bronxitdə və s.-də işlədilir. Almanın qurudulmuş qabığından isə sidikqovucu vasitə kimi, dəmləməsindən – qulaq ağrılarında istifadə olunur.

Fitoteraevtik göstəriş – Azərbaycanın bir çox rayonlarında uşaqlarda dispepsiyanın müalicəsində alma suyu istifadə olunur.

Hazırlanması: 1 stəkan alma şirəsi + 1 yumurta sarısı + 2 q əkilən nanə yarpaqlarının tozu + 1 çay qaşığı şəkər tozu + 1 çay qaşığı konyak - gündə 1 çay qaşığı 2-3 dəfə qəbul olunur.

JENŞEN – *PANAX GINSENG* C.A. MEY

Bitkinin istifadə orqanı: Yalnız kökündən istifadə edilir (şək.65).

Kimyəvi tərkibi: Bitki daim öyrənilməkdədir hələlik müalicəvi tərəfləri hələ tam aydın deyil. Kökündə triterpen saponinləri – panaks, panakvisin, efir yağları, panasen, panaks turşusu (yağ turşularının qarışığı: palmitin, stearin, olein, linol), fitosterin, selik, kraxmal, şəkər, alkaloid, mikroelementlər (fosfor, dəmir, manqan, alüminium və s.), qətran, estrogen və vitaminlər (B₁,) vardır.

Xəlif təbabətində: Qədim şərq əfsanəsində jenşeni «bitki-adam», «yeradamı» adlandırırdılar. Əfsanələrdə deyilirdi ki, qocalığı geri qaytararaq cavanlaşdırır, xəstələri sağlamaşdırır, müdrikləşdirir, bir çox epidemiyaları: taun, çiçək və vəba mikroblarını məhv edir.

Fitoterapevtik göstəriş: Sinir sistemini stimullaşdırır, sinir və psixi narahatçılığı götürür, hipotenziv təsir göstərir, nevroz və impotensiyaların müalicəsində olduqca müsbət təsir göstərir, səbəbi məlum olmayan narahatlıqlarda, orqanizmin müdafiə qabiliyyətinin zəifləməsində, stres şəraitdə, infeksiya xəstəliklərdə istifadə edilir. Orqanizmi ümumi tonuslandırır, mərkəzi sinir sistemini stimullaşdırır və yüngül depressiyanı aradan götürür. Xroniki ağ ciyər xəstəliklərində, qanaxlığı, şəkərli diabet, hipotoniya və hiperqastritlərdə olduqca yaxşı təsir göstərir. Mədə yarasını olduqca tez sağaldır, iştahanı artırır, bağırsağın fəaliyyətini normallaşdırır, qan dövranını nizama salır. Lakin yerli-yersiz bu preparatı işlətmək yolverilməzdir. Bu preparatı vitaminlərlə birlikdə işlətmək onun səmərəsini xeyli artırır. Jenşen toksiki deyil və uzun müddət tətbiq edilə bilər. Xəstəyə bu preparatı zəif dozalarla təyin etmək məsləhətdir.

Hazırlanması: Köklərindən hazırlanan məhlul, dəmləmə, paraşok, məlhəm, çay və ekstraktları müalicədə işlədilir. İlk dəfə

zəif doza ilə başlayaraq, tədricən artırılması məsləhət görülür.
Müalicə müddəti 1-3 aydır.

Rp.: T-ae Ginsengi 30,0

D.S. 15-20 damcı gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəq. əvvəl

Rp.: Tabul. rad Ginsengi 0,15

D.S. 1-2 tabletka gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl

Əks göstəriş: Hipertoniya xəstəliyi, taxikardiya, simpatika-drenal krizlərdə, yay vaxtı təyini məsləhət deyil.

16 yaşına qədər uşaqlara verilməsi qəti qadağandır.

ELEUTEROKOKK – *ELEUTHEROCOCCUS* *SENTICOCUS* MAXIM.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq, gövdə və meyvələri (şək.66).

Kimyəvi tərkibi: Az öyrənilmişdir. Kök və gövdələrinin tərkibində eleuterozid, kumarin və flavanoid törəmələri vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Eksperimental təcrübələrdə eleuterokokk mərkəzi sinir sistemini oyadır, hərəkət aktivliyini artırır, şərti refleks, zehni, görmə qabiliyyətini, qanda şəkəri və maddələr mübadiləsini gücləndirir. Jenşen kimi psixoloji yorğunluq zamanı tonuslandırıcı, nevrastenianın ağır formalarında tətbiq edilir.

Hazırlanması: Rp.: Extr. Eleuterococci 50,0

D.S. 25-30 damcı yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul etməli.

Əks göstəriş: Arterial hipertenziya və halsızlıq.

DƏRMAN GÜLXƏTMI – *ALTHAEA OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökü, yarpaq və çiçəkləri (şək.67).

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarında 35% selik, qalaktoza, qlükoza, arabinoza, ramnoza, nişasta, pektin, yağ turşuları və digər maddələr vardır.

Xalq təbabətində: Böyrək və sidik axarları daşlarının təmizlənməsində, sistidə, sidik kanalındakı şişlərdə, xroniki prostatitdə, oynaq ağrılarında tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Bu bitki başlıca olaraq yuxarı tənəffüs yollarının iltihabında, öskürək əleyhinə, sinə yumşaldıcı vasitə kimi istifadə edilir. Gülxətminin kökü mədə-bağırsaq traktı, mədə və onikibarmaq bağırsağın xorasında, qastrit, kolit və ishalda istifadə edilir.

Hazırlanması və istifadəsi: Termosda 2-3 xörək qaşığı doğranmış bitki kökünü 0,5 l qaynanmış suda 10-12 saat ərzində dəmləmək lazımdır. 1/2 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir.

Aptekdə sirop, məhlul və ekstrakt şəklində satılır.

GECƏVƏR – *ACORUS CALAMUS L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Kökümsovu (şək.68).

Kimyəvi tərkibi: Kökümsovunda aş maddələri, qətran, nişasta, qlikozidlər, vitaminlər və efir yağları vardır.

Xalq təbabətində: Qaraciyər, öd yolları, böyrək, podaqra, revmatizm, angina, diş ağrısı, saçın uzadılmasında, raxit, mamalıq, görmə və eşitmə xəstəliklərinin pozğunluqlarında geniş istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Mədə-bağırsaq sisteminin funksiyasını artırır, iştahı yaxşılaşdırır, xoralarda, sinir və ağciyər xəstəliklərində istifadə olunur. Spirtli ekstraktı iltihab əleyhinə, ağrı-kəsici kimi işlədilir. Kökümsovları üyüdülmüş şəkildə hipersekresiyada (mədə turşuluğunda), qusma refleksini artırdığından siqaretin tərgidilməsində istifadə edilir. Yağlı məhlulunda olan enatinin (olimetin, rovatın, rovoxol) tərkibində öddəsi və böyrəkdaşı xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir.

Hazırlanması: Dəmləmə: 1 xörək qaşığı üyüdülmüş kökünü 2 stəkan qaynar suda (termosda) 10-12 saat ərzində dəmləyərək, gündə 3 dəfə, hər dəfə 1/2 stəkan yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır.

Bişirmə: 10 q kökü 200 ml suda bişirmək lazımdır. Bu məlhəm xaricə qəbul edilir.

Əks göstəriş – Hamiləlik.

DAĞ ÖKÜZOTU – *ARNICA MONTANA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçəkləri və çiçək səbəti (şək.69).

Kimyəvi tərkibi: Bitkinin çiçək səbətində bioloji fəal birləşmələrdən arnisin, arnifolin, karotinoidlər, efir yağları, sterin, aşı maddələri, qətran və mineral maddələr vardır.

Xalq təbabətində: Qızdırma zamanı və yanıqların bütün formalarında istifadə edilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Öküzotunun tərkibində qankəsici, iltihabəleyhinə, damargenişləndirici, qantəzyiqi salıcı, ödqovucu və qanda xolesterinin miqdarını azaldan bioloji fəal maddələr vardır. Bitkidən hazırlanmış məhlul mamalıq və genekologiya praktikasında qankəsici, doğuşdan sonrakı dövrdə yaranan iltihabəleyhinə, ödqovucu vasitə kimi istifadə edilir. Eyni zamanda miokard infarktının bərpa dövründə və beyin qan dövrünün normallaşmasında istifadə edilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı dağ öküzotu çiçəyini 0,5 litr qaynanmış suda dəmləyərək, qarışığı 6-8 saat saxlamaqla, 1/2 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır.

SOLMAZÇIÇƏK - *HELYCHRYSUM ARENARIUM* (L.) MOENCH.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçək səbəti (şək.70).

Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində rəngləyici və aşı maddələri, qətran, piy, efir yağları, vitaminlər, flavonoidlər (qlükozidlər və sərbəst aqlikon) tapılmışdır. Yerüstü hissəsində flavonoidlər, efir yağı (0,04%), sitosterin, sterolin, yağ və üzvü turşular, karotinoid, selik, vitaminlər, aşı maddələri, kalium sulfat, kalium xlorid, kalsium, dəmir və manqan ionları vardır.

Xalq təbabətində: İltihaba qarşı, spazmolitik vasitə kimi, öd ifrazının artırılmasında işlədilir. Metabolik funksiyaları nizama salaraq, qanda bilirubin və xolesterinin miqdarını aşağı salır. Öd yollarında olan kalsium tərkibli qumları kənar edir.

Fitoterpevtik göstəriş: Maddələr mübadiləsi pozğunluğu olan ateroskleroz xəstəliyində, zəif sedativ təsiri olduğundan sinir xəstəliklərinin müalicəsində, mədə və onikibarmaq bağırsağı, mədəaltı vəzi, hipertoniya, bağırsağı xəstəliklərində stimullaşdırıcı vasitə kimi tətbiq edilir. Bundan başqa qastrit, pankreatit, kolit, bağırsağı atoniyası xəstəliklərində işlədilir. Həm də solmazçiçək çox yaxşı ödqovucu olduğundan kəskin və xroniki qaraciyər və öd xəstəliklərində təyin edilir. Əgər hər hansı bir adamda təngnəfəslik, qusma, sağ qabırğa altında qaraciyər nahiyyəsində ağrılar və böyümə, meteroizm, göz sklerasında saralma, dəri örtüyünün saralması müşahidə edilsə (sarılıq əlamətləri), dərhal bu bitkinin dəmləməsini uzunmüddətli qəbul etməlidir.

Solmazçiçək zəif toksikidir. Öd ifrazını artırır, onun tərkibindəki öd turşusunu, bilirubinin qatılığını azaldaraq, mədə, mədəaltı vəzi və diurezi (sidik ifrazı) nizama salır. Solmazçiçəyin sidik ifrazından başqa, qanqəsici xüsusiyyəti də vardır.

Kəskin və xroniki qaraciyər xəstəliklərində, öd yolları, xolesistit, xolangitdə çiçəkləri dəmləmə (Decoctum florum Helichrysi arenarii) və ekstrakt şəklində qəbul edilir.

Hazırlanması: 3 xörək qaşığı bitki çiçəklərini 1 stəkan qaynanmış su ilə termosda 30 dəqiqə dəmləmək lazımdır. Gündə 2-3 dəfə 15 dəqiqə yeməkdən əvvəl qəbul edilməlidir. Solmazçiçəyin quru ekstraktı (*Extr. Florum Helichrysis arenarii siccum*) və meyvələrinin qranulaşəkili parəşoku 10 q olmaqla apteklərdə satılır. Müalicənin orta davamətmə müddəti - gündə 3 dəfə 1 q olmaqla, 2-3 həftədir.

DƏRMAN VALERIANI – VALERIANA OFFICINALIS L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kök və kökümsovları (şək.71).

Kimyəvi tərkibi: Kökündə 0,2% efir yağı vardır. Efir yağının əsas komponentləri pinen, borneol, kamfen, izovalerian turşusudur. Bundan başqa valerian turşusu, xatinin alkaloidi, valerin qlikozidi, aşı maddələri, üzvi turşular, şəkər tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Nevrozda və sinir sistemi ilə bağlı halsızlıqlarda daha çox istifadə edilir. Valerian eyni zamanda spastik kolitlərdə, xroniki ishal, mədə-bağırsaq nevrozunda da müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Hipotenziv və spazmolitik xüsusiyyətinə görə hipertoniya xəstəliyində, kardionevroz və stenokardiya zamanı gözəl təsir vasitəsidir. Qalxanvari vəzinin hiperfunksiyası, bədənənin əsməsi (xoreya), epilepsiya və erkən klimakterik şikayətlər zamanı valerian qəbul etmək olduqca yaxşı təsir edir. Eyni zamanda iştahsızlıqda, orqanizmin möhkəmləndirilməsində, ödə, mədə və mədəaltı vəzi sisteminin xəstəliklərində də tətbiqi çox yaxşı təsir edir. Sinir sistemini sakitləşdirir və spazmolotik təsir göstərir. Sinir mənşəli halsızlıqlarda, ürək-damar

nevrozunda, ürəkdöyünmədə, ekstrasistolada, meteorizm və qəbizliklərdə tətbiq edilir.

Hazırlanması: Termosda 1 xörək qaşığı köklərindən 1 stəkan qaynanmış suda dəmlənilir, gündə 3-4 dəfə hər dəfə 1/3 stəkan qəbul edilir. Paroşok şəklində kökləri 1-2 q olmaqla, gündə 3-4 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul edilə bilər. Adi dəm çaynikində 1 xörək qaşığı bitkinin üzərinə 2 stəkan qaynanmış su əlavə etməklə dəmlənilir, gündə 2-3 dəfə qəbul edilir.

Aptekdə bu bitki bir neçə formada satılır. *Tinktura valerianı* (*T-ae Valeriane*) yeniyetmə və gənclər 20-30 damcı gündə 2-3 dəfə; uşaqlar isə yaşdan asılı olaraq qəbul edə bilərlər. *Efir valerian məhlulu* 15-30 damcı gündə 2-3 dəfə; *Quru valerian ekstraktı* 1-3 tabletkə gündə 2-3 dəfə; *İnciçiçəyi – valerian – adonizid* damcısı 15-20 damcı gündə 2-3 dəfə; *Möhkəmləndirici çay* (1 hissə valerian kökü, 2 hissə yarpız yarpaqları, 2 hissə üç-yarpaq yonca və 1 hissə mayaotu).

Qarışıqların tərkibində karvolol (valokardin), zelenin damcısı, mədə çayı və s. vardır.

Əks göstəriş: Bu preparatın uzunmüddətli qəbul edilməsi həssaslıq və adətləmə halı törədir. Enterkolitin kəskinləşməsi, qlomerulonefrit zamanı preparatı qəbul etmək məsləhət görülmür. Preparatı 1,5 -2 ay qəbul etmək insanda diskomfort, baş ağrısı, halsızlıq, mədə-bağırsaq traktında xoşagəlməz hallar törədir.

DƏRMAN QULANÇARI (MƏLƏÇÜYÜD) – *ASPARAGUS OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökümsovları, kökləri və cavan zoğları (şək.72).

Kimyəvi tərkibi: Kökümsov və köklərində asparagin və arqinin amin turşuları (0,04% qədər), steroid saponinlər, efir yağı, A vitamini, karbohidrat və kumarinlər vardır.

Xalq təbabətində: Çin xalq təbabətində qulançar mədə-bağırsaq traktı və qara ciyər xəstəliklərində iltihabsorucu, ağ ciyər, difteriya, şəkərli diabet, podaqra, revmatizm və vərəm xəstəliklərində isə iştahlandırıcı kimi istifadə edilir. Böyrək, sidik yolu, qohuşabənzər vəzi, ürək-damar və böyrək çatmamazlığı zamanı yaranan ödemlərdə sidikqovucu və iltihabsorucu kimi tətbiq edilir. Dəri xəstəliklərində xaricə təyin edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Güclü diuretik, hipotenziv, sedativ, antispastik və ödqovucu xüsusiyyətə malikdir. Dərman qulançarı ürək ritmini azaldır. Buna görə də bu bitkini nevroz, isteriya, impotensiya, taxikardiya, hipertoniya və ateroskleroz xəstəliklərində təyin edirlər.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı xammalı 1 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda) içmək lazımdır (gündəlik doza).

YONCAYARPAQ MENYANTA – *MENYANTHES TRIFOLIATA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaqları (şək.73).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində acı maddələr vardır. Bitkidən meliantin və meniantin qlükozidləri tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Sinir sistemini möhkəmləndirilməsində, taxikardiya əleyhinə, hərərət salıcı, quddqovucu, qanazlığı, mal-yariya, oynaq və dərinin iltihabı xəstəliklərində istifadə edilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Mədə-bağırsaq sistemi zəifliyində, xüsusən xroniki qastritlərdə, mədənin sekrktor funksiyasının hipofunksiyasında, iştahasızlıqda, ödqovucu və sidikqovucu, ümumi halsızlıq zamanı işlədilir. Xüsusilə öddaşı xəstəliyində yaxşı nəticə verir. Vərəm əleyhinə orqanizmin möhkəmləndirilməsində müalicəvi təsir vasitəsidir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı quru yarpaqları (termosda) 0.5 l qaynanmış suda (gündəlik doza) dəmlənib, gündə 2-3 dəfə yeməkdək 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir.

DƏNİZ KƏLƏMİ – *LAMINARIA SACHARINA* (L.) LAMOUR.

Bitkinin istifadə orqanı: Bütün hissələri (şək.74).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində çoxlu miqdarda yod (3%-ə qədər), vitamin, algin turşusu, mannit, laminarin və mikroelementlər (Na, K, Ca, Mn, Cu, Co, As) vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində çoxlu miqdarda yod və vitaminlər olduğundan, bir çox illərdir ki, Çində və Yaponiyada orqanizm möhkəmləndirici, basedov və avitaminoz xəstəliklərində əvəzsiz bitki kimi işlədilir. Ateroskleroz, podaqra və tireotoksikoz xəstəliklərinin profilaktika və müalicəsində istifadə edilir.

Hazırlanması: 1/2 çay qaşığı bitki parşoku axşam dəmləyərək içmək lazımdır (gündəlik doza). Salat və tərəvəz yeməklərinə (gündə 1/2 çay qaşığı) əlavə edilir.

Əks göstəriş: Hamiləlik, nefrit, hemorragik diatez, qızılyel, xroniki dəri xəstəlikləri və xroniki rinit.

MINAÇIÇƏYİ – *VERONICA OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Əsasən bitkinin zirvə yarpaqları istifadə edilir (şək.75).

Kimyəvi tərkibi: Kifayət qədər öyrənilməmişdir. Tərkibində acı maddələr, tanin, aukubin qlükozidi, efir yağları, vitaminlər və saponinlər vardır.

Xalq təbabətində: Ağrıkəsici, iltihabsorucu, qankəsici, öskürəkkəsici və yarasagaldıcı xüsusiyyətlərə malikdir. İştahasızlıqda, mədə turşuluğunun azalmasında və ishal zamanı istifadə edilir. Qaraciyər, böyrək, bağırsaq, qadın xəstəlikləri, vərəm, podagra, şəkərli diabet və bədxassəli şişlərdə bölgələrdə geniş şəkildə istifadə edilir. Yanıqlarda, frunkulyoz, dəri xəstəliklərində və yaralanmalar zamanı xaricə təpitmə və yaxma kimi çəkilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Müasir dövrdə tibbdə soyuqdəymədə, yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəliklərində və bronxial astmada işlədilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı 0,5 l (termosda) qaynanmış suda dəmlənib, gündə 3-4 dəfə yeməkdək 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir.

QIRXBUĞUM – *POLYGONUM BISTORTA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaqları və ya yerüstü hissəsi (şək.76).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində aşı maddələri və piroqal törəmələri, bundan başqa qall turşusu, flobafen, nişasta və zülal vardır.

Xalq təbabətində: Güclü qankəsici kimi müxtəlif qanaxmalarda, hətta sistit, xolesistit və öddəşi xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə işlədilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Tərkibində iltihabsorucu maddələr olduğundan, kəskin və xroniki koloit və enterkolit xəstəliklərində istifadə edilir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı üyüdülmüş bitki 1 stəkan qaynanmış suda 10-15 dəqiqə dəmlənərək, gündə 3-4 dəfə yeməkdək 20-40 dəqiqə əvvəl 1-2 xörək qaşığı qəbul edilir.

SUBİBƏRİ - *POLYGONUM HYDROPIPER L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin bütün yerüstü hissəsi (şək.77).

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində poliqopiperin qlikozidi, flavanoidlər (2,0-2,5%) (kversetin, kversitrin, kempferol, rutin, ramnazin), kalium duzu, aşı maddələri, pirokatexin qrupu (3,8%), efir yağı (0,005%), qarışqa, fitoserin, filloxinon, tokofepol, valerian, sirkə turşuları, K vitamini (0,78%), karotin (42,35 mq%), C vitamini (200,0 mq%) və kül (13,0%) vardır. Tərkibində flavonoidlər, qlükozidlər (rutin, izoramnetin) poliqopiperin qlükozidi, aşı maddələri, efir yağları, askorbin və üzvi turşular, uşaqlıq əzələsini stimullaşdıran maddələr, fitosterin, filloxinon, tokoferol və mikroelementlər vardır.

Xalq təbabətində: Mamalıq xəstəlikləri. Qədim Yunan təbabətində şişlərin müalicəsində tətbiq edilir. Parasels bu bitkini xaricə ağrıkəsici məqsədilə qoyulmasını (xardalın əvəzedicisi) məsləhət görürdü.

Fitoterapevtik göstəriş: Subibəri olduqca güclü qankəsici xüsusiyyətə malikdir. Hemorragik qaşınmalarda və qanaxmalarda istifadə olunmaqla yanaşı, «Anestozol» şamının əsas tərkib hissəsinə qatılır. Uşaqlıq qanaxmalarında və ağrıkəsici vasitə kimi istifadə edilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı bitki 0,5 l qaynanmış suda dəmləyib, gündə 2-3 dəfə qəbul edilir. Maye ekstraktını 30-40 damcı gündə bir neçə dəfə, dəmləməsini (12:200) xörək qaşığı ilə gündə 3 dəfə uşaqlıq və hemorragik qanaxmalarda, qadınlarda aybaşı ağrılarında işlədilir. Dəmləməsi 12:200 nisbətində hazırlanaraq, xörək qaşığı ilə gündə 3 dəfə qəbul edilir.

Əczaxanalarda aşağıdakı preparat formasında satılır: Preparat - Rp: Extr. *Polygonii hydropiperis fluidi* 25ml. D.S. 30-40 damcı gündə 3-4 dəfə yeməkdən 30 dəq. əvvəl qəbul edilir.

Əks göstəriş: Qaraciyər xəstəlikləri.

İRAN QIRXBUĞUMU- *POLYGONUM PERSICARIA* L. (=*PERSICARIA MASCULATA*)

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkini çiçəkləyən zaman kökünü toplamaq lazımdır (şək. 78).

Kimyəvi tərkibi: Köklərində tanin, qal turşusu, flobafen, flavonoidlər və efir yağları vardır.

Xalq təbabətində: Hemorroyda, mədə-bağırsaq və uşaqlıq qanaxmalarında tətbiqi yaxşı səmərə verir. Bitki həm də zəif işlədici və sidikqovucu təsirə malikdir. Dəmləməsi enterkolit, spastik və ya atonik qəbizliklərdə işlədilir. Sistematik olaraq xroniki qəbizliyin müalicəsində tətbiq edilir. Ekzemada və yaralarda xaricə məlhəm kimi işlənir.

Fitoterapevtik göstəriş: Xüsusən uşaqlıq qanaxmasında, uşaqlığın iltihabında, atoniyada və menstruasiya halının pozuntularında tətbiq edilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı bitki 0,5 l qaynanmış suda dəmlənib, gündə 2-3 dəfə qəbul edilir. Qanaxma hallarında məhlulu (10,0:200,0) - 1 xörək qaşığı gündə 3 dəfə qəbul edilməlidir.

Əks göstəriş: Hamiləlik.

QUŞDILI – *POLYGONUM AVICULARE* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin yerüstü hissələri (şək.79).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində silikatlar (1,2% həll olmayan və 0,25% həll olan), aşı maddələri (4% qədər), selik, qətran, flavanoidlər, saponinlər, piy və şəkər vardır.

Xalq təbabətində: Maddələr mübadiləsini normallaşdıran bitki kimi böyrək və öddəsi xəstəliyində istifadə edilən yığıntıların tərkibinə daxildir. Bitkidən hazırlanmış təzə şirədən əsasən yanıqların müalicəsində istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Sidikqovucu, iltihabsorucu, büzücü, möhkəmləndirici, qankəsici və ödqovucu təsir göstərir. İshalla müşayiət olunan enterkolitdə təyin edilir. Quşdili xüsusilə böyrək və sidikyolu, nefrit, pielonefrit, sistit xəstəliklərində gastrit, qaraciyər, ödyolu (öddəsi) xəstəliklərində, iltihab etiologiyalı genetik xəstəliklərdə, sonsuzluqda, podaqra, vərəm, malyariya, difteriya, raxit və uşaqlarda diatez zamanı tətbiq edilir.

Hazırlanması: 2-3 xörək qaşığı bitkini 2 stəkan soyuq suda qaynayana qədər qızdırmaq və dəmləmək lazımdır (gündəlik doza). Yaz və payızda profilaktik məqsədlə hər gün 2-3 dəfə hər dəfə 1 fincan qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu bir neçə həftədir. İshal zamanı gündə 3 fincan qəbul etmək lazımdır. Bundan başqa revmatizm, podaqra, sidik yolu və böyrək xəstəliklərində, sidik tutulmalarında və babasildə istifadə edilir. Xaricə dəri səpkilərində, çətin sağalan yaralarda (trofik yara) tətbiq olunur.

Əks göstəriş: Hamiləlik.

HÜNDÜR ANDIZ – *INULA HELENIUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökümsov və kökləri (şək.80).

Kimyəvi tərkibi: Bitkinin kökümsov və köklərində efir yağı, mürəkkəb tərkibli qalenin, lakton, alantol və proazulen maddələri vardır. Bundan başqa tərkibində inulin (44%), inulenin, pəvdoinulin, efir yağı (1-3%), alontolakton, alontol turşusu, izoulontolakton, dihidroalontolakton, proazulen, az miqdarda alkaloidlər, qatran, sirkə və benzoy turşuları vardır.

Səliq təbabətində: Baş ağrıları, epilepsiya, ürəkdöyünmələrdə və menstruasiya pozulmasında işlədilir. Andızın kökü podaqra, qeyri-spesifik artritlərdə, qankəsici, yarasagaldıcı və eksudativ diatezlərdə müvəffəqiyyətlə işlədilir. Ekzemada, neyrodermitdə, çətin sağalan yara və iltihabı xəstəliklərdə xaricə təyin edilir.

Mədə xəstəliklərindən - qastrit, xora, sinir xəstəlikləri, radikulit, endemik ur və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində 1 xörək qaşığı dəmləməsi gündə 2-3 dəfə qəbul edilir. Bundan başqa ürək xəstəliklərində, hipertoniya, diş ağrılarında, tən-gənəfəslik və arıqlamalarda, kolit, qaraciyər öd, sidikyolu xəstəlikləri və şişkinliklərdə olduqca səmərəlidir.

Andız Tibet təbabətində qiymətli hesab olunur. Bolqar təbabətində köklərinin dəmləməsi ürəkdöyünmə, baş ağrıları, epilepsiya və difteriyada dərman kimi işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Hippokrat andızı yüksək qiymətləndirirdi. Kökümsov və kökləri bronxit, traxeit, ağciyər vərəmi, astma xəstəliklərində işlədilir. Andızın öskürəkkəsici və iltihabsorucu xüsusiyyətinə görə bronxit, pnevmoniya, bronxial astma və difteriya xəstəliklərində istifadə edilir. Qastrit, kolit, qaraciyər və öd yolları, sidikyolu xəstəliklərində tətbiq edilir. Andız ishalda, xroniki enterkolit, qəbizlik, iştahasızlıq hallarında da işlədilir. Keyfiyyətli öskürəkkəsici və dizinfeksiyaedici dərman bitkisidir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı 1 stəkan qaynanmış suya əlavə edərək termosda saxlanılır. 1/3 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir.

Dəmləmə: 1 xörək qaşığı bitki kökü 2 stəkan suda 10-15 dəqiqə zəif odda dəmlənilir. Hər saatdan bir 1-2 xörək qaşığı qəbul etmək məqsədəuyğundur.

Dəri xəstəliklərində (leyşmanioz, ekzema, dəri səpkiləri) əzilmiş kökləri süzgəcdən keçirilərək məlhəmi isti halda dərinin üzərinə qoyulur.

Öskürmə zamanı aşağıdakı resepdən istifadə etmək lazımdır:

Rp.: Dec. rad. *Inulae* 20,0 : 200,0 *Liquiritiae* 10,0

M.D.S. 1 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə qəbul etmək

Rp.: Dec. rad. *Inulae* 20,0 : 200,0 *Natrii benzoatis* 4,0

M.D.S. 1 xörək qaşığı gündə 3-5 dəfə qəbul etmək

Dəri xəstəliklərində işlədilən qədim reseptin (məlhəm) tərkibi aşağıdakı kimidir:

➤ 180 q andız kökü 360 q suda qaynadılır və 120 q donuz salası və kərə yağı ilə qarışdırılır.

Rəvmatizmdə aşağıdakı kimi istifadə edilir:

➤ 2 xörək qaşığı bitki kökləri 1 stəkan suda 30 dəqiqə dəmlənilir, 10 dəqiqə soyudulur, 0,5 stəkan gündə 2-3 dəfə yeməkdən 1 saat əvvəl qəbul edilir.

➤ 2 çay qaşığı xırdalanmış andız kökü qaynanmış soyuq suda 8 saat saxlanılır 0,5 stəkan gündə 4 dəfə yeməkdən 30 dəq əvvəl qəbul edilir.

➤ 20q andız kökü 100q 70%-li spirtə 8-10 gün saxlanılır. 20 damcı gündə 3 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl qəbul edilir.

Əks göstəriş: Böyrək xəstəliklərində və hamiləlik dövründə qətiyyən işlətmək olmaz, çünki vaxtından əvvəl doğuş baş verə bilər.

DÖRMAN XƏŞƏMBÜLÜ – *MELILOTUS OFFICINALIS* (L.) PALL.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin zirvə yarpaqları və çiçəkləri istifadə edilir.

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində kumarin (0,4%), melilotin, melilotozid, purin, piy və efir yağları vardır. Çiçəklərində kumarin, tannin, xolin, selik və özünəməxsus aromat vardır.

Xalq təbabətində: Dəridə çil və ləkələrin təmizlənməsində əvvəl istifadə edilir. Çiçəklərinin məhlul və dəmləmsi frunkulyoz və infekt. rühablarda, brusit, mastit, otit zamanı istifadə edilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Hipotenziv, antikaqulyant və fibrinolitik hallarda işlədilir. Şüa xəstəliyində leykopeniya zamanı tətbiq edilir. Eyni zamanda sinir sisteminin zəifliyində (nevrasteniya), kardiospazm, isteriya, miqren, halsızlıq, hipertoniya, stenokardiya, ateroskleroz və klimakterik hallarda tətbiq edilir. Öskürəkkəsici dərman kimi ağ ciyər iltihabında, işlədici, qadın xəstəliklərində və menstruasiya hallarının pozğunluğunda istifadə edilir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı bitki 1,5 stəkan qaynanmış suda dəmlənələrək, gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Xaricə qəbulu 2 xörək qaşığı 2 stəkan suda dəmlənələrək istifadə edilməlidir.

Miokard infarktında, tromboflebitdə, tromboemboliyanın profilaktikasında müvəffəqiyyətlə istifadə edilir.

Əks göstəriş: Hamiləlik və böyrək xəstəlikləri.

TIKANLI PITRAQ – *XANTHIUM SPINOSUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitki çiçəkləyən zaman payızda kökü, yetişdikdə isə toxumları istifadə edilir. (şək. 81a).

Kimyəvi tərkibi: Zəif öyrənilmişdir. Bitkinin bütün orqanlarında bolluca yod vardır. Eyni zamanda pıqmentlər, alkaloid, askorbin turşusu, piy, yağ, qətran və qlükozidlər (ksantostromarin) vardır.

Xalq təbabətində: Qalxanabənzər vəzi (zob, hiperparatireoz) xəstəliklərində istifadə edilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Bitkidən alınmış məhlul mədə-bağırsaq, ishal və dizinteriya xəstəliklərində uşaqlarda 2-10 damcı, yeniyetmələrdə isə 15-20 damcı gündə 5-6 dəfə qəbul edilir. Dəri xəstəlikləri, ekzema, leyşmaniyoz (ilyarası), göbələk xəstəliklərində tətbiq edilir.

Hazırlanması: 1-2 xörək qaşığı bitki 0,5 stəkan qaynanmış suda dəmlənələrək, qəbul edilməlidir. 3-4 xörək qaşığı bitki kökü 0,5 litr suda həll edərək, xaricə işlədilir.

Əks göstəriş: Xaricə tətbiq edilməsi yanıq törədə bilər. Tətbiqi zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır.

ADI QARAQINIQ – *ORIGANUM VULGARE L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Müalicə məqsədilə bitkinin kökü, qida qatqısı kimi yerstü hissəsi və çiçəkləri istifadə edilir (şək.82).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində efir yağları (fenol, timol və onun izomerləri), acı maddələr, və çoxlu miqdarda askorbin turşusu və piqmentlər vardır.

Xalq təbabətində: Revmatizm zamanı oynaqların şişkinliklərində, podaqrada, amonoreyyada, ekzema, dəri səpgiləri və müxtəlif yaranmalarda istifadə edilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Mərkəzi sinir sistemini möhkəmləndirir: nevroz, halsızlıq, isteriya, epilepsiya, hipertoniya xəstəliyi, ateroskleroz, klimaksla bağlı nevroitik şikayətlər zamanı tətbiq edilir. Bronxial vəzinin sekresiyasının artırır, spazmolotik, öskürəkkəsidir, güclü tər ifrazına səbəb olur. Bronxit, pnevmoniya, bronxoektaziya, bronxial astma və difteriya xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Bundan başqa iştahasızlıq, qastrit, bağırsaq peristaltikasının artırılmasında, mədə-bağırsaq spazmında, mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasında, atonik qəbizliklərdə, ödqovucu, iltihab əleyhinə tətbiq edilir.

Hazırlanması: Məhlulunu hazırlamaq üçün 2 xörək qaşığı bitki 2 stəkan qaynanmış suda dəmlənələrək (termosda), 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir.

Spirтли məhlulunu hazırlamaq üçün 10 q bitki 150 ml 70%-li etil spirtində həll edilməlidir. 7-10 gün qaranlıq otaqda saxlanılmalıdır. Gündə 3-4 dəfə 30-40 damcı qəbul edilməlidir. N.Q.Kovalev məsləhət görür ki, epilepsiya zamanı 2 xörək qaşığı bitki 1,5 stəkan qaynanmış suda dəmlənələrək (termosda), qəbul edilməlidir (gündəlik doza). Müalicə müddəti 3 ildir.

Əks göstəriş: Hamilələik.

DAZIOTU – *HYPERICUM PERFORATUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin yerüstü hissəsi -gövdə, çiçək və yarpaqları (şək.83).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində aşı maddələr, efir yağları, flavonoidlər (hiperozid, rutin, kversitrin, izokversitrin, kversetin), vitaminlər (C, PP, karotin, nikotin turşusu), antosian, spirt, alkaloid, qətran və piqmentlər vardır.

Xalq təbabətində: Oynağın mübadilə, infeksiyon və revmatik etiologiyalı xəstəliklərində, yara, xora və müxtəlif travmalar, kəskin yoluxucu xəstəliklər, vərəm, qızdırma, xoşxassəli törəmələrdə işlədilir. Daziotu mastopatiyalarda – mastit, qadın cinsiyyət orqanlarının iltihabi xəstəliklərində müalicə üçün yararlıdır. Bitkinin fotosensibilizasiyaedici xüsusiyyətinə görə *vitiliqo* xəstəliyinin müalicəsində işlədilir. Ağız və boğaz xəstəliklərinin müalicəsində qarqara üçün, yanıq və yaralanmalarda effektiv təsir vasitəsidir.

Fitoterpevtik göstəriş: Çox istifadə edilən dərman bitkisidir. Orqanizmi möhkəmləndirən, iltihab əleyhinə, qankəsici xüsusiyyəti vardır. Miokardit və endokarditdə stumuləedici və spazmolitik maddə kimi işlədilir. Astenik hallarda, nevroz, nevrasteniya, baş ağrısı, halsızlıq zamanı istifadə edilir. İltihabsorucu və ağrıkəsici vasitə kimi tətbiq edilir. Daziotu mədə-bağırsaq traktı xəstəlikləri (gastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi, enterkolit, ishal, hemarroy, xoralı kolit), qaraciyər və öd yolları (xolesistit, öd daşı, sarılıq, xroniki hepatit vegetativ distoniya) xəstəliklərində də işlədilir. Qlomerulonefrit, pielonefrit, sistit, revmatizm, lümbaqo və prostatitdə diuretik, antidepressant, iltihabsorucu dərman maddəsi kimi tətbiq edilir.

Hazırlanması: Məhlulunu hazırlamaq üçün 1 xörək qaşığı bitki 1,5 stəkan qaynanmış suda dəmlənilir (termosda). 1/3 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir.

2 çay qaşığı bitki 250ml qaynanmış suda dəmlənilir. Gündə 2-3 fəncan qəbul edilir. Bir neçə həftə ardıcıl qəbul edilməlidir.

Xaricə istifadə üçün məhlul hazırlanır (2-3 xörək qaşığı bitki 2 stəkan qaynanmış suda dəmlənilir). Spirtli məhlulunu hazırlamaq üçün 1:10 nisbətində 70-96%-li etil spirtində 10 gün ərzində həll edilməlidir. 30-50 damcı 1/3 stəkan su ilə qarışdırılır və qarqara edilir.

Yağ (*Oleum Hyperici*): 2-3 stəkan daziotu çiçəkləri 200 q gümbəllənən yağında həll edilir. Saxlama müddəti-qaranlıq yerdə, otaq temperaturunda 2 həftədir.

Əks göstəriş: Qaraciyər nahiyyəsində xoşagəlməz duyğular, ağızda acılıq hissi, qəbizlik, iştahanın pozulması. Qan təzyiqini qaldırdığından hipertoniyaya meyillikdə qəbul edilməsi məsləhət deyil.

GÖYÇİÇƏK ISITMƏOTU – *CENTAUREA CYANUS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yalnız kənar çiçəkləri dərman kimi istifadə edilir (şək.84).

Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində antosian qlükozidi (sianin) və sentaurin maddələri vardır. Bitkinin yerüstü hissəsində sentauren glikozidi, sianin antosian glikozidi, efir yağı, acı, aşı maddələri, saponinlər, mineral duzlar və digər maddələr vardır. Kimyəvi tərkibi tam öyrənilməmişdir.

Fitoterpevtik göstəriş: Sidik yolları xəstəliklərində, xüsusən qlomerulonefrit (böyrək parenximasını qıcıqlandırmır) xəstəliyinin müalicəsində tətbiq edilir. Göyçiçəyin tərkibində acı qlükozidlər vardır ki, bu qaraciyər xəstəliklərinə ödqovucu və spazmolitik təsir göstərir. Tibb praktikasında dəmləməsi və ekstraktı nefrit, sistit, uretrit xəstəliklərində sidikqovucu, qaraciyər və ödyolları xəstəliklərində ödqovucu, difteriyada öskürəyə qarşı, əsəb və mədə xəstəliklərində, uşaqlarda ishal və uşaqlıq qanaxmalarında tətbiq edilir. Qaraciyər və ürək xəstəliklərində yaranan ödəmlərdə sidikqovucu kimi istifadə edilir.

Xalq təbabətində: Göyçiçəyin çiçəkləri və ya yarpaqları digər bitkilərlə qarışıq şəkildə uşaqlıq qanaxmalarında, xroniki dəri xəstəliklərində – frunkulyoz, ekzema, trofik yaralarda müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Malyariya, istisqa (ödem), konyuktivit zamanı və dəri yaralanmalarında təzə yarpaqları işlədilir.

Bolqar xalq təbabətində dəmləməsi bədənin tonuslandırıcı və iştah artırıcı kimi istifadə edilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı çiçəklərini 0,5 l qaynanmış suda (gündəlik doza) dəmləyib, gündə 2-3 dəfə yeməkdək 30 dəqiqə sonra qəbul etmək lazımdır.

Bitkinin çiçəkləri sidikqovucu çayın tərkibinə daxil edilə bilər.

Əks göstəriş: Çiçəkləri zəif zəhərləyici olduğu üçün hamiləlikdə istifadəsi məsləhət görülmür.

KIÇIK ISITMƏOTU – *CENTAURIUM MINUS* MOENCH.

Bitkinin istifadə orqanı: Yerüstü hissə çiçəkləyən zaman toplanılır (şək.85).

Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində selik, qensianin (qurdqovucu), flavon qlükozidi, acı qlükozidlər, efir yağları, üzvi turşular və C vitamini vardır. Mavi rəngli çiçəklərinin tərkibində sianin qlükozidi vardır ki, hidroliz zamanı sianidin xlorid və 2 molekul qlikoza əmələ gəlir. Bundan başqa çiçəklərinin tərkibində antosian, pellarqonidin xlorid, sentaurin qlükozidi və sikorinin maddələri vardır.

Xalq təbabətində: Qurdqovucu və alkoqolizm əleyhinə vasitə kimi işlədilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Mədə-bağırsaq xəstəlikləri üçün olduqca qiymətli bitkidir. Tərkibində acı maddələr olduğu üçün iştahartırıcı və mədə-bağırsaq sekresiyasının stimullaşdırıcı kimi tətbiq edilir. Hiposekresiya ilə gedən öd, qaraciyər və ödyolu xəstəliklərində, pankreatit, anemiya və şəkərli diabetdə geniş istifadə edilir. Eksperimental olaraq öyrənilmişdir ki, mavi rəngli isitməotu çiçəkləri sidikqovucu və ödqovucu təsir edir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı bitki 0,5 l qaynanmış suda (6 saat termosda) dəmlənilir (gündəlik doza). Gündə 3 dəfə 20-30 dəqiqə yeməkdən əvvəl isti halda qəbul edilməlidir.

DƏRMAN GÜLÜMBAHARI – *CALENDULA* *OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçək səbəti və dilşəkilli çiçəkləri (şək. 86).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində triterpen saponinləri, acı və aşı maddələri, selik, efir yağları, fitonsidlər, çox miqdarda karotin və karotinoidlər, flavonoidlər və alkqloidlər vardır. Bundan başqa qlikozidlər, fermentlər və üzvi turşular da tapılmışdır. Buna görə də elmi və xalq təbabətində geniş istifadə edilir.

Xalq təbabətində: Şişəleyhinə dərman kimi istifadə edilir. Gülümbahar eyni zamanda ağız və boğaz xəstəliklərində, zədələnmələrdə və trofik yaralarda, genekologiyada-eroziyalarda, trixomonad kolpidlərdə işləlilir. Mensturasiyadan sonra bir həftə ərzində hər gün 1 fincan bu bitkinin çayını içmək məsləhətdir. İltihab əleyhinə olduğundan göz praktikasında da istifadə edilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Sinir sistemini möhkəmləndirir, arterial qan təzyiqini aşağı salır, ürəyin iş qabiliyyətini artırır, ürək ritmini yavaşdır. Nevrozda, hipertoniya, stenokardiyada, ateroskleroz və klimaksda müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Gülümbahar bakterisiddir. Xüsusən stafilokok və streptokok infeksiyalarına qarşı yüksək fəallıq göstərdiyi üçün çiban əleyhinə yaxşı təsir vasitəsidir. Dərinin şişləri, xərçəngi və ziyillərin müalicəsində tətbiq edilir. Qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi, böyrək və ödyolları xəstəlikləri xüsusən sarılıq, bağırsaq xəstəlikləri, mensturasiya pozulmalarında, böyrək və sidik yollarının daş xəstəlikləri və xorah kolidə istifadə edilir.

Hazırlanması: Məhlulunu hazırlamaq üçün 2 xörək qaşığı çiçək 2 stəkan qaynanmış suda dəmlənilir (termosda). 1/2 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul edilməlidir.

Qarışıq şəkildə gülümbahar, gicitkan, bulaqotu və dəmrovotu ilə birlikdə dəmləməsi mədə yarasının müalicəsində olduqca

effektli təsir göstərir. Xarici vasitə üçün məhlul - 4 xörək qaşığı bitki 2 stəkan qaynanmış suda dəmlənir.

Preparat - Tinkurasını və spirtli məhlulunu hazırlamaq üçün 1:10 nisbətində çiçəkləri 70%-li etil spirtində həll edilməlidir. İrinli yaralar, yanıqlar, boğaz xəstəliklərində, angina qarqara, yuxarı tənəffüs xəstəliklərində 1 çay qaşığı 1 stəkan suda həll edilərək, ödəqovucu dərman kimi isə 10-20 damcı qəbul edilir.

Məlhəm «Gülumbahar» (Ung. «Calendula»).

Tərkibi: Gülumbahar məhlulu 20 q, vazelin 90 q. Məlhəm sarımtıl rəngli olur. Yanıqlarda xaricə qəbul edilir.

Əks göstəriş: Bəzi hallarda allergik reaksiya yaradır.

YAĞIOTU – *CHAMAENERIUM ANGUSTIFOLIUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin yuxarı yarpaqları, çiçəkləmə dövründə çiçək və yarpaqları işlədilir (şək.87).

Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində çoxlu miqdarda tanin (10% qədər), piroqal qrupu, çoxlu selik, alkaloid, askorbin turşusu, şəkər və pektin vardır.

Xalq təbabətində: Şiş əleyhinə bitki kimi dünya xalq təbabətində işlədilir. Tibet təbabətində yuxugətirici və ağrıkəsici xüsusiyyətinə görə tətbiq edilir.

Fitoterpevtik göstəriş: Sinir sistemini möhkəmləndirir. Tərkibindəki trankvilizatorlar valeriandan geri qalmır. Enterkolit, ishalla gedən bağırsaq xəstəlikləri, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi və xroniki gastritlərdə işlədilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı bitki 2 stəkan suda dəmlənərək 6 saat ərzində qəbul edilməlidir (gündəlik doza).

ÜÇYARPAQ YONCA (QIRMIZI) – *TRIFOLIUM PRATENSE* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçəkləmə başladıqda çiçək başcıqları ilə birlikdə zirvə yarpaqları toplanılır (şək.88).

Kimyəvi tərkibi: Bitkinin çiçək və yarpaqlarlarının tərkibində qlükozidlər, trifolin izotrifolin, kverşetin, asparagin, tirozin, kumarinlər, salisil turşusu, sitosterol və ramnetin, vitaminlər (askorbin turşusu, E, karotin, B qrup), efir yağ, az miqdarda alkaloidlər, qətran, piyli yağ, üzvi turşular (salisil) və piqmentlər vardır.

Xalq təbabətində: Dünya xalq təbabətində asteniya, avitaminoz, qanazlığı və aterosklerozda işlənir. Qankəsici, öskürəkəsici, büzücü, sidikqovucu və antiseptik təsiri vardır. Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı, ishal, böyrək, uşaqlıq qanaxmaları, baş ağrısı və malyariya xəstəliklərində dəmləmə, eyni zamanda şirə şəklində istifadə edilir.

Hazırlanması: 3 xörək qaşığı quru bitki 2 stəkan qaynar suda 6-8 saat ərzində dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir (gündəlik doza).

Sistitlərdə 1 xörək qaşığı 2-4 saatdan bir, anemiya və hipovitaminozlarda 2 xörək qaşığı gündə 2-3 dəfə qəbul edilir.

Aterosklerozda, qulaqlardan küyü yox etmək və qan təzyiqini normallaşdırmaq üçün 40 q bitki 50 ml 40% -li spirtə 10 gün müddətində həll edərək, axşam yatmadan əvvəl 20 ml qəbul edilməlidir. Kurs müddəti 3 ay.

DƏVƏDABANI – TUSSILAGO FARFARA L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq və çiçəkləri (şək.89).

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində acı qlükozidlər (2,63 %-ə qədər), sitosterin, aşı maddələri, pirrolizidin alkaloidi, qal, çaxır və alma turşuları, askorbin turşusu (5mq%), saponinlər, inulin və dekstrin maddələri vardır.

Xalq təbabətində: Yanıq əleyhinə maddə kimi geniş istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində iltihabsorucu, öskürəkkəsici, büzücü, sidik və tərqovucu maddələr vardır. Dəvədabani bronxit, plevrit, pnevmoniya, difteriya, bronxial astma, bronxoektaziya və qrip xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq edilir. Keyfiyyətli öskürəkkəsici və ödqovucu dərman olduğu üçün vərəmdə, iltihabsorucu xüsusiyyətinə görə mədə-bağırsaq traktı, qara ciyər və öd xəstəlikləri, malyariya, ekzema, böyrək xəstəlikləri və sistitin müalicəsində səmərəlidir. Yanıqlarda, frunkulyoz, tromboflebit, angina və stomatitlərdə xaricə işlədilir.

Hazırlanması: 3 xörək qaşığı çiçək və ya yarpaqları 2 stəkan qaynar suda dəmlənərək (termosda) gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır (gündəlik doza). Bu tərkib həm də xaricə tətbiq edilə bilər.

Əks göstəriş: Uzunmüddətli qəbulu kanserogen təsir edir.

SIĞIRQUYRUĞU – *VERBASCUM THAPSIFORME* SCHRAD. (= *V. DENSIFLORUM*)

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçək qönçələri. Ləçəkləri ilə birlikdə kasacıqları da işlədilir. Yağışlı havada toplamaq olmaz (şək. 90).

Kimyəvi tərkibi: Bitkinin yerüstü hissəsinin tərkibində saponinlər, efir yağları (izi), şəkər (ümumi miqdarı 11% qədər, qlukoza 3,5%), digər karbohidratlar (11-12%), rəngləyici maddələr: a kroçetin, kumarin, b karotin və flavanoidlər vardır.

Çiçəklərinin tərkibində şəkər (11%), selik, qlükozid, saponin, flavanoid, az miqdarda yağlar, qatran, kumarin, rəngləyici maddələr və aukutin qlükozidi vardır. Müalicəvi təsirə malik olan bitkinin tərkibində olan selik, saponin və efir yağlarıdır.

Xalq təbabətində: Çiçək qönçələrinin məhlulu bronxit, ağciyər və bronxial astma, mədə-bağırsaq traktı və ödyolu xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq edilir. Xaricə (dəri) təmizləyici dərman və kompres şəklində işlədilir. Digər bitkilərlə birlikdə qarqara, imalə, irriqasiya, eksudativ diatezdə vanna kimi qəbul edilir. Saçın kəpək verməsində (seборея) istifadə edilir. Yumşaldıcı, bürüyücü, öskürəkkəsici xüsusiyyətləri olduğundan, ağciyər, mədə-bağırsaq və böyrək xəstəliklərində işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Elmi təbabətdə çiçəklərindən istifadə edilir. Tərkibində öskürəkkəsici və yumşaldıcı (saponin, selik) maddələr vardır.

Hazırlanması: 2-3 xörək qaşığı bitki gecə 0,5 l qaynar suda (termosda) dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir (gündəlik doza).

Əks göstəriş: Yüksək həssaslıq.

İKİEVLI GİCİTKAN – *URTICA DIOICA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçəkləyən zaman yarpaqları yığılır.

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarında askorbin turşusu (269 mq%), karotin və karotinoidlər (50 mq%), üzvi turşular (qarışqa, pantoten), B və K vitaminləri vardır. Bitkidə aşı maddələri, mikroelementlər, fitonsidlər, protoporfirin, koproporfirin, urtisin qlükozidi, kofein, p-kumarin, ferulin – asetilxolin, histamin və 5-hidroksitriptamin maddələri aşkar edilmişdir.

Xalq təbabətində: Podaqra, revmatizm, diatez, ekzema, hipotalaktiya (süd ifrazının azlığı), şəkərli diabet, hemorroy, mal-yariya və piylənmələrdə tətbiq edilir. Cavan bitkinin şirəsi öd və böyrək daşlarının əridilməsinə kömək edir. Gicitkanın kökü öd və böyrəklərdə «ilişib qalan» daşların xırdalanaraq xaric edilməsi üçün olduqca yaxşı dərmandır. Bunun üçün ən yaxşı gicitkanın toxumu hesab olunur. Dəmləməsi yanıq, yara və zədələnmələrdə dərinin regenerasiya prosesini normallaşdırır. Xaricə tətbiqində yanıqlarda, yaraların müalicəsində, ekzemada, dəri qaşınmalarında, oynaq revmatizmində (zəif isladıcı) əvəzedilməz hesab olunur.

Fitoterapevtik göstəriş: Asteniya, qanaxlıq, arterial hipotenziyada və maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsində istifadə edilir. Nevroz, isteriya, bronxit, pnevmoniya, bronxial astma, vərəm, difteriya, iştahasızlıq, ishal, qəbizlik, qastrit, enterkolit epilepsiya və ateroskleroz xəstəliklərində işlədilir. Qaraciyər və öd yolları, sidikqovucu və iltihabəleyhinə dərman kimi nefrit, pielonefrit və sistitin müalicəsində istifadə edilir. Sidikqovucu və orqanizm möhkəmləndirici dərman kimi, I-II dərəcəli ürək-damar xəstəliklərində istifadə edilir. Uşaqlığın tənusunu yüksəldərək qankəsici təsir edir, klimakterik qanaxmalarda, uşaqlıq fibromasında, doğuşdan və abortdan sonrakı qanaxmalarda, iltihabı proseslərdə istifadə edilir.

Hazırlanması: Məhlul: 3 xörək qaşığı bitki 2 stəkan qaynar suda (termosda) dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir (gündəlik doza).

Xaricə yüksək konsentrasiyada gündə 2 dəfə qəbul edilir.

SINCANOTU – *SANGUISORBA OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökümsov və kökləri (şək.91).

Kimyəvi tərkibi: Kökümsov və köklərində aşı maddələri (20% qədər), piroqal qrupu – qall turşusu, rəngləyici maddələr, saponinlər, nişasta və efir yağı vardır.

Xalq təbabətində: Güclü büzücü, ağrıkəsici, iltihabsorucu və qankəsicidir. Mədə-bağırsaq xəstəliklərində, müxtəlif etiologiyalı ishalda, spesifik olmayan xorali kolitlərdə, xroniki enterkolitdə, ağ ciyər qanaxmalarında, öd, bağırsaq, hemorroy, böyrək və uşaqlıq qanaxmalarında, menstruasiyada və aşağı ətrafların tromboflebitində istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Dəmləməsi (daxilə) bağırsaq çöpləri ilə əlaqə yaradaraq, dizinteriya və paratifoz qrup mikroblarının məhv edilməsinə kömək edir.

Gec sağalan yanıq və yaralarda, stomatit, gingivit, angina, trixomonad kolpit və vaginitdə xaricə tətbiq edilir.

Hazırlanması: Büzücü və qankəsici dərman kimi ishalda, qan-hayxırmada, uşaqlıq qanaxmalarında 30-50 damcı gündə 3-5 dəfə qəbul etmək olar.

Kökünü 1 xörək qaşığı 1 stəkan qaynar suda dəmləyərək, gündə 1 xörək qaşığı 5-6 dəfə almaqla, içmək olar.

Əks göstəriş: Hamiləlik.

DƏRMAN ZƏNCİROTU – *TARAXACUM OFFICINALE* WIGG.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökü və yerüstü hissələri (şək.92).

Kimyəvi tərkibi: Zəncirotunun köklərində vitaminlər, karotin, sterol, karotin, flavanoidlər, aşı və mineral maddələr (bollucu kalsium), mikroelementlər, efir yağı, triterpenlər, inulin (24%-ə qədər), kaucuk (3%-ə qədər), β sitositerin, yağ, turşu qliseridləri (palmitin, olein, linol və serotin) maddələri vardır.

Xalq təbabətində: Bu bitki xalq təbabətində ümumi öhkəmləndirici, qan azlığı, asteniya, sinir sistemi xəstəlikləri, qanda xolesterinin miqdarını azaldan preparat kimi tətbiq edilir. Nevroz, qaraciyər, öd yolları, sarılıq, mədə və bağırsaq, zəiflik və ateroskleroz, revmatizm, podaqra, allergik və böyrək daşı xəstəliyi, hemorroy, frunkulyoz və s. zamanı istifadə edilir. Laktaisya prosesini normallaşdırır. Müxtəlif dəri xəstəliklərində istifadə edilir.

Alman xalq təbabətində böyrək və sidik yolları, bağırsaq, böyrəkdaşı xəstəliyi, ağır infeksiyalarda, qanazlığında, revmatizm, podaqra və avtaminozlarda məsləhət görürlər.

Əbu-Əli İbn-Sina bitkinin təzə şirəsinin qan-damar durğunluqlarında və əqrəb sancmalarında istifadəsini təklif edir.

Rus xalq təbabətində bu bitki «həyat eleksiri» adlanır.

Orta Asiyada qanazlığında, ümumi halsızlıqda, «döş inağında», qaraciyər, aterosklerozda istifadə edilir. Kökləri və yarpaqları salat kimi yeyilir və kofe ilə qəbul edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Xroniki mədə-bağırsaq traktı, xüsusilə qəbizlik müşayiət olunan hallarda işlədici kimi, qaraciyər, öddaşı, sarılıq zamanı istifadə olunur. Kök və yarpaqları sidikqovucudur, iltihabı proseslərdə, hepatit, nevroz, ateroskleroz, qanazlığında işlədilir və tonuslandırıcı təsirə malikdir. Bundan baş-

qa podaqra, revmatizm, babasil, frunkulyoz xəstəliklərində tez-sağaldıcı təsir edir. Acı olduğu üçün iştahlandırıcı, ödqovucu, diuretik, qurdqovucu xüsusiyyətə də malikdir.

Fransız elmi təbabətində zəncirotundan xroniki qaraciyər, xəstəliklərinə təsir edərək qanda xolesterinin miqdarını aşağı salırlar. Cavan yarpaqlarının dəmləməsi qanın tərkibini yaxşılaşdırır. Fransada kulturada becərilir.

Bolqar elmi təbabətində cavan yarpaqlarını ateroskleroz, anemiya, C avitaminozu, dəri xəstəliklərində qəbul edilməsi məsləhət görülür. Yaz və payız aylarında qaraciyər və böyrək xəstəlikləri zamanı qəbul etdikdə orqanizmdəki şlakları çıxarır. 4-6 həftədən çox qəbul edilməlidir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı kökü və ya bütöv bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda) içmək lazımdır (gündəlik doza). Gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul etmək məsləhətdir. Spirtli məhlulu 1:10 nisbətində hazırlanmalıdır. 5-10 (15) damcı yatmadan 2-3 saat əvvəl yuxusuzluq və temperatura hallarında qəbul edilməlidir.

Miksturası: zəncirotu kökü 100q, spirt 90⁰ -15ml, qliserin - 15ml, su 17 ml. Gündə 3 dəfə hər dəfə 1-2 xörək qaşığı qəbul edilməlidir.

Hər gün bitkinin 50-100 qram şirəsini qantəmizləyici maddə kimi qəbul etmək məsləhətdir.

Əks göstəriş – İshal.

ADI QUŞƏPPƏYİ – *CAPSELLA BURSA - PASTORIS* (L.) MEDIC.

Bitkinin istifadə orqanı: Bütün yerüstü hissəsi (şək.93).

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində alkaloidlər (0,033-0,66%), aminlər (triamin, xolin, asetilxolin, tiramin), inozit, qlikozidlər (0,059%), qissopin ramnoqlikozidi, saponinlər, aşı maddələri, pirokatexin qrupu (3,3%), C vitamini (120-198mq%), K vitamini (0,27mq%) və kül (6,46%) elementi tapılmışdır. Toxumlarında piyli yağ (28%) və xardal yağı vardır. Tərkibində K vitamini, bor, qissopin, çaxır, fumarin, askorbin və alma turşuları, flavanoidlər, çoxlu kalium, peptid, inozit, saponinlər, fitonsidlər vardır.

Xalq təbabətində: Təzə yarpaqları diabet xəstəliyinin müalicəsində istifadə edilir. Ekstraktı uşaqlıq qanaxmalarını kəsir.

Fitoterapevtik göstəriş: Eksperimental olaraq öyrənilmişdir ki, quşəppəyi uşaqlıq əzələsini möhkəmləndirir və periferik sistemi oyadır. Yarpaqları fitonsid təsirə malikdir.

Hipotenziv, hərərətsalıcı, büzücü və sidikqovucu xüsusiyyətə malikdir. Təzə bitkidən hazırlanmış şirə güclü qankəsicidir. Hipertoniya və ateroskleroz xəstəliyində təyin edilir. Yazda cavan yarpaqları salat kimi yeyilir. Dəmləməsi başlıca olaraq mədə-bağırsaq traktı, ishal, öd və böyrəkdaşı, maddələr mübadiləsi pozğunluğu ilə gedən podaqra və revmatizm xəstəliklərində işlədilir. Quşəppəyi əsasən yaxşı qankəsici maddə kimi uşaqlıq, mədə və böyrək qanaxmalarında tətbiq edilir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda 10 dəqiqə dəmləyərək, gün ərzində 2 fincan içmək lazımdır (gündəlik doza).

Qarışıq kimi ürək və qan dövranı pozğunluqlarında quşəppəyi 10q, yemişan 10q, valerian 5q, bədrənc 5q olmaqla hazırlanaraq, 2 çay qaşığı 250ml suda 10 saat ərzində dəmlənərək isti halda qəbul edilməlidir. Eyni dozada qatırquyruğu ilə birlikdə ağciyər, revmatizm, qaraciyər, podaqra, burun-qulaq və boğaz infeksiyalarında qəbul edilə bilər.

Preparat – Quşəppəyi ekstraktı (Extr. Bursae pastoris fluidum). Ekstrakt (1:1) nisbətində 70% spirtli məhluludur. 20-25 damcı gündə 2-3 dəfə içmək olar.

Əks göstəriş: Hamiləlik, tromboflebit. Bitkiyə qarşı sinir sisteminin həssaslığının artması.

BAHAR XORUZGÜLÜ – *PRIMULA VERIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yerüstü hissələri və çiçəkləri (şək. 94).

Kimyəvi tərkibi: Zəhərlidir! Tərkibi saponinlər (5-10%), efir yağı, flavanoidlər, silikat turşusu, aşı maddələri və fenol qlükozidlərindən (primulaverozid və primverozid) ibarətdir. Biokimyəvi tərkibi tamamilə öyrənilməmişdir.

Xalq təbabətində: Miqren, nevroziya, podaqra, revmatizm və halsızlıq hallarında işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibi çoxlu miqdarda askorbin turşusundan ibarət olduğu üçün yazda salat kimi qəbul edilir. Qurumuş bitkidən qrip, angina, bronxit, pollinoz və rinosinuitlərin müalicəsində istifadə edilir. Bahar xoruzgülünün zəif sedativ və yuxugətirici xüsusiyyətinə görə miqren, nevroz və zəiflik hallarında istifadə edilir. Kökləri yaxşı öskürəkkəsici maddədir. Tərkibindəki saponinlər xüsusən quru öskürəyi kəsmək üçün çox faydalıdır. Ürək döyünməni azaldaraq, ürək və ağciyərin qanla təchizini yaxşılaşdırır. Tərkibinə bu bitkidən başqa əməkəməci daxil etdikdə soyuqdəymə və öskürək hallarında işlətmək məqsədəuyğun sayılır. Ürək qan dövranının təchizini yaxşılaşdırır və ürəkdöyünməni azaldır. Qalxanabənzər vəzinin hiperfunksiyasını normallaşdırır. Böyrək və sidik yollarının daş və qumlarını (konkrement) təmizləyir. Gündə 2-3 dəfə hər dəfə 5-10 damcı, güclü tutmalarda isə 20 damcı qəbul etmək olar. Yüksək dozada və ya uzun müddət qəbulu təngnəfəslik və qusma verir. Qalen preparatlarına daxildir.

Hazırlanması: 2-3 xörək qaşığı bitkini 0,5 l qaynar suda dəmləyərək (termosda), içmək lazımdır (gündəlik doza). Xoruzgülü kökümsovu 30, cırə 10, əməkəməci 10, razyana 10 qram qarışdırılır, 2 çay qaşığı 250q qaynanmış suda 10 dəqiqə həll edərək isti halda bal ilə qəbul etmək lazımdır.

QAZ QAYTARMA – *POTENTILLA ANSERINA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin yürüstü hissəsi və toxumları (şək. 95).

Kimyəvi tərkibi: Demək olar ki, öyrənilməmişdir. Tərkibində çoxlu miqdarda aşı maddələri və qlükozidlər (tormentol, tormentillin) vardır.

Xalq təbabətində: Gənc qadınların menstruasiya pozğunluqlarında, erkən başlayan klimaks zamanı tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Ağrıkəsici, tonuslandırıcı, büzücü və antiseptik təsirə malikdir. Astenik vəziyyətlərdə, enterkolit, ishal, qara ciyər və ödyolu xəstəliklərində işlədilir. Şirə kimi xaricə yara, primoçka və kompress şəklində tətbiq edilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda), içmək lazımdır (gündəlik doza). Cavan bitkinin şirəsini gündə 3 xörək qaşığı olmaqla, öd və böyrəkdaşı xəstəliklərində qəbul etmək məsləhət görülür.

DÜZ QAYTARMA – *POTENTILLA ERECTA* (L.) RAEUSCH.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökümsovları (şək.96).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində çoxlu miqdarda aşı maddələri (14% -ə qədər) və qlükozidlər, tormentillin, tormentol efiri, xinin turşusu, qətran, flobafen, nişasta, kamed vardır.

Xalq təbabəti və fitoterapevtik göstəriş: Xalq və elmi təbabətdə büzücü, iltihab əleyhinə, bakterisid, qan laxtalandırıcı xüsusiyyətlərinə görə tətbiq edilir. İltihabsorucu xüsusiyyətinə görə mədəbağırsaq, kəskin və xroniki ishal, ağ ciyər, podaqra, revmatizm, kəskin və xroniki qara ciyər, öd xəstəliklərində və ginekoloji qanaxmalarda istifadə edilir. Öskürəkkəsici və ödqovucu təsiri də vardır. Dəridə yaralanma, səpgi və ekzemalarda, hemorroyda, qızartılarda istifadə edilir. Ağız və boğaz xəstəliklərində qarqara etmək məqsədəuyğundur. Qarışıq bitki çaylarının tərkibinə büzücü kimi əlavə edilir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı kökümsovu 1 stəkan qaynar suda 15-20 dəqiqə dəmləyərək (termosda), 1-2 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır (gündəlik doza).

MAY İNCİÇİÇƏYİ – *CONVALLARIA MAJALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq, çiçək, toxum və bütöv bitki (şək.97).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində ürək qlükozidləri – konvallotoksin, dezqlükoxeyrotoksin, konvallozid vardır.

Xalq təbabətində: Ürək xəstəliklərində, müxtəlif etiologiyalı ödemlərdə sidikqovucu kimi, nevroz, epilepsiya, yüksək hərarət zamanı istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Bitki Qərbi Avropada orta əsrlərdən elmi təbabətdə tətbiq edilir. Kardial tipli neyrosirkulyar distoniyada, isteriya, yüngül formalı toksiki zobun müalicəsində işlədilir. Müalicəni valerian və yemişanla birlikdə apardıqda daha səmərəli olur.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı bitki 200 ml qaynar suda dəmlənərək gündə 1-2 xörək qaşığı 3-4 dəfə olmaqla, yeməkdən əvvəl qəbul edilməlidir.

Preparat – *İnciçiçəyi məhlulu (T-ae Convallariae)*. 1:10 nisbətində spirt (70%). Böyüklər 15-20 damcı, uşaqlar isə 1-12 damcı gündə 2-3 dəfə qəbul edə bilər.

Əks göstəriş: Olduqca zəhərləyici bitki olduğundan həkim məsləhəti ilə tətbiq edilməlidir. Tərkibində qlükozid çoxdur, qlükozidlər tez, lakin kumlyativ təsir edirlər. Yəni orqanizmdə çöküntü əmələ gətirirlər. Ona görə də qlükozidlərlə uzun müddət müalicə aparmaq olmaz, orqanizm zəhərlənə bilər.

GÖVƏN – *ASTRAGALUS DASYANTHUS* PALL.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökü və yarpaqlarıdır (şək.98).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində qətran, polisaxarid (bassorin və arabin), nişasta, şəkər, selik və üzvü turşular vardır.

Xalq təbabətində: Müalicəvi cəhətləri olduqca az öyrənilmişdir. Bəzi kəndlərdə gəvənin gövdə zoğlarının içərisindən toplanmış yağlar zəif heyvanlara yedizdirilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Sedativ, hipotenziv və damargenişləndirici xüsusiyyətə malik olduğundan, nevroz, hipertoniya, I-II dərəcəli xroniki ürək-damar çatmamazlığı, kəskin və xroniki nefrit xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Tərkibində güclü diuretik maddə vardır.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı bitki 250 ml qaynanmış suda dəmlənərək, 1/2 stəkan gündə 3 dəfə 20-40 dəqiqə yeməkdən sonra qəbul edilməlidir.

DƏRMAN ÇATILOTU – *EUPHRASIA OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bütün orqanları (şək.99).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində efir yağları (0,17%), piyli yağ, acı maddələr, qətran, mavi rəngləyici maddə, hallotonin və aukubin qlükozidi vardır.

Xalq təbabətində və fitoterapevtik göstəriş: Göz xəstəlikləri üçün olduqca əvəzolunmaz bitkidir. Bu məqsədlə daxilə dəmləmə, xaricə isə isladıcı şəkildə istifadə edilir. Bundan başqa digər bitkilərlə ürək xəstəlikləri, qastrit, enterkolit və diskenziyada qarışıq şəkildə istifadə edilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı bitkini 0,5 l qaynar suda dəmləyərək (termosda) içmək lazımdır (gündəlik doza). Islatma şəkildə istifadə etdikdə 4 xörək qaşığı bitkini 0,5 l qaynar suda dəmləmək lazımdır.

ADI TOPPUZTIKAN – *ECHINOPS RITRO L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri (şək.100).

Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində 1,5-2,0% exinopsin alkaloidi vardır, gövdə və yarpaqlarında isə bu alkaloid olduqca azdır. Meyvələrinin tərkibində 28% -ə qədər piyli yağlar vardır.

Xalq təbabətində: Çin xalq təbabətində toppuztikan qankəsici, kardiotonik və iltihabsorucu maddə kimi tətbiq edilir. Meyvələri kardiotonik dərman kimi hipertoniya xəstəliyi və aterosklerozda faydalıdır.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində tonuslandırıcı və orqanizm möhkəmləndirici maddələr vardır. Buna görə də sinir sisteminin zəifliyində və iflic xəstəliklərində tətbiq edilir. Effektiv sinir-əzələ stimulyatorudur. Arterial hipotenziya, miopatiya, periferik iflic və parezlərdə, pleksitdə, radikulit, xroniki şüa xəstəliyi, polimielit xəstəliklərini müvəffəqiyyətlə müalicə edir. Klinik tədqiqatlara görə exinopsin maddəsi bel-oma radikuliti, üz sinirinin iflici və amiotrofik sklerozun müalicəsində istifadə edilir. Eyni zamanda görmə sinirinin atrofiyasında və oftalmoplegiyada da tətbiq edilir. Az toksikidir, zəif dozaları əksicinslər arasında cinsi fəaliyyəti artırır, qızıqdırır rol oynayır. Yüksək dozaları orqanizmdə qıcolmalar yaradır. Medinal preparatının antaqonistidir. Bu bitkini az dozada qəbul etdikdə qan təzyiqini artırır, yüksək dozalarda isə aşağı salır. Exinopsin alkaloidi iflic və parezlərdə, pleksit, radikulit, hipotoniya, miopatiya, xroniki şüa xəstəliklərində və polimielitdə olduqca səmərəlidir.

Hazırlanması: 2-3 çay qaşığı meyvələri 1 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda) içmək lazımdır (gündəlik doza).

Exinopsin-nitrat 0,4% ampullarda (Sol. Exinopsini-nitratis 0,4%-1,0) 1 ml dərliatına sutqada 1-3 dəfə vurmaq lazımdır. Müalicə kursu 3-4 həftədir.

1%-li 20 ml exinopsin-nitrat məhlulu adı ilə buraxılır. Yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl, gündə 2 dəfə 10-20 damcı qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 3-4 həftədir.

2 xörək qaşığı adi toppuztikanı 500 ml qaynar suda dəmləmək lazımdır. Başqa üsulla 3q nazik doğranmış köklərini 250ml soyuq suda 5 saat saxlayıb, süzərək gündə 3 dəfə hər dəfə 1 xörək qaşığı qəbul etmək olar.

Xırdalanmış kökləri 20q 250ml suda dəmlənərək gündə 3 dəfə diabetdə qəbul edilir.

Əks göstəriş: Zəhərli bitkidir. Hamiləlik.

DAĞTƏRXUNU – *TANACETUM VULGARE L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçək səbəti. Bitkini çiçəkləyən zaman toplamaq lazımdır (şək.101).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində efir yağları (0,3%), çoxlu miqdarda β tuyen, aşı maddələri, qlikozid, vitaminlər, kamfora, bornela, pinen, α tuyen və tuyol vardır. Çiçəkləyən zaman tərkibində efir yağları, acı, aşı maddələr, flavanoidlər (lütenolin, kvarsetin), üzü turşular, C vitamini (8 mq%), az miqdarda alkaloidlər, terpenlər isə daha çox toplanılır.

Xalq təbabətində: Sinir xəstəlikləri, epilepsiya, miqren, kəskin infeksiyon respirator xəstəliklər, ağciyər vərəmi, öd, hepaxolesistit və xolangit xəstəliklərində geniş şəkildə tətbiq edilir. Qan təzyiqini yüksəldir. Dağtərxunu yaxşı qurdqovucu təsirə malikdir. Əsasən askarid və bizquyruq qurdları salır. Bitkinin həm də insektisid xüsusiyyəti olduğundan müxtəlif həşəratların qovulmasına təsir edir. Ödqovucu bitki kimi hepatit, xolesistitdə və spazməleyhinə dərman kimi istifadə edilir. Bundan başqa nevroz, epilepsiya, tənəffüs yollarının iltihabı, baş ağrısı, öd xəstəliklərində istifadə edilir. Zəhərli olduğundan hamiləlikdə istifadə etmək olmaz. Antihelment, insektisid maddədir.

Fitoterapevtik göstəriş: Bitkinin efir yağı ən yaxşı qurdqovucudur. Bizquyruq və askarid helmintlərinin qovulmasında effektiv dərman sayılır.

İngilis təbabətində miqrinin profilaktikasında istifadə edilir. Eksperimental hepatitlərdə dağtərxunu sekresiyanı artırır, seliyyin və ödün miqdarını azaldır. Mədə-bağırsaq əzələsinin tonusunu normallaşdırır, dəmləməsi ürək ritmini azaldır, arterial təzyiqi və öd ifrazını artırır. Efir yağı qurdqovucu və antimikrob olmaqla, son dərəcə zəhərlidir. Bolqar təbabətində antiseptik, spazmalitik və qurd əleyhinə dərman kimi az dozaları mədə-bağırsaq xəstəliklərində işlədilir.

Əsəb, mədə spazmında, sidik yollarının iltihabında, böyrəkdaşı xəstəliklərində, baş ağrısı, podaqra, malyariya xəstəliklərində tətbiq edilir.

Fransa təbabətində çiçəkləri qurdaleyhinə, temperaturasalıcı, tonuslandırıcı, və antiseptik kimi işlədilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı bitkini 0,5 l qaynar suda dəmləyərək (termosda) içmək lazımdır (gündəlik doza). 5%-li məhlulu (70-105 ml) gündə 2-3 dəfə mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasında qəbul edilir. 5q çiçəkləri 1l qaynanmış suda dəmlənib, gündə 1-2 dəfə qəbul edilir. Revmatizmdə 50q çiçəklərini 1 litr çaxırda 8 gün saxlamaq lazımdır. Hər dəfə 30-40q günorta və axşam qəbul etmək lazımdır. Qurd əleyhinə hər birindən 8q yovşan, çobanyastığı və dağtərxunu 250 ml qaynanmış suda dəmləyib, imalə edirlər.

Amerikada dağtərxunu və qozdan birlikdə likyor hazırlanır və ətin konservləşdirilməsində istifadə edilir.

Əks göstəriş: Hamiləlik. Bitki zəif zəhərləyici xüsusiyyətə malikdir.

BÖYÜK BAĞAYARPAĞI – *PLANTAGO MAJOR L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq, kök və toxumları.

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində aşı və acı maddələr, karotin, indekan qlükozidi, aukubin, askorbin turşusu (42,2 mq%), K vitamini, alkaloidlər, flavanoidlər, mannit, sorbit, üzvi turşular (limon və olein) vardır. Toxumlarının tərkibində çoxlu miqdarda selik (16% qədər), yağ (20%) və planteoza karbohidratı (0,17%) vardır.

Xalq təbabətində: Bədxassəli şişlərin, mədə, bağırsaq, qara-ciyər, böyrək, şəkər, sonsuzluq, xroniki xora, qanaxma və ağciyər xəstəliklərinin müalicəsində məsləhət görülür. Bağayarpağının dəmləməsi temperatura və öskürəklə müşayiət olunan ağ ciyər vərəmində ağrıkəsici, müxtəlif həşərat və ilan zəhərinin orqanizmdən təmizlənməsində əvəzsiz bitkidir. Xroniki ishalda bitki və toxumundan istifadə edilir. Yarpaqları elmi təbabətdə dəri xəstəliklərində yaralanma, frunkulyoz və döyənəkli xoralar-da, islatma şəklində isə əsasən irinli dəri xəstəliklərində işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Bitki iltihabsorucu, bakterisid, yarasagaldıcı, öskürək və qankəsici, sidikqovucu və hipotenziv təsirə malikdir. Hipertoniya və aterosklerozda daha çox tətbiq edilir. Yarpaqlarının şirə və dəmləməsi yaxşı öskürəkkəsici maddə olduğundan kəskin və xroniki tənəffüs yolu xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə işlədilir. Bundan başqa mədə-bağırsaq traktı, qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, kəskin və xroniki enteritdə, xoralı kolitdə işlədilir. Bağayarpağı ishal, dizinteriya və vərəm xəstəliyinin müalicəsində olduqca effektivdir.

Hazırlanması: 1-3 çay qaşığı (5-15q) bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmlənərək, gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır (gündəlik doza).

Bikinin ovuntusunu (paroşok) gündə 3-4 dəfə 1 qramdan artıq olmayaraq yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır.

Ağciyər və mədə xərçəngi zamanı-bitkinin təzə yarpaqlarını azarək üzərinə doyana qədər şəkər tozu əlavə etmək və isti yerdə 2 həftə saxlamaq lazımdır. 1 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Qanaxmalarda 2 xörək qaşığı quru bitki, 2 xörək qaşığı gicitkan 2 stəkan qaynar suda dəmlənərək qəbul edilməlidir (gündəlik doza).

Əks göstəriş: Mədə turşuluğu ilə müşayət olunan gastritlər.

BÖYRƏK ÇAYI (Ortosifon) – *ORTHOSIPHON* *STAMINEUS BENTH.*

Bitkinin istifadə orqanı: Zirvə yarpaqları (şək.102).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində efir yağı, ortosifonin qlükozidi, saponinlər və aşı maddələri vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Hipotenziv təsir göstərir, maddələr mübadiləsini normallaşdırır. Güclü sidikqovucu təsir etməklə, sidik turşusu və xlorid ionlarını orqanizmdən kənar edir. Bitkinin dəmləməsi arterial hipertenziya, ateroskleroz, sidik turşusu dia-tezi və podaqra xəstəliklərində təyin edilir. Ürək-damar siste-minin çatmamazlığı zamanı ödemənin əmələ gəlməsində, kəskin və xroniki böyrək və sidik yolları xəstəliklərində qlomerulonef-ritdə, pielonefritdə, böyrəkdaşı xəstəliyində, sistit və uretritdə, hipoqastritdə, xolesistit və qaraciyər xəstəliklərində tətbiq edilir.

Hazırlanması: 3-3,5 q bitki yarpaqlarını 1 stəkan qaynanmış suda 30 dəqiqə dəmləmək lazımdır. Böyrək çatmamazlığı ilə müşayət olunan ödəmlərdə gündə 2 dəfə 1½ stəkan yeməkdən 20-30 dəqiqə sonra içmək lazımdır.

Xolesistit zamanı da belə tərkiblə müalicə edilməlidir.

Rp.: Inf. fol. Orthosiphoni 3,5 : 200 ml

D.S. 1½ stəkan gündə 2 dəfə qəbul etməli.

TÜKCÜKLÜ DAMOTU – *LEONURUS* *QUINQUELOBATUS* GILIB.

Bitkinin istifadə orqanı: Zirvə yarpaqları (şək.103)

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində alkaloid, şəkər, acı və aşı maddələr, efir yağı (0,66%), p- kumarov turşusu, askorbin turşusu və karotin, flavanoidlər (kversetin, rutin, kvinkvelozid) və qlükozidlər vardır. Kimyəvi tərkibi tamamilə öyrənilməmişdir.

Xalq təbabətində: Möhkəmləndirici, iltihab əleyhinə, ağciyər ödemində sidikqovucu, vərəm, anemiya və xlorozda istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Hipertoniya xəstəliyinin I-II dərəcələrində yaxşı hipotenziv təsirə malik olur. Mərkəzi sinir sistemində sedativ təsir göstərməklə, ürəyin ritmini azaldaraq onun gücünü artırır. İsteriya, nevroz, stenokardiya, kardioskleroz, miokardit və tireotoksikoz xəstəliklərini müvəffəqiyyətlə müalicə edir. Bundan başqa xoreya (revmatik əsmə), klimakterik şikayətlərdə və normal olmayan menstruasiyalarda təyin edilir.

Hazırlanması: 1-2 xörək qaşığı bitkini 1,5-2,5 stəkan qaynar suda dəmləyərək, gündə 3 dəfə içmək lazımdır (gündəlik doza). Preparat – Şirquyuğu məhlulu (T-ae Leonuri). 70% spirtə (1:5) nisbətində məhlulu. 30-50 damcı gündə 3-4 dəfə qəbul etməli. Flakonlarda 25ml buraxılır.

Əks göstəriş: Arterial hipotenziya, bradikardiya.

ÜRƏK DAMOTU - *LEONURUS CARDIATA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Gövdə, çiçək və yarpaqları (şək. 104).

Kimyəvi tərkibi: Gövdə və yarpaqlarında flavanoidlərdən rutin, kvikvelozid, alkaloidlərdən staxidrin (leonuridin), xolin, efir yağı (0,03-0,05%), acı və aşı maddələri (2,14%), saponinlər, C vitamini, kül (11%), alkaloidlər, sedativ və spazmolotik maddələr vardır.

Xalq təbabətində: Yarpaqlarının dəmləməsi, spirtli məhlulu, ekstraktı ürək və əsəb xəstəliklərində, psixi zəiflikdə, klimaks zamanı, bərk qorxu keçirdikdə, meteorizmdə müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Yemişan və valerianla birlikdə dəmləməsi ürək nevrozunun müalicəsində tətbiq edilir. Möhkəmləndirici, oyandırıcı, qorxu zamanı sakitləşdirici, qurd qovucu, mədə ağrıları və zob əleyhinə işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Valerianla birlikdə tətbiqi əsəb və hipertoniya xəstəliyində işlədilir. Məhlulundan 30-40 damcı, ekstraktından 15-20 damcı gündə 3-4 dəfə qəbul edilir.

Hazırlanması: 15,0:250,0 nisbətində qaynanmış su ilə bitkinin qurudulmuş yuxarı yarpaqlarını 10 dəqiqə ərzində dəmlənərək, gündə 3-5 dəfə (2-4 həftə ərzində) hər dəfə 1 fincan qəbul edilir.

Ateroskleroza və yuxusuzluqda aşağıdakı kimi istifadə edilir: ürək damotu 20q, daziotu 15q, yemişan 10q, bədrənc yarpağı 10q, valerian kökü 5q. 250 ml qaynanmış suda 2 çay qaşığı qarışığı 10 dəqiqə ərzində dəmlənərək, gündə 3-5 dəfə (2-4 həftə ərzində) hər dəfə 1 fincan yeməkdən 5 dəqiqə sonra qəbul edilir.

Əks göstəriş: Yüksək həssaslıq və uzun müddətli müalicə.

AYRIQOTU – *AGROPYRON REPENS* (L.) PAL.-BEAUV.

Bitkinin istifadə orqanı: Yerüstü hissə və kökümsovları (şək.105).

Kimyəvi tərkibi: Gövdə və kökümsovlarının tərkibində efir yağları (0,05%), aqropiren karbohidratı, selik (10% qədər), polisaxaridlərdən – tritiçin, inulin, inqzit, fruktoza, levuleza, saponin, azot saxlayan rezinəbənzər maddələr (1% qədər) və vanilin vardır.

Xalq təbabətində: Yarpaqlarından və kökümsovlarından çıxarılmış şirə yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəliklərində – bronxit və pnevmoniyada müsbət nəticə verir. Tumurcuqları maddələr mübadiləsi (mineral mübadilə) – sidik, öddəsi xəstəliklərində, assit, uretrit, sistit, hepatit, metabolik artrit və osteoxondrozda yaxşı səmərə verir. Dəri xəstəliklərində, diatezdə, raxit və hemorroyda da səmərəli olduğu təsdiq edilmişdir (müalicə kursu 10-15 vanna).

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində öskürəkkəsici, tərqovucu və sidikqovucu maddələr olduğu üçün bir sıra preparatlara qatılır. Tumurcuqları eyni zamanda frunkulyozda, “*acne vulgaris*” və digər dəri xəstəliklərində çox yaxşı təsir vasitəsidir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı kökünü axşam 0,5 l qaynar suda dəmləyərək (termos), gündə 3 dəfə 20-40 dəqiqə yeməkdən əvvəl isti halda içmək lazımdır.

Təzə hazırlanmış şirəsi: 0,5-1 stəkan gündə 3-4 dəfə 20-40 dəqiqə yeməkdən əvvəl 3-4 ay içmək məsləhətdir.

Vanna üçün dəmləməsi: 50 q kökümsovlarını 5 l suda qaynardaraq üzərinə soyuq su əlavə edərək vanna qəbul etmək lazımdır.

RƏVƏND (UŞQUN) – *RHEUM RIBES L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Kök və kökümsovları (şək.106).

Kimyəvi tərkibi: Kök və kökümsovlarının tərkibində antraxinon, antraqlükozidlər (6% qədər), sərbəst aqlükon (reumemodin, xrizofenol, rein), aşı maddələri, qətran, tannoqlükozidlər (10% qədər), rutin, üzvi turşular və katexin maddələri vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Başlıca olaraq güclü sakitləşdirici təsir göstərir. İltihabsorucu, antiseptik, ödqovucu, yelqovucu, məhkəmləndirici və büzücü təsir edir. Adətən spastik qəbizlikdə, bağırsaq atoniyasında, menstruasiya və hamiləlikdə, düz bağırsaq çat və hemorroyunda tətbiq edilir.

Tərkibində antraqlükozidlər olduğundan qəbul olunduqdan 8-10 saat sonra yoğun bağırsağın peristaltikasını artıraraq işlədici təsir göstərir. Tannoqlükozidlər büzücü və antiseptik təsir göstərir. Rəvəndi az dozada tətbiq etdikdə büzücü, yüksək dozada isə işlədici təsir edir.

Hazırlanması: Yalnız əczaxanalar tərəfindən aparılır. Rəvənd tabletkası (Tabul. radicis Rhei) 0,3-0,5 q olub, gündə 2-3 dəfə qəbul edilir.

Quru rəvənd ekstraktı (Extr. rhei siccum). 0,1 –1,0 dozada qəbul edilir.

Rəvənd paraşoku (Pulv. radicis Rhei). Böyük adamlar üçün 0,5 – 2 q, uşaqlar isə 0,1 q dozada qəbul edir.

Əks göstəriş: Yoxdur. Uzun müddət bu bitki ilə müalicə aparıldıqda bitkiyə qarşı adaptasiya yaranır və müalicəvi təsiri aşağı düşür.

Xroniki qəbizlik və hemorroyda qəbul edilməsi əks göstəriş sayılır.

QAYA RƏVƏNDİ – *RHEUM RUPESTRE* LITV.

Bitkinin istifadə orqanı: Dərman məqsədilə yay aylarında, 3-4 illik bitkinin köklərindən və kökümsovlarından istifadə edilir (şək.107).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində antraqlikozid, tanoqlikozid, qlüko-reum-emodin, reoxrizin, aşı maddələr vardır. Yarpaqlarında və çiçəklərində C vitamini, rutin, üzvi turşular və çoxlu kalium duzları vardır.

Xalq təbabətində: Qaya rəvəndinin tozu böyük dozalarda zəif işlədici, kiçik dozalarda iştahartırıcı, büzücü dərman kimi, dəri xəstəliklərində, ödqovucu kimi və meteorizmdə işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Rəvəndin kökü toz şəklində, quru ekstrakt formasında, sulu dəmləmə şəklində, sirop şəklində, həb şəklində istifadə edilir.

SƏDO – *RUTA GRAVEOLENS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin yerüstü hissələri (Şək.109).

Kimyəvi tərkibi: Çiçəkləyən zaman tərkibindən efir yağı (0,136%), rutin, furokumarinlər (berqanten, ksantoksin), alkaloidlər alınmışdır.

Xalq təbabətində: Bitkidən hazırlanmış təzə şirə ilan və digər həşəratların sancmasında, zəif görmə zamanı tətbiq edilir. Xaricə yara və yanıqlar, konyuktivit, yerli sızanaq zamanı işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Ümummöhkəmləndirici antispazmatik, antiseptik, qıcolma əleyhinə, qankəsici və antitoksikdir. Nevroz, ateroskleroz, klimaks, asteniya, isteriya, epilepsiya, revmatizm, padaqra, impotensiya, raxit, mədə-bağırsağın spastik sancılarında, damar spazmı və xoreya xəstəliklərində təyin edilir. Xaricə əsasən dəri yanıqlarında təyin edilir.

Əks göstəriş: Hamiləlik. Zəhərli bitki olduğundan, müalicə zamanı həkim nəzarəti olmalıdır.

APTEK ÇOBANYASTIĞI – *MATRICARIA CHAMOMILLA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitki çiçəkləyən zaman çiçək səbəti toplanılır (şək. 108).

Kimyəvi tərkibi: Çiçəklərinin tərkibində efir yağı, ramazulen, flavanoidlər, üzvi turşular, lakton, kumarin, terpenlər, seskviterpenlər, spirt, vitamin, acı maddələr və kamed vardır.

Xalq təbabətində: Çobanyastığı (mollabaşı) həssas dövəmlərdə, yorğunluq zamanı sakitləşdirici çay kimi istifadə edilir. Baş ağrısında və bir çox narahatçılıqlardan sonra da dəmləmə şəklində işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Sinir sisteminə sedativ təsir göstərir. İltihabəleyhinə, antiseptik, qankəsici, ağrıkəsici, yelqovucu, tərqovucu, ödqovucu, büzücü, yumşaldıcı və antiallergik xüsusiyyəti vardır. Sinir sistemi xəstəliklərində – nevroz, isteriya, xoreya, epilepsiya, nevralkiya, üçlü sinirin iltihabı, olqo və dismenorreyada təyin edilir. Çobanyastığı zəif işlədici öskürəkkəsici maddə kimi tənəffüs orqanlarının xəstəliklərində istifadə edilir. Mədə-bağırsaq traktında – qastrit, xora xəstəlikləri, enterkolit, qeyri spesifik xorali kolit, xolesistit, hepatit, bağırsaq diskenziyası və meteorizm xəstəliklərində istifadə edilir. Böyrək, sidik yolu və diatezdə bir çox qarışıqların tərkibinə verilir. Angina, stomatit və peridontit, ekzema, frunkulyoz və yanıqlarda təyin edilir.

Hazırlanması: 2-3 xörək qaşığı çiçəkləri 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda), gündə 3 dəfə içmək lazımdır.

Xaricə tətbiqi zamanı 4-6 xörək qaşığı çiçəkləri 2 stəkan qaynar suda dəmləmək lazımdır.

Əks göstəriş: Hamiləlikdə həkim məsləhətiylə işlədilməlidir.

ADI ZİRƏ – *CARUM CARVI* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Toxumları.

Kimyəvi tərkibi: Toxumunda 3-7% efir yağı (tərkibi başlıca olaraq karvon və limonendən ibarətdir), aşı maddələri və piyli yağlar (22% qədər) vardır. Bitki və çiçəklərində flavanoidlər (kversetin, kempferol və izoramnətin) və asetil tərkibli polin maddələri vardır.

Xalq təbabətində: Bronx mənşəli öskürəklərdə, yumşaldıcı və tərqovucu dərman kimi qastrit, enterkolit, uşaqlarda bağırsaq sancılarında, meteorizm, xroniki atonik qəbizlikdə yaxşı nəticə verir. Zirədən hazırlanmış məhlul bağırsaq peristaltikasını artıraraq mədə bağırsaq sistemini qazlardan təmizləyir. Meyvələri sidikqovucu və lithabsorucu kimi işlədilir. Laktasiya xüsusiyyətli olduğu üçün əsasən sudverən analar istifadə edirlər. Ana südünün artmasına güclü təsir göstərir.

Fitoterapevtik göstəriş: İştahlandırıcı, spazmolitik (bağırsaq əzələləri, uşaqlıq, sidik yolu), bronxlardakı seliylə artırıcı, qadınlarda laktasiyanı gücləndirən xüsusiyyətləri vardır. Hərərət-salıcı və öskürəklə müşayiət olunan xəstəliklər zamanı bronxit, pnevmoniya, bronxial astma və ağciyər vərəmində istifadə edilir.

Hazırlanması: 2-3 çay qaşığı bitkini 200 ml qaynar suda dəmləmək (termosda) və hər gün içmək lazımdır (gündəlik doza).

Xalq resepti: 1 xörək qaşığı meyvəni 1 stəkan südlə qarışdıraraq 3 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. 1 xörək qaşığı gündə 3 dəfə içməklə, laktasiyanı gücləndirmək olar.

Termosda 1 xörək qaşığı bitki 0,5 l qaynanmış suda dəmləmək lazımdır. 1/2 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir.

Meyvələrindən nişatır-zirə damcısı (10-15 damcı gündə 3-4 dəfə) hazırlanır. Zirə yağını öskürəkkəsici vasitə kimi 1-5 damcı gündə 3-4 dəfə qəbul etmək lazımdır.

ADI BOYMADƏRƏN – *ACHILLEA MILLEFOLIUM L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Yerüstü hissəsi və çiçəkləri.

Kimyəvi tərkibi: Çiçəkləyən zaman bitkinin tərkibində efir yağı (mürəkkəb efirlər, azulen, tuyol, sineol, kamfora, kariofillen), qarışqa və izovalerian turşuları olur. Tərkibində eyni zamanda qətran, aromatik, acı və aşı maddələr, vitaminlər, fitonidlər və digər maddələr də tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Qankəsici və yara sağaldıcı dərman kimi tətbiqi xalqa yaxşı məlumdur. Qara ciyər, podaqra, revmatizm, limfa vəzilərinin vərəmində və eyni zamanda qurdqovucu, ayaqların qıcolmasında, irinli yaralarda, anemiya və ağciyər vərəmi xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Yaraların sağaldılmasında istifadə edilir. Qədim tarixdə Axill, Patrokl, Xiron, Telf və Dioskorid kimi loğmanlar bu bitkini «ecazkar bitki» adlandırmışlar.

Fitoterapevtik göstəriş: Bitkinin tərkibində ümummöhkəmləndirici, iltihabəleyhinə, antispastik, büzücü və zəif yerli keyləşdirici maddələr vardır. Boymadərən uşaqlıq, ağ ciyər, mədə-bağırsaq, burun qanaxmalarında, yanıq, trofik yara, xronik furunkulyoz və dəri xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Bitki və çiçəkləri müvəffəqiyyətlə qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, enterkolit, nefrit, spesifik olmayan kolit, mədə və bağırsağın spastik ağrılarında işlədilir. Boymadərən maddələr mübadiləsini aktivləşdirir və normallaşdırır. Hipertoniya, ateroskleroz və piylənmədə qarışıqların tərkibinə daxildir. Bu bitkinin qəbulu zamanı qanda trombositlər artır. Xüsusilə trombozda boymadərənin qəbulu yolverilməzdir. Qanın laxtalanmasını artırır. Antiallergik xüsusiyyətinə görə diatez, ekzema, qızılyel və bronxial astma xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Qanaxmalarda xüsusən ağciyər, bağırsaq, burun,

uşaqlıq və böyrək qanaxmalarında əvəzedilməzdir. Qadın və qızların kiçik tazında olan orqanların nevrozunda (spastik parametropatiya), süd vəzinin iltihabında, mensturasiyada, qıcolma və qusma hallarında çox effektivdir. Ümummöhkəmləndirici, ki-mi astenik vəziyyət, nevroz və isteriya xəstəliklərində istifadə olunan qarışıqların tərkibinə daxildir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı bitkini 250 ml qaynar suda 15 də-qəqə dəmləmək (termosda) lazımdır (gündəlik doza). Gündə 2-3 fincan qəbul etmək məqsədəuyğundur.

Xaricə tətbiqi zamanı 3 xörək qaşığı bitkini 1,5-2 stəkan qay-nar suda dəmləmək lazımdır.

Öd, mədə və bağırsaq xəstəliklərində boymadərən 30q, çoban-yastığı 50q, nanə 50q dəmləyərək qəbul etmək lazımdır.

Boymadərənin vannası zamanı 50-75q bitki 1 litr qaynar suda 20 dəqiqə dəmlənilir və süzülür. Bu qədər məhlul 1 vanna üçün yetərlidir.

Yağ və ət məhsullarının (kolbasa) hazırlanmasında boymadə-rəndən istifadə edilir.

Əks göstəriş: Hamiləlik.

ÜÇRƏNG BƏNÖVŞƏ – *VIOLA TRICOLOR* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yerüstü hissəsi (şək.110).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində askorbin turşusu, salisil turşusu (0,087%), selik (9,5%), ursol turşusu, karotinoidlər, saponinlər, acı maddələr, flavanoidlər (viteksin, izoviteksin, orientin, izoorientin, vionaltin, visetin-2 və rutin) vardır. Çiçəklərində efir yağı və antosian qlikozidləri (vionaltin, delfidinin 3- qlikozid, peonidin 3- qlikozid), köklərində isə az miqdarda alkaloidlər vardır.

Xalq təbabətində: Nevroz, ürəkdöyünmə və halsızlıqda istifadə olunur.

Fitoterapevtik göstəriş: Ağciyər və yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı xəstəliklərində, burun-udlaq xəstəlikləri, xüsusən difteriyada öskürəkkəsici dərman kimi istifadə olunur. Böyrək və sidik yollarının xəstəliklərində, sidikqovucu və iltihabsorucu dərman kimi müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. Tərqovucu və «qan təmizləyici», oynaq, dəri xəstəliklərində, frunkulyoz, səpki, diatez və ekzema xəstəliklərində istifadə edilir. Oynaq və dəri xəstəliklərində vanna kimi xaricə qəbul edilir.

Hazırlanması: 1-2 xörək qaşığı bitkini 500 ml qaynar suda dəmləyərək (termosda) qəbul etmək lazımdır (gündəlik doza). Məhlulu (10,0 : 200,0) 1 xörək qaşığı gündə 3 dəfə qəbul edilə bilər.

2 çay qaşığı bitkini 250ml suda 5 dəqiqə ərzində dəmləmək lazımdır. Fincanla gündə 2-3 dəfə (öskürək olarsa tərkibinə bal qarışdırmaq) qəbul etmək lazımdır. 24 saatdan çox müddətə içmək məsləhət deyil.

Əks göstəriş: Qlomerulonefrit və hepatit.

ƏTİRLİ BƏNÖVŞƏ - *VIOLA ODORATA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçək və kökümsovları (şək.111).

Kimyəvi tərkibi: Köklərində saponinlər, efir yağları, karotin (120 qamma), C vitamini (140-396mq%), violaemetin alkaloidi, çiçəklərində 0,15-0,2% efir yağı vardır. Efir yağının tərkibində keton və müxtəlif terpenlər olur. Tərkibində salisil turşusunun metil efiri, rutin və violakversitrin, antosian, delfinidin və pionidin qlikozidi vardır.

Xalq təbabətində: Dəmləməsi və bişirməsindən dizinteriya, sarılıq zamanı ödqovusu, tutmalar zamanı epilepsiyada, astmada, uşaqların qızılca, çiçək xəstəliyi zamanı istifadə edilir. Çiçəklərinin dəmləməsi soyuqdəymələrdə tərlədisi, böyrəkdaşı xəstəliyində sidikqovucu kimi işlədilir.

Hazırlanması: Məhlulu (20,0-200,0) Qalen prerarati (triviol) olub, 1 xörək qaşığı gündə 3 dəfə bronxitdə qəbul (tərkibində saponinlər və salisil turşusu vardır) edilir. Uşaqlarda qızılca xəstəliyinin müalicəsində Averin çayı kimi (10-20:200) içilir. Eyni zamanda çiçəkləri vərəm xəstəliyində 1 xörək qaşığı gündə 2-3 dəfə olmaqla qəbul edilir.

ƏMƏKÖMƏCİ – *MALVA SYLVESTRIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Zoğları, yarpaq və çiçəkləri.

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində selik, malvin qlikozidi, malvidin və xlorid maddələri vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində çoxlu miqdarda selik və bürüyücü maddələr olduğundan bronxit, bronxial astma, qəbizlik və mədə-bağırsağın xroniki xəstəliklərində tətbiq edilir. Böyrək daşlarının salınmasında effektiv təsir vasitəsidir.

Hazırlanması: 30 yarpaq zəif odda qaynadılaraq şəkər əlavə edilir. İçilir və ya 25-30 dəqiqə vanna qəbul edilir.

ÜÇBARMAQ – *BIDENS TRIPARTITA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Zirvə çiçəkləri (şək.112).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində aşı (4,46% qədər) və acı maddələr, selik, flavanoidlər, kumarin, γ lakton, aminlər, efir yağları və askorbin turşusu (60-70%) vardır.

Xalq təbabətində: Yaxşı qantəmiszləyici və antiallergik dərmandır. Uşaq və yeniyetmələrin dəri, ekzema, diatez və qızılyel xəstəliklərində tətbiq edilir. Üçbarmağın uşaq xəstəlikləri praktikasında xaricə tətbiqi olduqca səmərəlidir. Diatez, raxit və ekzema xəstəliklərinin müalicəsi zamanı yaxşı səmərə verir. Yarpaqları ilan sancması zamanı dəriyə qoyulur.

Fitoterapevtik göstəriş: Zəif sedativ, ödqovucu, tərlədici, sidikqovucu, yarasagaldıcı, antiallergik və hipotenziv xüsusiyyəti vardır. İştahasızlıq, qara ciyər, öd yolları, raxit, podaqra, yanıq, çətin sağalan yara, müxtəlif etiologiyalı xora və yolxucu xəstəliklərin müalicəsində işlədilir.

Hazırlanması: Bitki xüsusi dairəvi paketlərdə (*Bricetus herbae Bidentis*) 7,5q buraxılır. Bir paket 1 stəkan qaynar suda 10 dəqiqə müddətində dəmlənilir və 1 xörək qaşığı qəbul edilir.

Qanın təmizlənməsi, dəri xəstəlikləri və raxitdə üçbarmaq – 10q, yunan qozu – 5q, üçrəng bənövşə – 20q, pıtraq kökü – 15q, gicitkan çiçəyi – 10q, qara qarağat – 10q və çiyələk yarpağı – 15q olmaqla qarışıq hazırlanır. Bu qarışığın 20 qramını 1 l suda zəif od üzərində 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Gün ərzində hər saatda 30q, uşaqlar isə 1 xörək qaşığı qəbul edə bilərlər. Xroniki böyrək xəstəliklərində bu tərkibə ayıqulağı 30q, tozağacı qozası 15q əlavə edilməlidir.

ÇÖL QATIRQUYRUĞU – *EQUISETUM ARVENSE* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Vegetativ gövdə və budaqları (şək.113).

Kimyəvi tərkibi: Bitkinin tərkibində aşılایıcı maddələr, flavonoidlər, acı maddə, qatran, akonit, quzuqulağı və alma turşuları, saponin (ekvizetrin, lyutenol 7-qlikozid, izokverçitrin, lyuteolin, silikat turşusu (10%), kempferol 7- diqlikozid), karotin, askorbin turşusu (190 mq%), az miqdarda alkoloidlər, sitosterin və dimetil sulfat vardır.

Xalq təbabətində: Böyrək və sidik yolu xəstəliklərində sidikqovucu, müxtəlif etiologiyalı ödemlərdə, podaqra, müxtəlif yaralarda, ağciyər (plevrit, vərəm) xəstəliklərinin müalicəsində işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: İltihabsorucu, dizinfeksiyaedici, sidikqovucu, qankəsici, kardiotonik, orqanizmi möhkəmləndirici, yara sağaldıcı və büzücü xüsusiyyətləri vardır. Qatırquyruğu suduz mübadiləsini normallaşdırır, xolesterini azaldır və orqanizmdən toksiki şlakları (xüsusən qurğuşun zəhərlənmələri) kənar edir. Qarışıqların tərkibində hipertoniya xəstəliyi, ateroskleroz, podaqra və çətin sağalan yaraların müalicəsində, revmatizm, göz, öddəşi və böyrəkdaşı xəstəliklərində, mədə və bağırsağın şişində, daxili və xarici qanaxmalarda, aşağı ətrafların ödemlərində, istifadə edilir. Xaricə təyini dərinin xroniki çətin sağalan xora və saçın kəpək verməsində (seборея) aparılır. Sidikqovucu çayların tərkibinə daxildir. Orqanizmin çoxlu ödemli hallarında (plevrit, ürək, böyrək, vərəm, qurğuşun zəhərlənmələri), podaqrada istifadə edilir. Traskova və Zdrenkonun tədqiqatlarına görə bu bitkidən hazırlanan mikistura astma və xərçəng əleyhinə ən yaxşı vasitədir.

Hazırlanması: Qatırquyruğu 10q, lansetşəkilli bağayarpağı 10q, razıyana 5q, gəndalaş çiçəkləri 5q və kəklikotu 5q. 2 çay qaşığı qarışıq 250ml suda 15 dəqiqə ərzində dəmlənərək hər gün 2-3 fincan içilir.

Xaricə tətbiq etmək üçün məhlul: 4-5 xörək qaşığı bitki 2 stəkan qaynar suda dəmlənilir.

15q qatırquyruğu bitkisi suya əlavə edilərək qaynadılır (30 dəqiqə) sonra isə soyudulur və 1 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə qəbul edilir.

Qatırquyruğunun qranulası: 10 q qranul (1 xörək qaşığı) qaynar suya əlavə edilərək zəif od üzərində 15 dəqiqə ərzində qızdırılır. 1 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə qəbul edilir.

1-2 xörək qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda) qəbul etmək lazımdır (gündəlik doza).

Əks göstəriş: Böyrək parenximasının zədələnməsi (nefroz, nefrit) ilə gedən böyrək xəstəlikləri.

ADI MAYAOTU – *HUMULUS LUPULUS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yetişmiş şişkin tumurcuqları (şək.114).

Kimyəvi tərkibi: Tumurcuqlarının tərkibində efir yağı (1-3%), humulon, lyuparon, lyuparenol, izovalerian turşusu, alifatik terpenlər, dipenten (30-50%), alifatik spirtli terpenlər (heranilol, linalool), mürəkkəb efirlərlərdən mürsenol (30-40%), qətran, mineral maddələr və fitonsidlər vardır.

Xalq təbabətində: Yüksək effektivinə və keyfiyyətinə görə ağrıkəsici və iltihabsorucu xüsusiyyətinə görə podagra, revmatizm, menstruasiya pozğunluqları, klimaks, dartılma və burxulmalarda istifadə edilir. Sacın kəpək verməsinin (sebooreya) qarşısını alır. Təzə şişkin tumurcuqlar zəifliyin götürülməsinə çox yaxşı təsir edir.

Etoterapevtik göstəriş: Nevroz, zəiflik, isteriya, klimakterik şikayətlər, hipertoniya tipli neyrosirkulyar distoniya zamanı istifadə edilir. Asteniya və qastritdə möhkəmləndirici və iştahartırıcı kimi işlədilir. Qarışıqların tərkibində maddələr mübadiləsi, qara ciyər, menstruasiya, pollusiya (gecə sidiyini saxlaya bilməmək), sidik orqanları, sidik yolu və böyrək xəstəliklərində, yüngül depressiyalarda, müxtəlif səbəblərdən törənən qorxu və yuxusuzluqlarda təyin edilir. Ağrıkəsici, iltihabsorucu spazmolitik effektivinə görə sistit və uretrit xəstəliklərində istifadə edilir. Bu bitki ilə birlikdə yemişan, valerian və sarımsağı da daxil etdikdə qan təmizləyici, mədə ağrıları, yuxu tənzimləyici təsir göstərir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı mayaotunun şişkin tumurcuqları 250 ml qaynar suda 15 dəqiqə ərzində dəmlənərək (termosda) gündə 2 dəfə (hər dəfə 1 fincan) qəbul edilir (sutalıq doza). Qəbul zamanı 1 çay qaşığı valerian da qəbul etmək məsləhət görülür.

Şişkin tumurcuqların parəşoku: 0,5 çay qaşığı gündə 3 dəfə olmaqla yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır.

Əks göstəriş: Mayaotu zəhərli bitkidir. Müalicə zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır. İstifadə zamanı baş ağrısı, təngnəfəslik, qusma, ürək nahiyyəsində ağrılar və ürəkdöyünmə yarana bilər.

BÖYÜK DƏMROVOTU – *CHELIDONIUM MAJUS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitki, kökü və təzə hazırlanmış soku (şək.115).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində alkaloidlər vardır. Bundan başqa efir yağları, vitaminlər (askorbin turşusu, karotin), flavanoidlər, saponinlər və turşular (alma, limon) alınmışdır.

Xalq təbabətində: Kökündən hazırlanmış təzə şirəsindən dərinin xora, yara, şiş, döyənək və ağ ciyər vərəmində tətbiq edilir. Sinir sistemini sakitləşdirərək hipotenziv və spazmolitik təsir göstərir. Bu xüsusiyyətinə görə nevroz, kardial və hipertonik tipli neyrosirkulyar distoniya, tireotoksikoz və epilepsiyada işlədilir. Bronxit və difteriyada təzə hazırlanmış sarımsaq əzməsinin verilməsi və ya süd və bal ilə qatılaraq qəbul edilməsi olduqca faydalıdır.

Etoterapevtik göstəriş: Ödqovucu, iltihabsorucu, ağrıkəsici, şişəleyhinə və sidikqovucu dərmandır. Hepatit, xolesistit, xolangit, pankreatit, mədə və onikibarmaq bağırsaqın xora xəstəliyi, mədə və bağırsaq polipi, və spesifik olmayan yaralı kolit xəstəliyində təyin edilir. Bədxassəli şişlərin müalicəsində, göbələk və bakteriya əleyhinə vasitə kimi, vərəm çöplərinə qarşı mübarizədə müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Hemoxelidonin isə iflic yaradan zəhərdir. Bu xüsusiyyətindən yerli anesteziya vasitəsi kimi istifadə edilir. Bu bitki ürək döyüntüsünü azaldır ki, bu da qan təzyiqinin düşməsinə səbəb olur. Eyni zamanda ödqovucu təsir etməklə, stenokardiya, hipertoniya xəstəliyi, mədə xərçəngi, qaraciyər və öd xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Tərkibindəki xelidonin maddəsi morfinəbənzər olub, sinir sistemini iflic edə bilər.

Alman və Bolqar təbabətində ağrıkəsici dərman kimi qastrit, kolit, siflis, malyariya, sarılıq, qaraciyər və ödyolu daşlarında

spazmolotik vasitə kimi istifadə edilir. Polşa və Avstriya təbabətində bitkinin köklərindən iltihabsorucu, qıcolma əleyhinə, ağrıkəsici, qurdqovucu, böyrək sancısı, babasil və menstruasiya pozğunluqlarında tətbiq edilir. Fransa təbabətində oyandırıcı və sidikqovucu kimi istifadə edilir. Bitkini böyük dozada qəbul etmək hallunasiya, başgicəllənmə və özündəngetmə hallarını yaradır. Qədim təbabətdə bu bitkidən vərəm, podaqra və revmatizm xəstəliklərində istifadə edilirdi. Dərinin ziyil, ekzema, döyənək və hətta xərçəngində işlədilir.

Hazırlanması: 1 hissə bitki (15-60q) 10 hissə suda dəmlənərək 3 saat ərzində imalə edilir. 2-3 il ərzində hər dəfə 6-10 prosedurdan sonra polip sağalır. Bakterisid olduğundan dəri vərəmini olduqca tez sağaldır.

Xaricə işlətmək üçün: 2 xörək qaşığı bitkini 500 ml qaynar suda dəmləmək lazımdır (vanna üçün).

Əks göstəriş: Zəhərli bitki olduğundan həkim nəzarəti altında təyin etmək lazımdır.

DƏRMAN SÜRVƏSİ – *SALVIA OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaqları (şək. 116).

Kimyəvi tərkibi: Sürvənin (şalfey) yarpaqlarında efir yağı, alkoloidlər – salven, tuyon, sineol, acı və aşı maddələr, qətran, turşu (ursol və olein), fitonsidlər, Kox çöplərinə (vərəm) qarşı aktiv təsir edən maddələr və fitonsidlər vardır.

Xalq təbabətində: Qaraciyər, böyrək, qastrit, xora xəstəliyi, enterkolit, ishal və bronxit xəstəliklərində daxilə qəbul edilir. Şalfey cinsi vəziləri normallaşdırır. Sonsuzluqda və klimakterik vəziyyətlərdə olduqca səmərəlidir. Dəmləməsi tərifrazını azaldaraq sinir sistemini möhkəmləndirir. Aromatik və kulinariya bitkisi olduğundan sup və tərəvəzli yeməklərin tərkibinə qatılır. Südverən qadınların südünü artırmaq üçün istifadə edilə bilər. Balla qarışdıraraq fiziki cəhətdən zəif uşaqların orqanizmini möhkəmləndirmək olar.

Xalq təbabəti praktikasında sürvə dəri xəstəliklərində iltihab sorucu və dizinfeksiyaedici maddə kimi ən çox xaricə işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Angina, qripp, stomatit, gingivit və imalə şəklində işlədilir. Tər azaldıcı xüsusiyyəti vardır. Tərkibindəki efir yağı dizinfeksiyaedici və qıcolma əleyhinə, aşı maddələri isə bağırsaq problemlərində işlədilir.

Hazırlanması: Məhlul şəklində daxilə 1-2 xörək qaşığı 2 stəkan qaynar suda 10 dəqiqə dəmlənilərək (termosda) qəbul edilir (gündəlik doza) və ya xaricə tətbiq edilir. Bizim qənaətimizə görə sürvə ağız və boğazın iltihabi xəstəliklərində qarqara, xaricə isə bürüyücü, kompres və sarğı qoyulmasında çox yaxşı təsir edir.

Tərləmələr zamanı sürvə ilə çoban yastığının hər birindən 2 çay qaşığı 250ml suda 15 dəqiqə dəmlənərək qəbul edilir.

Əks göstəriş: Kəskin nefrit və hamiləlik.

AT ƏVƏLİYİ – *RUMEX CONFERTUS* WILLD.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökü və zirvə yarpaqları (şək.117).

Kimyəvi tərkibi: Kökünün tərkibində antraxinon (4% qədər) emodin, xrizofan turşusu, dəmir, qətran, efir yağı, vitamin K, aşı maddələri, nepodin flavanoidi və kalsium oksalat duzu vardır. Meyvələrində aşı maddələr, antraxinin, yarpaqlarında karotin, askorbin turşusu, flavanoidlər və kalsium oksalat olur.

Fitoterapevtik göstəriş: Kökünün az dozası büzücü, yüksək dozası isə genişləndirici təsir edir. Genişləndirici xüsusiyyəti hətta kökünü qəbul etdikdən 8-12 saat sonra davam edir. Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin əsas dərmanı hesab olunur və yoğun bağırsağın peristaltikasını gücləndirir. Uşaq və yeniyetmələrdə müxtəlif mənşəli ishallarda, dizinteriyada, çay kimi büzücü effekt göstərir. Əsasən kəskin və xroniki enterkolit, kolit, babasil və qanaxma ilə müşayiət olunan uşaqlıq xəstəliklərində istifadə edilir. Dəri xəstəliklərində əsasən qaşınmalarda, hipertoniya və aterosklerozda təyin edilir.

Hazırlanması: Büzücü xüsusiyyətə malik dərman hazırlamaq üçün kökünün üyüdülmüş tozu 0,15-0,3 qram gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Ekstraktı işlədici kimi hətta hipertoniya (I-II stadiya) işlədilir.

Rp.: Extr. Rad. Ruminis conferti fluidi 25,0

D.S. 1 çay qaşığı və ya 50-60 damcı gündə 3 dəfə axşam yeməkdən əvvəl qəbul etməli.

Əks göstəriş: Hamiləlik və böyrək xəstəlikləri.

AĞ BALLIBABA (DALAMAZ) – *LAMIUM AIBUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yerüstü hissələri, çiçəkləri və qönçələri (şək.118).

Kimyəvi tərkibi: Çiçək və yarpaqlarının tərkibində aşı maddələri (10% qədər), selik, saponinlər, efir yağı, alkaloidlər, flavanoidlər (izokversitrin, kversetrin, kempferol, astraqalin, kversimeritrin), qal, askorbin turşusu, xolin, histamin və tiramin, P kumarin və ferul turşusu vardır.

Xalq təbabətində: Çiçəkləri qara çayla olduqca dadlı olur. Qanazlığında, iştahasızlıqda, dəri və ağciyər xəstəliklərində işlədilir. Menstruasiya pozğunluqlarında xüsusilə faydalıdır. Eyni zamanda sakitləşdirici və yuxugətirici bitkidir. Öküzgözü ilə birlikdə bərabər nisbətdə xaricə çiban, səpki, dolama zamanı tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Böyrək və sidik yollarının iltihabi xəstəlikləri (qlomerulonefrit), anemiya, genekoloji praktikada, müxtəlif dəri xəstəlikləri və allergik reaksiyalarda işlədilir. Uşaqlarda diatez və qızılyel xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq edilir. Bu xəstəliklərdə həm daxilə və həm də xaricə işlədilir.

Hazırlanması: 1-2 çay qaşığı bitkini (boymadərənlə birlikdə olar də) 250ml qaynar suda (termosda) 5 dəqiqə dəmləyib sutqa ərzində içmək lazımdır. İltihabi xəstəliklərdə uzun müddət qəbul etmək olar.

ŞÜVƏRƏN – *SISYMBRIUM OFFICINALE* (L.) SCOP.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq, gövdə, çiçək və toxumları (şək.119).

Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində qlikozidlər və kükürd elementi vardır. Bitki kimyəvi cəhətdən tam öyrənilməmişdir.

Xalq təbabətində: Toxumlarının sulu bişirməsi qəbizlikdə işləddici və qurd əleyhinə olaraq tətbiq edilir. Dəmləməsi eyni zamanda malyariya və digər səbəblərdən yaranan temperaturlarda ürək döyülmələrində tətbiq edilir.

Hazırlanması və istifadəsi: Farmokoloji təsirinə görə sınaqdan keçirilmişdir. Spirtli ekstraktı 1:1 nisbətində 70⁰ çaxır spirtində həll edilir və zəif işləddici kimi istifadə edilir.

Əks göstəriş: Həssaslıq.

BOYAQOTU – *RUBIA TINCTORUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Kökümsovları (şək.120).

Kimyəvi tərkibi: Kökümsovlarında 5-6% antraxinol, ruberitrin turşusu, alizarin, ksiloza və qlikoza (0,1%), qalüozin, eritrin turşusu, psevdorurin, rubiadin, rubiadin qlikozid, alma, limon və çaxır turşuları, 15% şəkər, zülali və pektin maddələri tapılmışdır. Cavan zirvə yarpaqlarının tərkibində asperulozid qlikozidi vardır.

Xalq təbabətində: Kökünün bişirməsi və quru ekstraktı öddəsi və böyrəkdaşı xəstəliklərində daşların xaric olması üçün qəbul edilir. Ümumiyyətlə bu bitkinin qəbulu orqanizmdən fosfat, oksalat, urat və digər duzların xaric olunmasına kömək edir.

Fitoterapevtik göstəriş: Qalen preperatıdır. Hemopatik preparat olmaqla spazmolotik və sidikqovucu təsirinə görə sidik daşlarının təmizlənməsində istifadə edilir. 1993 cü ildən Almaniya səhiyyə təşkilatı tərəfindən qorunur.

Hazırlanması: 20q bitkinin 200ml suda dəmləməsi və ya bişirməsi məsləhət görülür.

Əks göstəriş: Davamlı olaraq 3 həftədən çox qəbul etmək olmaz.

ACIYONCA – *CORONILLA VARIA L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq, kök və toxumları (şək.121).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində koronillin qlikozidi, aşı maddələri, C vitamini (270mq%), karotin (26-106mq%), çiçəklərində efir yağları (0,16%) vardır. Toxumlarında ürək qlikozidləri (koronizid, koronillin), steroid maddələri (kardenolid), kumarin, hipotenziv maddələr, şəkər, yağ və zülali maddələr tapılmışdır. Öyrənilmişdir ki, tərkibindəki koronizid qlikozidi xarakterinə görə strofantin K qlikozidinə çox yaxındır.

Xalq təbabətində: Orqanizmin ümumi zəifliyi və avitaminozlar.

Əks göstəriş: Qanın qatılaşması

ÜSKÜKOTU – *DIGITALIS FERRUGINEA L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Bütün orqanları (şək.122).

Kimyəvi tərkibi: Üskükotunun bütün orqanlarında ürək qlikozidləri vardır. Yarpaqlarında purpurea A qlikozidi, digilanid A, digilanid B, a və b asetildigitoksin, digitoksin, lantozid, gitozid, gitorin, qlikoza, aqlikon, yarpaq və toxumlarından steroid saponinlər (digitonin, digitonin, tigonin), flavanoidlər (lyuteolin və onun qlikozidi), kofein, xolin maddələri tapılmışdır.

Xalq təbabətində: II və III dərəcəli qan dövrəni pozğunluqlarında və hipertoniya xəstəliyində işlədilir. Ödemlərdə diurezi artırır, ürək əzələsini möhkəmləndirir.

Əks göstəriş: Zəhərli bitkidir. Artıq qəbul etdikdə qusma, ürəkdöyünmə (aritmia) və kumlyasiya törədir. Hətta ürək dayanmasına və ölümə səbəb ola bilər.

ÖKÜZBOĞAN – *BUPLEURUM ROTINDIFOLIUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaq və çiçəkləri (şək.123).

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində flavanoidlər (kversetin, izoramnetin və onun qlikozidləri), rutin, C vitamini, izokverçitrin və izoramnetin 3-rutinozid vardır. Çiçəklərinin və zirvə yarpaqlarının tərkibində saponinlər (6,15-68,2%), efir yağları (0,15%), aşı maddələri (0,63%), piyliyağlar (14,03%), C vitamini (1262,24mq%) və şəkər (31,3%) vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Qara ciyər, öd xəstəliklərində ödqovucu və iltihab sorucu təsir vasitəsi kimi işlədilir.

Əks göstəriş: Sinir oyanıqlığı, qanın qatılaşması, bitkiyə qarşı həssaslıq.

BALLICA - *PULMONARIA OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaqları (şək.124).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində aşı maddələri, yumşaldıcı selik, mikroelementlərdən manqan vardır.

Xalq təbabətində: Daxili sekresiya vəzilərinin stimullaşdırılmasında, qanyaranmada, ağrıkəsici və yumşaldıcı, ağciyər vərəmində, qanhayxırmada, yuxarı tənəffüs yolları iltihabında, bronxitdə, mədə-bağırsaq xəstəliklərində və dəri yaralarında istifadə edirlər. Cavan gövdə və yarpaqları qıda kimi püre, salat və sup kimi istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Alman, Fransız və Polşa həkimləri ağciyər və sidik yolları xəstəliklərində tətbiq edirlər. Bolqar həkimləri tənəffüs yollarının iltihabında, ağciyər vərəmində, difteriyada, bronxit, astma və sidikyolu xəstəliklərində istifadə edirlər. İltihabsorucu, büzücü, sidikqovucu, qankəsici və yarasagaldıcı xüsusiyyəti vardır. Eyni zamanda tərkibində olan çox miqdarda manqan elementi qanyaranma prosesində, boy inkişafında, B₁ vitamininin aktivləşdirilməsində və daxili sekresiya vəzilərinin stimullaşdırılmasında iştirak edir.

Hazırlanması: Dəmləmə formasında gündə 2 dəfə 50-80q qəbul edilə bilər.

ƏTİRŞAH - *GERANIUM ROBERTIANUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Çiçək, yarpaq və gövdələri.

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində heranin acı maddəsi, aşı maddələr, qətran, selik, xoşagəlməz qoxulu efir yağları vardır.

Xalq təbabətində: Dəmləməsi ishal, dizinteriya, böyrək, revmatizm, podagra xəstəliklərində işlədilir. Yaxşı qankəsici və həlledici olduğundan böyrəkdaşı, öddəsi xəstəliklərində təyin edilir. Bitki döyənəklərin üstünə qoyularaq onların müalicəsində istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Xarici və daxili qanaxmalarda (xüsusi mədə qanaxması) təyin edilir. Mayeli ekstraktı sinir sistemə oyandırıcı təsir göstərir. Ibn-Sina bu bitkinin ilan zəhərinə qarşı antitoksik xassəsi haqqında məlumat vermişdir. Kökləri güclü büzücü xassəyə malikdir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı bitkiyə 2 stəkan soyuq suya əlavə edərək, 8 saat gözləmək lazımdır.

Əks göstəriş: Yüksək həssaslıq.

ERKƏK AYIDÖŞƏYİ – *DRYOPTERIS FILIX-MAS (L.)* SCHOTT

Bitkinin istifadə orqanı: Tibbi məqsədlə kökümsovlarından istifadə olunur (şək.125).

Kimyəvi tərkibi: Kökümsovların tərkibində azotsuz zəhərli - floroqlüsin və yağlı turşuları vardır. Bunların cəmi – çiy filisin adlanır. Quba rayonunda yığılmış ayıdöşəyinin kökümsovunda çiy filisinin miqdarı orta hesabla 3,36% olmuşdur və böyük miqdarda təbii ehtiyatı vardır. Dövlət Farmakopiyası (X nəşr) tələb edir ki, kökümsovlarda çiy filisinin miqdarı 1,8%-dən az olmasın. Bundan başqa aspidinol, albaspidin, flavonoidlər, aşılayıcı maddələr, efir yağları, piyli yağlar, qətran, nişasta, şəkər, kül elementi və s. vardır.

Xalq təbabətində: Ayıdöşəyi şirəsi yaraları, xoraları müalicə edir. Erkək ayıdöşəyi kökünü dəmləyib vannaya əlavə etdikdə revmatizma ağrılarına, ayaq əzələlərinin yığılıb qıcılmasına çox kömək edir. Hətta, təzə dərilmiş ayıdöşəyinin yarpaqlarından düzəldilmiş döşəkdə yatmaq çox xeyirlidir.

Fitoterapevtik göstəriş: Tibbi təcrübədə efirli ekstrakt formasında bilavasitə lentvari qurdların qovulmasında istifadə edilir (enli lentvari, öküz və donuz soliteri). Filisin və aspidinol bir-bəşə əzələ zəhərləridir. Bu təsir lentvari qurdların əzələlərini iflic edir və onları məhv edib orqanizmdən qovur.

Əks göstəriş: Erkək ayıdöşəyi çox zəhərli olduğu üçün ehtiyatlı olmaq lazımdır. Müalicə ancaq həkim təyinatı və müşahidəsi ilə müəyyən sxem üzrə aparılmalıdır. Əgər erkək ayıdöşəyindən zəhərlənmə baş verərsə ürəkbulanma, qusma, başgicəllənmə, başağrısı, tənəffüsün çətinləşməsi, ürək fəaliyyətinin pisləşməsi, sarılıq, qıcolmalar, görmənin zəifləməsi yarana bilər. Bu vaxt ilk yardım və müalicə kimi mədə yuyulur, işlədici duz verilir, vena daxilinə natrium-xlorun izotonik məhlulu, qlükoza yeridilir, istiqac qoyulur, isti vanna edilir, qıcolmalar zamanı - xloralhidratla imalə olunur.

ÇÖL QATIRQUYRUĞU – *EQUISETUM ARVENSE* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Dərman məqsədilə bütün yay müddətində toplanmış barsız, yaşıl rəngli gövdəsindən istifadə olunur (şək.126).

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində akotin turşusu, saponinlər, quzuqulağı və alma turşuları, karotin və C vitamini, aşı maddələri, acı maddələr, karbohidrat, qətran, silisium turşusu, kalsium duzları, flavonoidlər, piyli yağlar vardır. Qatırquyruğu əsasən sidikqovucu və qankəsici təsirə malikdir

Xalq təbabətində: Həlimindən və duru ekstraktından sidikqovucu kimi ödəmlərdə (qan dövranı pozulması ilə əlaqədar olaraq), sidik kisəsi iltihabında, böyük eksudatlı plevritlərdə, dizenteriyada, revmatizmdə, ağız və udlağın gec sağalan yara və xoralarında, ağ ciyər vərəmində, qurğuşun ilə zəhərlənmədə, ishalda istifadə olunur.

Əks göstəriş: Çöl qatırquyruğundan böyrəyin iltihabı xəstəliklərində qəbul etmək olmaz. Çünki bu otun preparatları böyrəkləri qıcıqlandırır.

GÜCOTU – *AGRIMONIA EUPATORIA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Tibbi məqsədlə yərüstü hissəsindən istifadə olunur. Bitki çiçəklənmə dövründə toplanır (şək.127).

Kimyəvi tərkibi: Bitkinin bütün hissələrinin tərkibində çoxlu miqdarda aşı maddələr, ətirli efir yağları, K vitamininin izi var.

Xalq təbabətində: Qara ciyərin xroniki xəstəliklərinin müalicəsində, revmatizmdə, mədə və bağırsaq, ağız boşluğu və udlaq xəstəliklərində qarqara kimi bəlgəmgətirici qarışıqların tərkibində, ayaq burxulmalarında, dəri yaralarında və bir sıra başqa xəstəliklərdə təpitmədən istifadə olunur.

Fitoterapevtik göstəriş: Aptek gücotunun preparatlarından qara ciyərin funksiyasının bərpasında və iltihab əleyhinə vasitə kimi istifadə olunur.

MAVI SÜSƏN – *IRIS GERMANICA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Dərman məqsədilə mavi və sarı süsənin kökümsovundan istifadə olunur.

Kimyəvi tərkibi: Mavi süsənin kökümsovunun tərkibində efir yağı, izoflavon qlükozidi, taninlər və nişasta vardır.

Xalq təbabətində: Müalicə məqsədilə əsasən iltihab əleyhinə və bəlgəmgətirici kimi, spirtli duru ekstraktından vərəmdə, mədə-bağırsaq sisteminin iltihabında, tənəffüs yollarının katarında, böyrək və sidik yollarının iltihabında, plevritdə, pnevmoniyada istifadə olunur. Sirkədə hazırlanmış ekstraktından dalaq və qara ciyər xəstəliklərində istifadə edilir. Mavi süsən büzücü və bakteriosid təsirə də malikdir.

DƏRMAN ŞAHTƏRƏSİ – *FUMARIS OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Dərman məqsədilə yerüstü hissələrindən istifadə olunur.

Kimyəvi tərkibi: Şahtərənin tərkibində bir neçə zəruri alkaloid (protopin, xolidonin, sanqvinarin və s.), fumar turşusu, yarpaqlarının tərkibində isə 240-370 mq% C vitamini vardır.

Elmi və xalq təbabətində: Avitaminozda, mədə bağırsaq xəstəliklərində, köpdə, meteorizmdə, qanazlığında, sarılıqda, qanaxmalarda qankəsici dərman kimi, iştah artırmaq məqsədilə dəmləmə, tinktura və spirtli duru ekstraktından istifadə olunur.

Azərbaycanda yayılan şahtərənin tədarükü və tibbi məqsəd üçün istifadə edilməsi zəruridir.

QARA ÇÖRƏKOTU – *NIGELLA SATIVA L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Tibbi məqsədlə toxumlarından istifadə olunur (şək.128).

Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində efir yağı, piyli yağlar, acı və aşı maddələr, E vitamini vardır.

Xalq təbabətində: Qara çörəkotu öskürəyi sakitləşdirir, tər və sidik ifrazını artırır, qurdqovucu təsir göstərir. Gül yağı qarışığı ekzemanın müalicəsində istifadə olunur.

Fitoterapevtik göstəriş: Tibbdə toxumlarından-pankreatit, xolestistopankreatit, xroniki hepatit, xroniki qastrit, enterokolit və s. xəstəliklərdə tətbiq edilən «Niqedaza» preparatı alınır.

QITIQOTU – *ARMORACIA RUSTICANA* GAERNT ET. MEY-SCHERB.

Bitkinin istifadə orqanı: Dərman məqsədilə xalq təbabətində kökündən istifadə olunur (şək.129).

Kimyəvi tərkibi: Kökündə qlikozid – siniqrin, xardal efir yağı, çoxlu C vitamini, enzimmirozin, kalium və kalsium, fiton-sidlər, yarpaqlarında isə C vitamini vardır.

Xalq təbabətində: Şirəsindən həzmin yaxşılaşmasında, iştahanın artmasında, mədə şirəsinin stimulyasiyasında, sinqa əleyhinə, sidikqovucu, bəlgəmgətirici kimi, revmatizmdə, qulağın irinli ifrazatında, boğaz ağrısında qarqara kimi, gec sağalan irinli yaraların müalicəsində istifadə edilir.

Əks göstəriş: Lakin qastritdə, xora xəstəliyində, kolitdə, böyrək və qara ciyərin xəstəliklərində bu bitkidən istifadə etmək olmaz.

QIRMIZI NAZ – *GENISTA TINCTORIA* L.

Bitkinin istifadə orqanı:– Çiçək və toxumlama zamanı bitkinin üst yarpaqları toplanılır.

Kimyəvi tərkibi: Tərkibindən alkaloidlər – çitizin, qenistein, metilçitizin, flavonodlardan isə lyudeolin tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Skarlatina, məxmərək, mərkəzi sinir sisteminin tonuslandırıcısı kimi və ürək-damar çatmamazlığında istifadə olunur. Bundan başqa böyrək, kəskin və xroniki pielonefrit, sistit xəstəliklərində güclü sidikqovucu və iltihab əleyhinə vasitə kimi tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Hemorrargik diatezlərdə və skorbutda askorbin turşusu ilə birlikdə istifadə edilir. Asteniya və vegetativ distoniyada tonuslandırıcı kimi də istifadə edilir. Hipotireoz zamanı tireoidinin miqdarını artırır. Qaraciyər xəstəliklərində və hemorroyda işlədicilərin tərkibinə qatılır.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı toxum 1 stəkan qaynar suda həll edilir (gündəlik doza).

Öks göstəriş: Hamiləlik. Bir çox müəlliflər bitkinin zəhərli olduğunu qeyd edirlər.

DIŞQURTLAYAN – *VISNAGA DAICOIDES* = *AMMI* *VISNAQA* LAM.

Bitkinin istifadə orqanı: Bütün orqanları,

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrində (0,4-2,5%), köklərində (0,07%), gövdəsində (0,11% qədər), yarpaqlarında (1,2% qədər), çətirində (0,2-1% qədər) kəllin maddəsi vardır. Tərkibi 2-metil-5, 8-demoksi, 6-7 furanoxromondan ibarətdir. Meyvələrində cəmi zamanda furanoxromon – visnaqin, kəllol qlikozid, ammiol, kəllinol, vizaminol, samidin, dihidrosamidin, efir yağı (0,2%), yağ turşusu (20%), visnadin və akaçetin flavanoidi vardır. Kəllin spazmolotik təsirə malikdir.

Xalq təbabətində: Böyrək və öddəsi xəstəlikləri. Diş əti xəstəliklərində çiy halda zoğları diş dibinə sürülür

Fitoterapevtik göstəriş: Bronxial astma, kəronar çatmamazlıq, stenokardiya, hipertoniya və difteriya xəstəliklərində işlədilir. Bundan başqa mədə-bağırsaq və sidikçıxarıcı (daş və qumların tökülməsində) kimi spastik təsir göstərir. Bitkidən hazırlanan “*avisvan*” adlı dərman böyrəkdaşı xəstəliyində spazmolotik və diuretik preparat kimi təyin edilir.

Əks göstəriş: Uzun müddət qəbul etmək olmaz.

QARPIZ - *CITRULLUS LANATUS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Ətli hissəsi, qabığı və toxumları.

Kimyəvi tərkibi: Qarpızda xüsusi maddələr vardır ki, bunlar bağırsağın peristaltikasını artırır. Bu isə orqanizmdən xolesterinin çıxmasını təmin edir. Qarpızın ətli hissəsi orqanizmdə fol, askorbin turşusunun, tiamin, riboflavin, hətta fruktoza və mikroelementlərin yaranmasında iştirak edir.

Xalq təbabətində: Toxumlarından hərarətsalıcı məqsədlə istifadə olunur. Sidikqovucu, ödqovucu, podaqra, iltihab əleyhinə, böyrək xəstəlikləri, piylənmə, sarılıq, artritlərdə ümumimöhkəmləndirici kimi istifadə edilir. Xroniki sidik yolları xəstəliklərində, qanazlığında, şəkərli diabetdə, aterosklerozda və bağırsaq atoniyasında istifadə olunur.

Fitoterapevtik göstəriş: Bağırsağın peristaltikasında səmərəli olmaqla bərabər, həm də güclü sidikqovucu təsirə malikdir. Qarpızın güclü diuretik xüsusiyyətinə görə böyrək və sidikyolu xəstəliklərində, şəkərli diabet və qanazlığında müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Ateroskleroz xəstəliyində qarpızın daimi olaraq qəbul edilməsi orqanizmdə yığılan xolesterindən tam azad olunmasına kömək edir. Bağırsaq peristaltikasını artırır, qanda xolesterin mübadiləsini nizama salır.

Hazırlanması və istifadəsi: Yaşıl qabıq hissəsi iti bıçaqla nazik doğranaraq üyüdülmür. Üyüdülmüş 1 xörək qaşığı parşoku suda həll edilərək içilir.

Qədim reseptə görə qarpız südü – 1 xörək qaşığı qarpız toxumundan 24 xörək qaşığı soyuq sudan ibarətdir. Toxum suda yaxşı - yaxşı həll edildikdən sonar qızdırmalı xəstələrə hər 2 saatdan bir 3-4 xörək qaşığı verilir. 0,5 stəkan qarpız suyunu gündə 4-6 dəfə bağırsaq iltihabında qəbul etmək faydalıdır. Toxumları qurdqovucu dərmandır. Toxumlarını əzərək südlə qaynadıb içmək uşaqlıq qanaxmalarını kəsir.

DƏRMAN BADIMCANI – *FUMARIA OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin yarpaqları.

Kimyəvi tərkibi: Kifayət qədər öyrənilməmişdir. Tərkibində əsasən fumarin, kriptokarpin, aurotoksin və smol vardır.

Xalq təbabətində: Bolqar təbabətində sarılıq, üz - dəri səpgiləri, hemorroy, sidik və tərqovucu vasitə kimi istifadə edilir. Qaraciyər və ödyolları xəstəliklərində, spastik qəbizlikdə, mədə yarasında, meteorizmdə spazmolotik və analgetik vasitə kimi geniş istifadə edilir. Qastrit zamanı mədə sekresiyasının artırılmasında, turşuluğun aşağı salınmasında, ağ ciyər vərəmində, xroniki bronxit, bronxoektaziya, miokardit və ürək qüsurlarında müalicəvi vasitə kimi işlədilir. Leyşmanioz və digər dəri xəstəliklərini müalicə edir.

Elmi təbabətdə geniş tətbiq edilmir.

Hazırlanması: Məhlulunu hazırlamaq üçün 2 xörək qaşığı bitkini 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənələrək (termosda), gündəlik doza qəbul (5-6 q- 3 dəfə) edilməlidir. Spirtli məhlulunu hazırlamaq üçün 10 q bitki 130 ml 70%- li etil spirtində həll edilməlidir. 5-7 gün saxlanılmalıdır. 20-30 damcı gündə 3-4 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Məlhəmini hazırlamaq üçün 1 xörək qaşığı bitki (paraşok) 50 q vazelində həll edilməlidir. Soyuq yerdə saxlanılmalıdır. Xaricə tətbiq edilir.

BOSTAN KƏLƏMI – *BRASSICA OLERACEA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaqları, başcığı, kökü və toxumu.

Kimyəvi tərkibi: Yarpaqlarının tərkibində vitaminlər (A, B, C), karotin, fol və pantotenat turşuları, K, P, Ca mikroelementləri, azotlu maddələr (1,8%), piy (0,18%), şəkər (1,92%), azotsuz maddələr (3,13%) və su (90%) vardır. Tibb praktikasında eksperimental yolla sübut edilmişdir ki, kələm bitkisinin şirəsində xora əleyhinə U vitamini (latınca «ulcus» xora deməkdir) vardır.

Xalq təbabətində: Bir çox ölkələr kələm bitkisindən müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edirlər. Kələmin şirəsindən qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsaq xorasında, xorali kolitdə, ağciyər vərəmində (bal ilə birgə), qaraciyər xəstəliklərinin sağaldılmasında tətbiq edirlər.

Fitoterapevtik göstəriş: Kökü və başcığı şişəleyhinə dərmandır. Toxumlarının dəmləməsi podaqra, oynaq ağrıların müalicəsində və sidikqovucu xüsusiyyətinə görə böyrək xəstəliklərində tətbiq edilir. Kələmin təzə yarpaqları irinli yara və xoraların, şişin, süd vəzisinin (mastopatiya) sağaldılmasında işlədilir.

Hazırlanması: Təzə hazırlanmış kələm şirəsindən gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir (başlangıçda 0,5 stəkan, sonradan dozanı artırmaq lazımdır).

Quru kələm şirəsi (Succus Brassicae siccus): 1 çay qaşığı 0,5 stəkanda həll edilib, gündə 3-4 dəfə yeməkdən 1 saat əvvəl qəbul edilir. Kurs müddəti 3-4 həftədir. 3-6 aydan sonra müalicə təkrar oluna bilər.

Əks göstəriş: Meteorizm və ishal.

ADI QARĞIDALI – ZEA MAYS L.

Bitkinin istifadə orqanı: Gövdəsi və saçaqları.

Kimyəvi tərkibi: Saçaqlarında karotinoidlər, K, B₁, B₂, C, D, E vitaminləri, qlükozidlər (1,15%), yağlar (2,5%) və efirli maddələr (0,12%), saponinlər (3,18%), kitrə (3,8%), inozit, alkaloid (0,05%) sitosterol, kriptoksantin, stiqmasterol, qətran (2,7%), şəkər və acı maddələri vardır.

Xalq təbabətində: Xüsusən xroniki qaraciyər xəstəliklərində saçaqlarının dəmləməsi uzun müddət qəbul edilir. Bu, orqanizmdə maddələr mübadiləsini nizama salır, artıq mayeni kənarlaşdırır. Qarğıdalı saçaqları sedativ təsir edir. Qarğıdalı saçaqları piylənmədə - iştahazaldıcı vasitə kimi işlədilir. Maddələr mübadiləsinin aktivləşdiricisi kimi bir sıra ölkələrin xalq təbabətində istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Ödqovucu, sidikqovucu, qanın laxtalanma müddətini və maddələr mübadiləsini normallaşdıran, qara ciyər, xüsusən öddəşi xəstəliyində çox yaxşı səmərə verir. Böyrəkdaşının yaratdığı travmalarda, nefrit, şəkərli diabet və digər xəstəliklərdə yaranan ödemlərdə tətbiq edilir. Qankəsici maddə kimi hipoprotrombineyada müxtəlif tipli qanaxmalarda istifadə edilir. Xolesistit, xolangit, hepatit və qanaxmalarda təyin edilir. Qarğıdalı yağı (gündəlik doza 50-70 q) qanda xolesterini aşağı saldığından aterosklerozun profilaktika və müalicəsində işlədilir. Eyni zamanda dəri xəstəliklərinin müalicəsində effektivdir. Öddəşi və böyrəkdaşı sancılarında olduqca səmərəlidir. Tərkibindəki qlütamin turşusu psixoz, depressiya, epilepsiya, progressiv əzələ distrofiyası və polimielitdə tətbiq edilir.

Hazırlanması: 3 xörək qaşığı qarğıdalı saçağı 2 stəkan qaynar suda 30 dəqiqə dəmlənərək, gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl (gündəlik doza) qəbul edilməlidir.

Əks göstəriş: İştahın azlığı, aşağı çəki həddi, yüksək qanlaxtalanma müddəti.

ZƏYƏRƏK – LINUM USITATISSIMUM L.

Bitkinin istifadə orqanı: Toxumları.

Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində yağ (40%-ə qədər), A vitamini, karbohidrat, zülal, üzvi turşular, selik (12%-ə qədər), ferment, linamarin qlükozidi vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Toxumlarının dəmləməsi iltihabsorucu və yumşaldıcı təsirə malikdir. Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı, quru öskürəkdə yumşaldıcı kimi istifadə edilir. Kəskinləşən qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində, xroniki qəbizlikdə, düz bağırsaq çatlarında, hemorroyda, sistit, nefrit, sistit və sidik yollarının daş xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Bundan başqa zəif yumşaldıcı maddə kimi spastik qəbizlikdə, dietik məhsul kimi qanda xolesterinin miqdarını aşağı salır, ateroskleroz və piylənmədə istifadə olunur. Aterosklerozun profilaktika və müalicəsində linetol (Linetholum), dəri üçün linol (Linolum preparatı) işlədilir. Angina və faringitlərdə isə qarqara kimi istifadə edilir. Yağı yanığ və yaralanmalarda çox yaxşı təsir edir.

Hazırlanması: 1-3 çay qaşığı kökümsovu su və ya südlə gündə 2-3 dəfə qaynar suda 15-20 dəqiqə dəmlənərək (termosda), yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir.

Əks göstəriş: İshal.

NANƏ – *MENTHA PIPERITA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaqları.

Kimyəvi tərkibi: Xüsusi aromat iyli olmasına səbəb tərkibində efir yağlarının, xüsusən mentolun olmasıdır. Yarpaqlarında efir yağlarının miqdarı 2,75%, çiçəklərində 6% qədər, gövdəsində isə 0,3 % olur. Karotin (40mq%), ursol və olean turşuları, triterpenlər, puleqon, fitonsidlər, hesperidin, flavanoidlər və betain maddələri vardır. Yarpaqlarının tərkibində mentol vardır.

Fitoterapevtik göstəriş: Nanə spazmolitik, ağrıkəsici, antiseptik, ödqovucu və yelqovucu xüsusiyyətlidir. Ürək-damar sisteminin stimullaşdırıcı, ağrıkəsici (xüsusən baş ağrıları) olduğu üçün hipertoniya, stenokardiya, revmatizm, diş ağrısı və ateroskleroz xəstəliyinin müalicəsində istifadə edilir. Yuxarı tənəffüs yolları – bronxial astma və bronxoektaziya xəstəliklərinin müalicəsi üçün məsləhət görülür. Öd yolları və bağırsağın diskenziyasında effekt verir. Həzmi və iştahı artırır. Qastrit, xora xəstəliyi, kolit, enterkolit, meteorizm, tənəffüs, qusma və ishal xəstəlikliyində tətbiq edilir. Öddəsi, hepatit və xolesistit xəstəliklərində bitki çaylarının tərkibinə daxil edilmişdir. Kartof şirəsinin nanə və boymadərənə birlikdə qarışığı yanıqların müalicəsində çox yaxşı səmərə verir. Nanəni fasiləsiz qəbul etdikdə orqanizm möhkəmlənir, sakitləşdirici kimi istəriya, halsızlıq, miqren xəstəliklərinə müsbət təsir göstərməklə yanaşı, həm də diuretik təsir göstərir. Xoş ətirli və dadlı olduğu üçün əksər dərman bitkilərin qarışıqlarına daxil edilir. Xaricə vanna kimi tətbiq edilir. Bu damcı, mikustura, tabletka (validol) və karandaş şəklindədir. Yarpaqlarının tərkibində mentol olduğundan stenokardiya, mədə və bağırsaq sancılarında istifadə edilir. Xaricə nevralkiya, diş ağrılarında, antiseptik, ağrıkəsici və iltihabi xüsusiyyətinə görə yuxarı tənəffüs yollarının – bronxit və bronxoektaziya xəstəliklərində məsləhət görülür. Mentolun valerianla qarışığı - validol, parafinlə qarışığı - karandaş şəklində miqrəndə, zeleninlə valokardin kimi tibbdə istifadə edilir. Bundan başqa yarpaqları iştahanın artırılmasında, tənəffüs və qusmalarda tətbiq edilir. Alman həkimləri mədə xəstəliklərində, meteorizmdə, Avstriya və Bolqar həkimləri yarpaqlarının dəmləmə, bişirmə və yağın-

də-bağırsaq spazmında, meteorizmdə, ishalda, tənənfəslik və qusmalarda öd və qaraciyər xəstəliklərində (daş, sarılıq, böyrək sancıları) və baş ağrılarında işlədirlər. Vannaların qəbul edilməsini də lazım bilirlər. Təzə və qurumuş yarpaqları sup, salat, tərəvəz və ət məhsulları ilə birlikdə qəbul edilməsi məsləhətdir. Çayların tərkibində ödqovucu, tərqovucu kimi, qida, konditer, və parfümeriya sənayesində diş pastası və tozu kimi geniş istifadə edilir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda) gündə 3 dəfə hər dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içmək lazımdır (gündəlik doza). Nanə yağı (*Oleum Menthae piperitae*). Tərkibində 50% mentol diş praktikasında, daxilə 1-3 damcı şəkərlə (meteorizmdə), mentol (*Mentholum*) dəri səpkilərində və mialqiyada işlədilir.

Əks göstəriş: Arterial hipotenziya.

VƏLƏMİR – *AVENA SATIVA L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin quru kütləsi və toxumu.

Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibində nişasta (60%-ə qədər), zülali maddələr (16%-ə qədər), yağlar (9%-ə qədər), xolin, triqonellin, tirozin, fermentlər və B qrup vitaminlər vardır.

Xalq təbabətində: Dəmləməsi sidikqovucu, tərqovucu, hərarətsalıcı və yelqovucu təsir göstərir. Bişirməsi müvazinət aparatını normalaşdırır. Böyrəkdaşı xəstəliyində vələmirin qatı bişirməsini böyrək ətrafına döşədikdə, daşların hərəkətini asanlaşdırır və orqanizmdən xaric olmasına kömək edir.

Fitoterapevtik göstəriş: Dəmləməsi tonuslandırıcı, möhkəmləndirici və iştahlandırıcıdır. Xaricə tətbiqinə gəlincə, oynaq xəstəlikləri, radikulit və müxtəlif dəri xəstəliklərində işlədilir.

Hazırlanması: 3 xörək qaşığı bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda) içmək lazımdır (gündəlik doza). Vanna üçün 0,5 kq vələmir dənini 2 l suda 30 dəqiqə ərzində zəif odda qaynatmaq və vanna etmək lazımdır. Suyun temperaturu 37-38 C⁰ olduqda prosesi daha 10-15 dəqiqə davam etmək lazımdır. Müalicə kursu 15-20 prosedur (həftədə 2-3 vanna) edir.

ƏKİN CƏFƏRİSİ – *PETROSELINUM CRISPUM* (MILL.)A.W.HILL

Bitkinin istifadə orqanı: Bitkinin yerüstü orqanları və toxumu.

Kimyəvi tərkibi: Cəfərinin özünəməxsus aromat iyli olması onun tərkibində olan efir yağlarının (2-7%) olmasına görədir. Meyvələrinin tərkibində epinin qlükozidi və yağlar vardır. Efir yağlarının tərkibindən apiol, pinen və başqa terpen birləşmələri tapılmışdır

Fitoterapevtik göstəriş: Güclü sidikqovucu bitki olduğundan sidik yolu xəstəliklərində, xüsusən böyrək və sidik axarlarının daşlarında, infeksiyon xəstəliklərində (skarlatina, çiçək) təyin edilir. Cəfərinin dəmləməsi qara ciyər, dispepsiya və meteorizm xəstəliklərində olduqca faydalıdır.

Hazırlanması: 1-2 xörək qaşığı bitkini 0,5 l qaynar suda dəmləyərək (termosda), içmək lazımdır (gündəlik doza).

1 çay qaşığı kökü 1stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda), 1 xörək qaşığı gündə 3-4 dəfə içmək lazımdır (gündəlik doza).

Əks göstəriş: Hamiləlik.

BOSTAN ŞÜYÜDÜ - *ANETHUM GRAVEOLENS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yerüstü hissəsi və toxumu.

Kimyəvi tərkibi: Bütün orqanlarında efir yağı vardır. Meyvələrində (20%) piyli yağ, qliserid və yağ turşuları, flavanoidlər, keton (60%), dillapiol (30% qədər), fellandren və limonen maddələri vardır. Gövdə və yarpaqlarında 1,5% efir yağı, fellandren, dillapiol, terpinol, dipenten, proazulen və izimiris-tisinin olduğu təsdiq edilmişdir. Təzə yığılmış şüyüddə flavanoidlər – kversetrin, izoramnetin, kempferol, karotin (64-82 qamm) və C vitamini (135-328mq%) tapılmışdır.

Yarpaqlarında efir yağları (terpen qarışıqları) vardır. Bitki və meyvələrinin tərkibində flavanoidlər, fenxon, anetil, karotin və askorbin turşusu vardır.

Xalq təbabətində: Böyrəkdaşı və sidik yolları xəstəliklərində, hipertoniya xəstəliyinin I-II mərhələlərində, davamlı baş ağrıları ilə müşayiət olunan aterosklerozda işlədilir. Üyüdülmüş və qovrulmuş toxumları südə qatılaraq qəbul edildikdə südverən qadınların südünü artırır. Yemək zamanı köpmə hallarının yaranmaması üçün kulinariyada xüsusən xiyarın və ondan hazırlanan salatların hazırlanmasında əlverişli sayılır. Eyni zamanda pendir və balıq məhsullarının hazırlanmasında da istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Meyvələrindən anetin (*Anethinum* preparatı) dərmanı hazırlanır ki, bu da bağırsaqların sayə əzələlərini qıc edərək spazmi aradan qaldırır. Hipotenziv, sidikqovucu, kardiotonik, spazmolitik, bürüyücü, ödqovucu, öskürəkkəsici və tərqovucu təsir edir. Şüyüd hipertoniya xəstəliyinin başlanğıc stadiyalarında, stenokardiya, nevrozda, zəiflik hallarında yaxşı təsir edir. Bitkinin dəmləməsi uşaq və yeniyetmələrdə damar genişləndirici, bağırsaq sancılarında, meteorizm və qara ciyər xəstəliklərində tətbiq edilir. Kəskin respirator infeksiyalarda dəmləməsi xüsusilə səmərəlidir. Yaxşı öskürəkkəsici və zəif işlədici xüsusiyyəti vardır. Yüksək keyfiyyətli sidikqovucu xüsusiyyətinə görə böyrək və sidik yolları xəstəliklərində istifadə edilir. Südverən qadınların südünü artırır.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı bitkinin yerüstü hissəsi və ya toxumu 1,5 stəkan qaynar suda dəmlənərək (termosda) istifadə edilir (gündəlik doza).

1 q üyüdülmüş toxum 1,5 stəkan suda həll edərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir.

Əks göstəriş: Hamiləlik.

ADI LOBYA – *PHASEOLUS VULGARIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri və meyvə yanlıqları

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrində bir çox amin turşuları – arqinin, tirozin, leysin, lizin, triptofan, xolin, asparaqin, zülal, mikroelementlər (xrom) və hemisellüloza vardır. Qabığının tərkibində olan flavanoidlər, sidikqovucu maddələr (arqinin) antidiabetik təsir göstərir. Tərkibində karbohidrat, karotin, askorbin turşusu, piridoksin, yağ, fosfor duzları, kalium, manqan ionları vardır.

Xalq təbabətində: Meyvələr yerləşən qabıqdan şəkərli diabet və pankreatitdə işlədilir. Bundan başqa revmatizm, assit və böyrək xəstəliklərində tətbiq edilir. Unu ilə hazırlanmış xəmir çiban və frunkulların yumşalaraq dəşilməsinə kömək edir. Böyrəkdaşı, nefrit, revmatizm, işas və podagra xəstəliklərində səmərəli təsir edir. Böyürtkən yarpaqları ilə bərabər qarışığı diabetdə və ekzemada olduqca faydalıdır.

Fitoterapevtik göstəriş: Elmi təbabətdə ətraflı öyrənilməmişdir. 1946 cı ildə yağlı və quru ekstraktı hazırlanmışdır. Bu tərkib eksperimental olaraq qanda alimentar hiperqlikemiya yaratmışdır. Bitkinin dəmləməsindən sidikqovucu məqsəd kimi istifadə edərək, daşların həll edilməsində istifadə edilir.

Hazırlanması: 1 xörək qaşığı toxumunun quru qabıqlarını 250 ml qaynar suda 3-5 dəqiqə dəmləyərək (termosda) gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır.

20 q tozağacı yarpaqları, 10 q qatırquyruğu, 5,0 q boymadərən, 5,0 q nanə qarışığını 250 ml soyuq suya əlavə edib, sonra zəif odda onu 5 dəqiqə qızdırmaq, gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır.

Əks göstəriş: Bu bitkini qəbul edənlər bilməlidirlər ki, toxumun və xammalın uzunmüddət saxlanması zəhərlənmə təhdəti yaradır.

ADI RAZYANA – *FOENICULUM VULGARE* MILL.

Bitkinin istifadə orqanı: Toxumları.

Kimyəvi tərkibi: Razyananın toxumunda efir yağı (2-6%), zülali maddələr (20% qədər), piylər (18% qədər), şəkər (5% qədər) vardır. Efir yağının tərkibində aseton, fenxon, anis turşusu, anis aldehidi, anis ketonu, kamfen, pinen, metil xavikol, α felandren, limon və dipenten maddələri tapılmışdır.

Fitoterapevtik göstəriş: Müalicə məqsədilə mədə-bağırsağın spazmında, dispepsiya, tərqovucu, yuxarı tənəffüs yolları üçün öskürəkkəsici, laktasiyanı gücləndiricisi kimi istifadə edilir. Ağciyər xəstəliklərində, ödqovucu, tərqovucu və möhkəmləndirici qarışıqların tərkibinə verilir.

Ədviyyəli xüsusiyyətinə görə tərəvəz, ət, göbələk, xiyar məmulatlarının konservləşdirilməsində, qənnadı sənayesi və parfümeriyada istifadə edilir.

Hazırlanması: 2 çay qaşığı meyvələrini 200 ml qaynar suda dəmləyərək (termosda) qəbul etmək lazımdır (gündəlik doza).

Aptek preparatı: Razyana yağı (*Oleum Foeniculi*). Meteorizm və öskürəkkəsici dərman kimi 5-10 damcı qəbul edilməlidir.

Razyana suyu (*Aqua Foeniculi*). 1 xörək qaşığı gündə 3-6 dəfə qəbul edilməlidir.

Tərqovucu qarışıq (*Species carminativae*). Tərkibi bərabər hissə razyana, nanə və valeriandan ibarətdir. Meteorizmdə işlədilir. 1 xörək qaşığı 0,5 l qaynar suda dəmləyərək (termosda) qəbul etmək lazımdır (gündəlik doza).

ÇÖL TURPU – *RAPHANUS SATIVUS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvə köklər.

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində qlükozid və efir yağları vardır. Sokunun tərkibində C vitamini (0,12%), lizosim və güclü bakterisid xüsusiyyəti vardır.

Xalq təbabətində: Metabolik artırıqlarda, öd və böyrəkdaşı xəstəliklərində sidikqovucu bitki kimi istifadə edilir. Şirəsi orqanizmdən duz və xolesterini çıxarır. Turp şirəsini balla qatdıqda difteriya və bronxit xəstəliyində öskürəkkəsici dərman kimi istifadə edirlər. Təzə soku nevralgiya, işias və radikulit xəstəliklərində yerli təsir vasitəsi kimi tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Turp tərəvəz kimi çox geniş yayılmışdır. Mədə-bağırsaq sisteminin, xüsusən mədəaltı vəzi sekresiyası və iştahı artırır.

Hazırlanması: 1 çay qaşığı təzə soku gündə 3 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl isti halda içmək lazımdır.

Təzə hazırlanmış soku: Bal ilə (1:1 və ya 1:2) 1 desert və ya 1 çay qaşığı gündə 3 dəfə 20-40 dəqiqə yeməkdən sonra içmək məsləhətdir.

Əks göstəriş: Qaraciyər, böyrək, mədəaltı vəzi, mədə və onikibarmaq xəstəliyin xora xəstəliyi, diffuz toksiki zob və hamiləlik.

SARIMSAQ – *ALLIUM SATIVUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Soğanaq və yarpaqları.

Kimyəvi tərkibi: Fitonsidlərlə zəngindir. Soğanağının tərkibində allinin qlikozidi (0,3%), allinaza fermenti, allisin disulfid, piroüzüm turşusu, ammiak, yağ (0,06%), fitosterin, azotlu maddələr (6,76%), karotin (37,5-60 qamma), vitamin B₁ (0,8 qamm), vitamin B₂ (0,16mq%), vitamin C (16,5-33mq%), efir yağı (0,01-0,05%), disulfid, flavanoid, şəkər (10-11%), pentoza (0,8-1,06%), fitin, inulin, azotlu maddələr, kül (1,44%) və yod (0,0094mq%) maddələri vardır.

Xalq təbabətində: Sarımsaq tərəvəz və dərman bitkisi kimi xalq təbabətində geniş şəkildə istifadə edilir. Güclü bakterisiddir. Sarımsaq infeksiyon və temperatura ilə müşayiət olunan qrip, angina, dizinteriya və digər xəstəliklərinin profilaktika və müalicəsində geniş tətbiq edilir. Əzmə və sokundan məlhəm, sulu məhlul, soğanaq və yarpaqlarından çətin sağalan yara, angina və zökmə, trixomonad kolit, piodermiya, seboreya və döyənəklərdə istifadə edilir. Hələ 5000 il əvvəl Herodot yazırdı ki, Xeops piramidalarında işləyənlərə bolluca sarımsaq və soğan verilirdi.

Sirkəyə salınmış sarımsaqdan yolxucu xəstəliklər, xroniki bronxit, xroniki bağırsaq xəstəlikləri, böyrəkdaşı xəstəliyi, şəkərli diabet, malyariya xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə işlədilir.

Qan təzyiqini aşağı salaraq, maddələr mübadiləsini, xüsusən orqanizmdə xolesterini normallaşdırır, hipertoniya və ateroskleroz xəstəliyinin profilaktika və müalicəsində geniş tətbiq edilir. İştahı artırır, mədə və bağırsağın spazm və sancılarında, meteorizm və xroniki enterkolit xəstəliklərində çox yaxşı təsir edir.

Fitoterapevtik göstəriş: Sarımsaq bağırsağın xroniki xəstəliklərində, atoniyada, qəbizliklə bağlı dispepsiyalarda, amöb dizinteriyasında, kolitin bütün formalarında, enteritdə və ishalda olduqca səmərəlidir. Xüsusən bizquyruq, askarid, nematodlarda (1-2 kökümsovu 200 ml su və ya südlə qəbul edilməlidir) düz bağırsaq imalə edilməlidir. Eyni zamanda təzə sarımsaq suyu (10-40 damcı) qəbul edilməlidir. Hipertoniya xəstəliyi, ateroskleroz, kardioskleroz xəstəliklərində şirətli məhlulu qəbul edilir. Sarımsaq diurezi artırır, böyrək və sidik yolları, böyrəkdaşı və prostat vəzinin adenoma xəstəliyində əvəzsiz dərman bitkisidir.

İmpotensiyada, istənilən helmintlərin qovulmasında klizma kimi, şişəleyhinə, amenoreya, avitaminoz və xroniki dəri xəstəliklərində müvəffəqiyyətlə istifadə edilir.

Allilçep (90% spirt) və allilqlıçep (sarımsaq və qliserin) yod saxlayıcı maddələrdir ki, ateroskleroz, sklerotik formalı hipertoniya xəstəliyində olduqca faydalıdır.

Hazırlanması: Alloxolla (Allocholum) birlikdə qarışıq kimi xroniki hepatit, xolesistit və qəbizliklərdə istifadə edilir. Mədə və bağırsaq sisteminin xəstəliklərində 1-3 dişcik qəbul edilir. Qurd xəstəliklərində 5-6 dişcik 1 stəkan qaynar suda həll edilə bilər.

Xaricə tətbiq etmək üçün 2-3 dişcik sarımsaq 1 stəkan qaynar suda həll edilərək, 40-60 dəqiqə sonra istifadə etmək olar. 5 parça sarımsağı doğrayaraq, üzərinə bir qədər şəkər töküüb qarışdırmaq lazımdır. 5 dəqiqə ərzində qaynama temperaturuna qədər qızdırmaq tələb olunur. Bu tərkib öskürməni olduqca tez kəsir.

Əks göstəriş: Mədə və bağırsaq sisteminin dərin yaralarında, qaraciyər və böyrəyin funksional pozğunluqlarında ehtiyatlı olmaq lazımdır. Gündə ən çox 1-2 dişcik qəbul etmək olar.

SOĞAN – *ALLIUM CEPA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Yerüstü və yeraltı hissəsi.

Kimyəvi tərkibi: Tərkibi əsasən selik, azotlu maddələr, vitaminlər (C, B, A), şəkər (qlükoza, fruktoza, saxaroza, 11% maltoza), flavanoidlər, az miqdarda yod, fitonsid və efir yağlarında ibarətdir.

Xalq təbabəti: Soğan və sarımsaq insanı müxtəlif epidemiyalardan, bədxassəli şişlərdən və qripdən qoruyur. Soğanın fitonsidli xüsusiyyəti yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı xəstəliklərində, angina, dərinin irinli yaralarında bronxoektaziya xəstəliyində və tüklərin uzanmasında əvəzsiz bitkidir. Soku genekologiyada trixomonoz kolpidlərdə və kandidozlarda istifadə edilir. Antihelment maddə kimi 250 ml məhlulu gecələr 3-4 gün qəbul edilir. Bolqar həkimlərinin məsləhətinə görə gecələr azacıq baş soğan yemək vəzinin hipertrofiyasını müalicə edir.

Fitoterapevtik göstəriş: Soğanın tərkibində fitonsid, bakterisid, və antiskleritik maddələr vardır. Bu maddələr mədəbağırsaq sisteminin saya əzələlərini stimullaşdıraraq, sekretor funksiyasını normallaşdırır. Hipertoniya xəstəliyi, asteniya, ateroskleroz və hipovitaminozlarda tətbiq edilir. Soğan iştahı artırmaqla, bağırsaq atoniyasında, qəbizlikdə və xroniki enterkolitin müalicəsində istifadə edilir. Qalxanvari vəzinin hipertrofiyasında, şəkərli diabetdə, frunkulyozda, impontensiyada və orqanizmin möhkəmləndirilməsində istifadə edilir.

Hazırlanması: Təzə soğan suyu (1 hissə soğan suyu 2 hissə bal) balla birlikdə (1 xörək qaşığı qarışıq) gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir.

SOĞAN – *ALLIUM URSINUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Gövdə, soğanaq.

Kimyəvi tərkibi: Soğanağının tərkibində yod olduğu ateroskleroz xəstəliyində əvəzsiz dərmandır. Bundan başqa yarpaq və çiçəklərinin tərkibində allinin qlikozidi, kükürlü efir yağları, divinil sulfid, propildisulfid maddələri tapılmışdır. Fitonsid və bakterisid xassələrə malik olmaqla, yüksək keyfiyyətli vitaminlər vardır. Soğanağının tərkibində olan efir yağları az öyrənilmişdir. Yığılmış təzə yarpaqlarında 700mq%, soğanağında 100mq%, gövdəsində 16 mq%, çiçəklərində isə 0,59mq% C vitamini olduğu aşkarlanmışdır.

Xalq təbabətində: Frunkul və çibanlarındeşilməsində (20 qram baş soğan 200 qram xamır) və virus xəstəliklərində tətbiq edilir.

Allilsep (*Allilcepum preparatı*) –Yaşıl kütlənin spirtli məhlulu və qliserin qarışığı.

Əks göstəriş: Mədə-bağırsaq traktı sisteminin narahatçılığı, qara ciyər, böyrək xəstəlikləri

ÇUĞUNDUR – *BETA VULGARIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvəkökləri.

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində şəkər, rəngləyici maddələr (antosian), üzvi turşular (oksalat, alma və s.), piyli maddələr, C və B₁ vitamini, azotlu maddələr vardır. Eyni zamanda betain, ksantin, hipoksantin, adenin, karnin, qvanin, qlütamin turşusu, arqinin, asparagin, kalium (33,4 – 46,6%), karotin, provitamin A, fol turşusu və azotlu törəmələr tapılmışdır.

Xalq təbabətində: Şirəni xəmirlə qarışdırıb (qənd xəmiri) müxtəlif çibənlərdə (frunkul, kabunkul) yaranın üzərinə, yetişdirmək və deşmək üçün qoyulur. Eyni zamanda bu məhlul termiki yanıqlarda da tətbiq edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Meyvəköklərinin sokunu babasil xəstəliyi zamanı gündə 3 dəfə 2-3 ay ərzində qəbul etmək lazımdır. Balla birlikdə vərəm və hipertoniya xəstəliyində 1 ay qəbul edilir.

Əks göstəriş: Qanın normadan artıq olması.

ISTIOT – *CAPSICUM ANNUUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri.

Kimyəvi tərkibi: Meyvələrinin tərkibində kapsaisin alkaloidi (0,2%), steoridli saponinlər, yağlar (10% qədər), efir yağları (1,12%), karotinoidlər: piperin, kapsantin (0,4%), kapserubin, zeaksantin, violaksantin, ksantofill, ksantofill epoksid, krito-ksantin, sitroksantin, *b* karotin, neo *b* karotin, *b* karotin epoksid və s. maddələr vardır. Fitonsid xüsusiyyətləri üstünlük təşkil edir. Təzə meyvələrində C (200-384,4%) və B (0,4 qamma) qrup vitaminləri, karotin (1,-23,5%), vardır.

Xalq təbabətində: Spirtli məhlulu revmatizm xəstəliyində xaricə tətbiq edilir. Lətlı hissəsi ədviyyat kimi işlədilir.

Hazırlanması: Spirtli məhlulu gündə 2-3 dəfə 10-20 damcı yeməkdən əvvəl iştahlandırmaq, mədə-bağırsaq traktına stimullaşdırıcı və antibakterial təsir etməklə həm də temperatura hallarında işlədilir.

Əks göstəriş: Bitkiyə qarşı yüksək həssaslıq olduqda.

BALQABAQ – *CUCURBITA PEPO* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvə və toxumları.

Kimyəvi tərkibi: Toxumlarının tərkibini yağ, zülali maddələr, pektin, az miqdarda alkaloid, tirozin, leysin, qlobulin, fitin amin-turşuları, nişasta, salisil turşusu, qətranlı maddələr, hormonabənzər maddələr, oksiserotin turşusu, karotinoidlər, selen, xüsusən E, eyni zamanda C və B₁ vitaminləri (0,2 mq% qədər) təşkil edirlər. Toxumlarında olan piyli yağların tərkibində linol, palmitin, stearin və olein turşuları vardır. Meyvələrinin tərkibində şəkər (4-11%), azotlu maddələr (1,1%), yağ (0,13%), pektinli maddələr (5,16%), silikat və fosfat turşuları, kalium, kalsium, manqan, dəmir mikroelementləri, karotin (1 q-da 50 qamma), B₁ (0,2 qamma), C və B₂ vitaminləri (8 mq%) və nikotin turşusu vardır. Böyrək xəstəliklərində, prostatın xoşxassəli şişlərində (I və II stadiyalar) ən azı 2 ay qəbulu səmərəlidir.

Xalq təbabətində: Toxumlarının 1:4000 nisbətindəki sulu məhlulu dəyirmi qurdların (parazitlərin) salınmasında istifadə edilir. Balqabaqdan hazırlanmış mürəbbə mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyində faydalıdır. Bundan başqa qaraciyər xəstəliklərində ödqovucu, nefritdə güclü sidikqovucu təsir edir. Eyni zamanda meyvələrinin soku sidikqovucu, toxumları qurdqovucu təsirə malikdir. Uşaqların gecə sidiyini saxlaya bilmədiyi hallarda əvəzedilməzdir.

Hazırlanması: Qurdların salınması üçün toxumlarının qabığı kənar edildikdən sonra içindəki boz-yaşıl kütlə toplanılmalı, sür-tərək yuyulmalı su və ya südlə içilməlidir. 3-4 yaşlılarda 75 q, 5-7 yaşlılarda 100 q (10-150 qrama qədər) yeməkdən əvvəl qəbul edilməlidir. 3-4 saat sonra işlədici verilməli, 0,5 saat sonra imalə edilməlidir. Sidikqovucu məqsədlə, gündə 2-3 dəfə 1 xörək qaşığı toxumu dəmləyərək qəbul edilməlidir. Müalicəni 2 həftəyə qədər davam etdirmək lazımdır.

Əks göstəriş: Qovrulmamış toxumlarını çox qəbul etmək olmaz.

XARDAL- *SINAPIS ALBA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Toxumları.

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində sinegrin qlikozidi, 25-40% yağ və nişasta vardır. Tərkibindəki mirozin fermenti isti su mühitində aktivləşərək, sinegrin qlikozidini parçalayaraq, kalsium sulfata, efir yağlarına və qlikozaya parçalayır.

Xalq təbabətində: Revmatizmin hər bir formasında müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Qidanın tərkibində mədə şirəsinin ifrazını artıraraq antiseptik və iştahlandırıcı təsir edir.

Fitoterapevtik göstəriş: Bronxit, plevrit, nevrit, radikulit, revmatizm xəstəliklərində vanna kimi (2 xörək qaşığı tozu 1 vedrə suda həll edilir) qəbul edilir. Tənəffüsü yaxşılaşdırır, qandövranı fəaliyyətini artırır, bəlgəmi durulaşdırır və çıxmasını asanlaşdırır. Spirtədə ekstraksiya olunmuş bitki xammalından alınan maddə xüsusən revmatizm də çox səmərəlidir.

Əks göstəriş: Ağciyər vərəmi və böyrək xəstəliklərinin kəskinləşmə dövrü.

POMIDOR- *SOLANUM LYCOPERSICUM* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Meyvələri.

Kimyəvi tərkibi: Tərkibində pektin və azotlu maddələr, şəkər, askorbin, limon, alma, oksalat və çaxır turşuları, flavonoidlər, alkaloidlər, tiamin, likopin, riboflavin, karotin, purin və minerallar (xüsusən kalium) vardır.

Xalq təbabətində: Həzmi asanlaşdırır, mədə yarasında, arıqlamalarda, böyrəkdaşında və irinli yaralarda istifadə edilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Tərkibində çoxlu vitaminlər, kalium, dəmir, maqnezium, kobalt, sink vardır. Bu maddələr ürək-damar xəstəlikləri və maddələr mübadiləsi pozğunluqları üçün çox faydalıdır. Eyni zamanda tərkibində yüngül işlədici və bağırsaq peristaltikasını artıran maddələr vardır. Təzə hazırlanmış tomat qan təzyiqini aşağı salır, mikroorqanizmlərin inkişafını ləngidir və qanda xolesterinin miqdarını azaldır.

Əks göstəriş: Qan laxtalanması vaxtından tez olan zaman istifadəsi məhdudur.

ƏKİN KÖKÜ – *DAUCUS SATIVUS* ROEHL.

Bitkinin istifadə orqanı: Tibbi məqsədlə kök meyvələrindən və toxumlarından istifadə olunur.

Kimyəvi tərkibi: Kök meyvəsinin tərkibində çoxlu miqdarda şəkər, az miqdarda nişasta və pektin maddələri, çoxlu lesitin, sel-lüloza, digər fosfatidlər, mineral duzlardan kalium duzu, karotin, B qrupu vitaminləri, piridoksin, nikotin və fol turşusu, K, D vi-tamini vardır. Bundan başqa fitoen, fitofluen, flavonoidlər, anto-sianidlər, piyli yağlar, efir yağları, kumarin, kül elementləri (1,03 dəmir və s.), sərbəst alma turşusu, mannit və s. vardır.

Xalq təbabətində: Yağlı məhlulu (1 ml yağ + 2 mq kök suyu) təpitmə, kompress, emulsiya şəklində çətin sağalan və irinli yaralarda, yanıqlarda, donmalarda və s. işlədilir.

Fitoterapevtik göstəriş: Yerkökünün toxumundan alınan «daukarin» preparatı spazmolitik və damargənəldirici təsirə ma-likdir, «karotonaftalan» məlhəmi dəri xəstəliklərinin müalicəsində işlədilir, təzə halda A və B qrup vitaminlərinin avitaminozun-da, görmənin zəifləməsində, göz epitelinin atrofik distrofik də-yişikliyiində, tonuslandırıcı, qəbzlikdə, qara ciyər, böyrək, ürək-damar sistemi xəstəliklərində, mineral mübadilə pozğunluqla-rında, yüngül işlədici, sidikqovucu kimi, qanazlığında, orqaniz-min ümumi müqavimətini yüksəldiji kimi, həzmi yaxşılaşdırıcı vasitə kimi, ana südü ifrazını artıran, bal və ya şəkərlə qa-rışığından isə tənəffüs yollarının katarında işlədilir.

REYHAN – *OCIMUM BASILICUM L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Yarpaqları

Kimyəvi tərkibi: Reyhan bitkisi efir yağları ilə zəngindir. Bundan başqa tannin, saponinlər, aşı maddələri, C, K vitaminləri, üzvi turşular, qətranlı maddələr, flavonoidlər, karotin, xlorofil vardır.

Xalq təbabətində: Bu bitkinin tərkibinə daxil olan flavonoidlər, karotin, efir yağları, xlorofil mədə-bağırsaq xəstəliklərində, avitaminozda, qanazlığında əvəzsiz təsirlər göstərir.

Bundan başqa mədənin həzm prosesinin fəaliyyətini artırır, maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, qanın tərkib hissəsini normal vəziyyətdə saxlayır, böyrək və sidik yollarının iltihabını aradan qaldırır, qaz qovucu, spazmolitik, güclü bakteriosid, qıcolma əleyhinə təsirə malikdir.

Hazırlanması: Yarpaqlarından hazırlanmış spirtli, duru ekstrakt qanda protrombinin miqdarını artırır, qanın laxtalanmasını sürətləndirir.

KARTOF – *SOLANUM TUBEROSUM L.*

Bitkinin istifadə orqanı: Dərman məqsədilə yetişmiş kök yumrularından və çiçəklərindən istifadə olunur.

Kimyəvi tərkibi: Kartof qabığının tərkibində zəhərli qlikoalkaloid olan solanin vardır. Bu ən çox qabığı yaşıllaşmış kartofda olur.

Xalq təbabətində: Təbabətdə vərəmə qarşı, tənəffüs orqanı xəstəliklərində, mədə, on iki barmaq bağırsaq yarasında, mədə turşusunun yüksəlməsində və davamlı başağrılarında, müxtəlif dəri xəstəliklərində, ekzema və I-II dərəcəli dəri yanıqlarında işlədilir.

Hazırlanması: 1/2 stəkan çiy kartof suyu-gündə 3 dəfə, yeməkdən 30 dəq. əvvəl və yatmadan əvvəl qəbul edilməlidir.

ÇƏLTİK – *ORYZA SATIVA* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Dəni (toxumu)

Kimyəvi tərkibi: Dəninin tərkibində nişasta, B₁ vitamini vardır.

Xalq təbabətində: Düyü həlimindən müxtəlif qarışıqlarla bronxial astmanın müalicəsində, firni yeməyindən isə möhkəmləndirici və güc bərpaedici vasitə kimi istifadə edilir.

Elmi təbabətdə: Düyü nişastasından müxtəlif tozlarda, məhləmlərdə, pastalarda işlədilir.

DƏRMAN BƏDRƏNCİ – *MELISSA OFFICINALIS* L.

Bitkinin istifadə orqanı: Zirvə yarpaqları.

Kimyəvi tərkibi: Toxumlarında tünd limon iyi verən efir yağı (20%) vardır (əsas komponentləri- sitral, siranellal, mirsen və heranilol). Bundan başqa selik, qətran, acı və aşı maddələr, askorbin (150mq%), kofein, olein və ursol turşuları vardır.

Xalq təbabətində: Qadın xəstəliyində istifadə edilir. Bundan başqa ağır zəhərlənmələrdə təmizləyici imalələrin aparılmasında əvəzsiz hesab olunur. Dəmləməsi tənəffüs və ürək-damar sistemini nizama salır, arterial qan təzyiqini aşağı salmaqla, sedativ təsir göstərir. Hemorroy qəbizliyi zamanı bədrənc şirəsini qaynar su ilə həll etdikdən sonra imalə etmək olar.


Fitoterpevtik göstəriş: Bədrəncdən nevroz, isteriya, miqren, yüksək cinsi aktivlik, halsızlıq, arterial hipertenziya, ateroskleroz, başgicəllənmə və qulaqlarda küy zamanı istifadə edilməsi məsləhət görülür. Mədə-bağırsaq ağrılarında, iştahasızlıqda, xroniki qəbizlikdə, metiorizmde, qanazlığı və podaqrada tətbiq edilməsi effektivdir.

Hazırlanması: 2 xörək qaşığı üyüdülmüş bitkini 2 stəkan qaynar suda dəmləyərək (termosda) içmək lazımdır (gündəlik doza).

Əks göstəriş: Arterial hipotenziya.



Şək.1. İnnab-*Ziziphus jujuba*



Şək. 2.Ərik- *Armeniaca vulgaris*



Şək.3. Heyva *Cydonia oblonga*



Şək.4. Zeytun *Olea europaea*



Şək.5.Badam-*Amygdalus communis*



Şək.6. İydə *Elaeagnus angustifolia* L



Şək.7. Ağ tut – *Morus alba*



Şək.8. Turş albalı *Cerasus austera*



Şək.9. Şərq Küknaı-*Picea oreintalis*



Şək.10. Ağ söyüd-*Salix alba* L.



Şək.11. Sallaq tozağacı-*Betula pendula*



Şək.12. Ağ tozağacı-*Betula alba*



Şək.13. Adı palıd *Quercus robur*




Şək.14. Yunan qozu-*Juglans regia*




Şək.15. Ağ şabalıd *Aesculus hippocastanum*



Şək.16. Ürəkşəkilli çökə-
Tilia cordata




Şək.17. Adi ardıc-
Juniperus communis



Şək.18. Şərq tuyası-
Thuja occidentalis



Şək.19. Şərqi fısıdğı-*Fagus orientalis*



Şək.20.Üzüm-*Vitis vinifera*




Şək.21. Nar-*Punica granatum*



Şək.22.Limon-*Citrus limon*



Şək.23. Moruq-*Rubus idaeus*




Şək.24. Bozumtul bö-yürtkən-*Rubus caesius*



Şək.25. Gənəgərcək-
Ricinus communis




Şək.26. Qafqaz quşarmu-
du-*Sorbus caucasigena*



Şək.27. Adi quşarmudu
Sorbus aucuparia L.



Şək.28. Qara meyvə-
Aronia melanocarpa




Şək.29. Yasomon-*Syringa*
vulgaris




Şək.30. Qara qarağat-
Ribes nigrum




Şək.31. Meşə gilası-*Prunus padus*



Şək.32. Çılpaq biyan-*Glycyrrhiza glabra*




Şək.33. Beşyuvallı yemişən-*Crataegus pentagyna*



Şək.34. Qafqaz yemişəni-*Crataegus caucasica*



Şək.35. Çay tikanı-*Hippophae rhamnoides*



Şək.36. Armud-*Pyrus communis*



Şək.37. Əncir-*Ficus carica*



Şək. 38. Zoğal-*Cornus mas*



Şək.39. Zirinc-*Berberis vulgaris*



Şək.40. Adi qaragilə-
Vaccinium myrtillus



Şək.41. Mərcəngilə-
Vaccinium vitis idaea



Şək.42. Gəndəlaş-
Sambucus nigra



Şək.43. Aloe
(Əzvay) – *Aloe*
arborescens



Şək.44. İşlədici
murdarça –
Rhamnus cathartica




Şək.45. Meşə çiyələyi –
Fragaria vesca



Şək.46. Adi başınağacı–
Viburnum opulus



Şək.47. Qəhvəyi itburnu–
Rosa cinnamomeae



Şək.48. Qizilgül– *Rosa*
damascena.




Şək.49. Bataqlıq mərcanı –
Oxycoccus quadripetalus




Şək.50. Ovalşəkilli
mürdarça–*Frangula alnus*




Şək.51. Adi ayıqulağı–
Arctostaphylos uva-ursi



Şək.52. Qara quşüzümü –
Solanum nigrum



Şək.53. Çin cirlimonu –
Schisandra chinensis



Şək.54. Böyük pitraq –
Arctium lappa



Şək.55. Adi kasni –
Cichorium intybus



Şək.56. Şərq küncütü –
Sesamum indicum



Şək.57. Zaqafqaziya kəkotusu –
Thymus transcaucasicus



Şək.58. Kəklikotu –
Thymus serpyllum



Şək.59. Acı yovşan –
Artemisia absinthium



Şək.60. Adi yovşan –
Artemisia vulgaris




Şək.61. Üzərlik –
Peganum harmala




Şək.62. Küstüşam – *Bryonia*
alba



Şək.63. Çaq (ağac göbələyi)–
Inonotus obliquus



Şək.64. Aciliqotu- *Ephedra*
vulgaris



Şək.65. Jenşen–*Panax ginseng*



Şək.66. Eleuterokokk –
Eleutherococcus
senticocus




Şək.67. Dərman gülxətmı –
Althaea officinalis



Şək.68. Gecəvər – *Acorus calamus*



Şək.69. Dağ öküzotu –
Arnica montana



Şək.70. Solmazçiçək - *Helychrysum arenarium*




Şək.71. Dərman valerianı-
Valeriana officinalis



Şək.72. Dərman qulançarı –
Asparagus officinalis



Şək.73. Yoncayarpaq menyanta –
Menyanthes trifoliata



Şək.74. Dəniz kələmi –
Laminaria sacharina



Şək.75. Minaçiçəyi –
Veronica officinalis



Şək.76. Qırxbuğum–
Polygonum bistorta



Şək.77. Subibəri -
Polygonum hydropiper




Şək.78. İran qırxbuğumu-
Polygonum persicaria




Şək.79. Quşdili –
Polygonum aviculare



Şək.80. Andız-
Inula helenium




Şək.81. Dərman Xəşəmbülü –
Melilotus officinalis



Şək.81-a. Tikanlı pıtraq-
Xanthium spinosum




Şək. 82. Adi qaraqıñıq –
Origanum vulgare




Şək.83. Dazıotu –
Hypericum perforatum



Şək.84. Göyçiçək isitməotu –
Centaurea cyanus




Şək.85. Kiçik isitməotu –
Centaurea minus



Şək.86. Dərman gülümbaharı –
Calendula officinalis



Şək.87. Yağıotu –
Chamaenerium angustifolium



Şək.88. Uçyarpaq yonca –
Trifolium pratense



Şək.89. Dəvədabani –
Tussilago farfara



Şək.90. Sığırquyruğu –
Verbascum thapsiforme



Şək.91. Sincanotu –
Sanguisorba officinalis



Şək.92. Dərman Zəncirotu –
Taraxacum officinale



Şək.93. Adi quşəppəyi –
Capsella bursa – pastoris



Şək.94. Bahar xoruzgülü –
Primula veris



Şək.95. Qaz qaytarma –
Potentilla anserina



Şək.96. Düz qaytarma –
Convallaria majalis



Şək.97. May İnciçiçəyi –
Potentilla erecta



Şək.98. Gəvən –
Astragalus dasyanthus



Şək.99. Çatılotu-
Euphrasia officinalis



Şək.100. Toppuztikan-
Echinops ritro




Şək.101. Dağtərxunu –
Tanacetum vulgare



Şək.102. Böyrək çayı –
Oorthosiphon stamineus



Şək.103. Tükcüklü damotu –
Leonurus quinquelobatus



Şək.104. Ürək damotu -
Leonurus cardiata



Şək.105. Ayriqotu –
Agropyron repens



Şək.106. Rəvənd (uşqun) –
Rheum ribes



Şək.107. Qaya rəvəndi –
Rheum rupestre



Şək.108. Aptek çobanyastığı –
Matricaria chamomilla



Şək.109. Sədo –
Ruta graveolens



Şək.110. Ücrəng bənövşə -
Viola tricolor



Şək.111. Ətirli bənövşə -
Viola odorata



Şək.112.Üçbarmaq –
–*Equisetum arvense*



Şək.113. Çöl qatırquyruğu
Bidens tripartita



Şək.114. Adi mayaotu –
Humulus lupulus




Şək.115. Böyük dəmrovotu –
Chelidonium majus



Şək.116. Dərman sürvəsi –
Salvia officinalis




Şək.117. At əvəliyi –
Rumex confertus



Şək.118. Ağ ballibaba (Dalamaz) –
Lamium alhum

Şək.119. Şüvəran –
Sisymbrium officinale



Şək.120. Boyaqotu –
Coronilla varia

Şək.121. Aciyonca –
Rubia tinctorum



Şək.122. Üskükotu –
Digitalis ferruginea

Şək.123. Öküzboğan –
Bupleurum rotundifolium



Şək.124. Ballica -
Pulmonaria officinalis



Şək.125. Erkək ayidöşəyi –
Dryopteris filix-mas



Şək.126. Çöl qatırquyruğu –
Equisetum arvense



Şək.127. Gücotu –
Agrimonia eupatoria



Şək.128. Qara çörəkotu –
Nigella sativa



Şək.129. Qitiqotu –
Armoracia rusticana

AZƏRBAYCANLILARIN QƏDİM XALQ TƏBABƏTİ MÜALİCƏ ÜSULLARI

Təcrübədə sınaq edilmiş seçmə reseptlər

ANEMİYA (qanazlığı)

- ✓ Qəhvəyi itburnu və çiyələk meyvələrinin (hər biri 10 q) üzərinə 1 stəkan qaynanmış su əlavə edib, 15 dəqiqə dəmləmək, soyutmaq, tənizdən süzmək və gündə 2 dəfə 0,5 stəkan qəbul etmək lazımdır.
- ✓ Meşə çiyələyi yarpağını (20 q 1 stəkan qaynanmış suya) çay kimi dəmləyərək, xörək qaşığı ilə gündə 3-5 dəfə qəbul etmək lazımdır.
- ✓ Adi quşarmudu və itburnu meyvəsindən (hər biri 25 q bir stəkan qaynadılmış su) çay kimi dəmləyərək, gündə 3-5 dəfə 1 stəkan qəbul etmək lazımdır.
- ✓ Çaytikanının meyvə, yarpaq və cavan budaqlarını çay kimi dəmləmək lazımdır.
- ✓ Yerkökü, çuğundur və ağ turpun tozu hazırlanmış şirəsi. Gündə 1-2 dəfə 1 çay qaşığı qəbul etmək lazımdır.

ANGINA (boğaz ağrısı)

- ✓ Baş soğanı ət maşınından keçirərək qaba qoyub gündə 3 dəfə 2-3 dəqiqə yaxından nəfəs almaq lazımdır.
- ✓ 0,5 çay qaşığı soda, həmin miqdarda duz və 4 damcı yod qaynanmış ılıq suda qarışdırılaraq gündə 2 dəfə qarqara edilir.
- ✓ Qaragilə meyvəsinin həlimi (100q meyvə 0,5 litr qaynanmış su) ilə qarqara edilməlidir.
- ✓ Gülümbahar dəmləməsi (20 q bitki və 1 stəkan qaynanmış su) ilə qarqara edilməlidir.

- ✓ 1 dilim limonu ağızda saxlamaq və sonra udmaq lazımdır.
- ✓ Alma sirkəsi (1 stəkan suya 1 çay qaşığı alma sirkəsi) ilə qarqara etmək olar.
- ✓ Sol əli boyun ardına yerləşdirmək sağ əlin ovucu ilə boğazı sıxırlar. Prosedura gündə bir neçə dəfə təkrar edilir (İbn-Sina üsulu).
- ✓ Sağ əlin baş barmağının birinci falanqası bükülür və həmin falanqa dişlərin arasına yerləşdirilir. Bu vəziyyətdə başı 8-12 dəfə arxaya çevirmək lazımdır (İbn-Sina üsulu).
- ✓ 1 xörək qaşığı kəndəlaş yarpağı 1 stəkan qaynanmış suda dəmlənilir, 2 xörək qaşığı gündə 5-6 dəfə qəbul edilir.

ARITMIYA (ürək döyüntüsü)

- ✓ Çobanyastığı çiçəyi, nanə, razyana, valerian kökü və zirə toxumu (hər birindən 1 xörək qaşığı) 0,5 litr suda dəmlənilir. Gündə 1 dəfə axşam 1 stəkan qəbul edilir.
- ✓ Yemişan çiçəyi (20q 200ml suda) dəmlənilərək gündə 4-5 dəfə hər dəfə 100 ml qəbul edilir.

ARTERIAL HIPERTENZIYA (təzyiq)

- ✓ Çuğundur, yerkökü və qara turp şirəsini (hər biri 1 stəkan) 1 ədəd limon şirəsi və 1 stəkan bal ilə qarışdırıb, gündə 3 dəfə 1 xörək qaşığı yeməkdən 3 saat sonra 2 ay qəbul etmək lazımdır.
- ✓ 1 stəkan süddə 2 baş sarımsağı yumşalanadək qaynatmalı və süzməli. Gündə 3 dəfə 1 xörək qaşığı 10-15 gün qəbul edilir.
- ✓ 2 çay qaşığı alma sirkəsi 1 stəkan suda həll edilərək qida ilə qəbul edilir.
- ✓ Çuğundur şirəsi və bal (1:1) ilə qarışdırılaraq gündə 4-5 dəfə qəbul edilir.

ARTRIT

- ✓ 2 çay qaşığı mərcangilə yarpağı 1 stəkan suda zəif odda 10-15 dəqiqə qaynadılır, soyudulur və tənzidən süzülür. Qarışıq gələn ərzində qəbul edilir.
- ✓ Quruğat, mərcangilə və itburnu yarpaqları bərabər hissədə 1 stəkan qaynannmış suda dəmlənir 2 xörək qaşığı gündə 1 dəfə qəbul edilir.
- ✓ Oynaq ağrılarını azaltmaq üçün 2 stəkan qara turp şirəsinə 1 xörək qaşığı duz, 0,5 stəkan ural və 1 stəkan bal əlavə edərək yaxşıca qarışdırılır. Qarışıq ağrı nahiyyəsinə sarğı kimi qoyulur.

ARTROZ

- ✓ 2 xörək qaşığı mürdarça qabığı, 2 çay qaşığı zəncirotu kökü, 2 çay qaşığı cəfəri bitkisi və 2 çay qaşığı nanə yarpaqları 0,5 litr suda dəmlənir səhər yeməkdən əvvəl 2 xörək qaşığı qəbul edilir.

BRONXIAL ASTMA

- ✓ Eyni miqdarda qarışdırılmış kəndalaş yarpağı, bağayarpağı, ücrəng bənövşə yığımından 4 çay qaşığı götürülərək 0,5 litr suda zəif odda 1 saat qaynadılır. Ilıq halda gündə 3 dəfə qəbul edilir.
- ✓ Biyan kökü, ücrəng bənövşə (hər biri 1 çay qaşığı) və 4 çay qaşığı kəklikotu suda dəmlənərək gündə 4 dəfə qəbul edilir.
- ✓ Biyan kökü (20q 200ml suda) dəmlənərək gündə 3 dəfə 1 il ərzində qəbul edilir.

ATEROSKLEROZ

- ✓ Boymadərən və zəif dazı (hər biri 1 xörək qaşığı) 1 stəkan suda dəmlənir və 1 il ərzində qəbul edilir.

- ✓ Yemişan çiçəyi, qatırquyruğu, cəzair bənövşəsi (hər biri 2 xörək qaşığı) və 2 çay qaşığı boymadərən 1 stəkan suda dəmlənilir və 1 il ərzində qəbul edilir.
- ✓ Sarımsaq cövhəri 20 damcı gündə 2-3 dəfə yeməkdən sonra qəbul edilir.
- ✓ Baş soğanın etil spirtində tinkurası 20 damcı gündə 3 dəfə qəbul edilir.
- ✓ 350 q sarımsaq 2 dəfə ət maşınından keçirilərək üzərinə 200 ml spirt əlavə edilərək 9-10 gün qaranlıq, sərin yerdə saxlanılır və süzülür. Gündə 2 dəfə 20 damcı südlə qəbul edilir. Müalicə kursu 5 ildə 1 dəfə aparıla bilər.

BAĞIRSAQ QURDLARININ (HELMINTOZLAR) QOVULMASI

- ✓ Orta ölçülü 1 baş soğanı xırdalayaraq üzərinə 1 stəkan soyuq su əlavə edərək 10-12 saat saxlayıb süzmək lazımdır. 0,3 stəkan gündə 1 dəfə 7-10 gün qəbul edilir.
- ✓ 1-2 baş sarımsağı xırdalayaraq üzərinə qaynanmış isti süd əlavə edilir və 10-12 saat saxlanılır. Gündə 2 dəfə yeməkdən əvvəl 10-12 gün qəbul edilir.

BAŞ AĞRISI

- ✓ 2 xörək qaşığı süpürgə kolunun cavan budaqları 0,5 litr qaynar suda dəmlənilir gündə 1 dəfə qəbul edilir.
- ✓ 2 çay qaşığı bal və 2 çay qaşığı alma sirkəsi 1 stəkan suda qarışdırılaraq gündə 1 stəkan olmaqla, 30 gün ərzində qəbul edilir (ingilis vasitəsi).
- ✓ 20 qram arı mumunu (propolis) 100 qram etil spirtində həll edilərək, 40 damcı çörək üzərinə hopduraraq yeyilir (rus vasitəsi).

BOĞAZ URU (ZOB)

- ✓ Qozun içərisindəki arakəsmə (2 xörək qaşığı xırdalanmış ara qacaq) 1 stəkan etil spirtində 2 gün ərzində saxlanılır. Gündə 1 dəfə 1 çay qaşığı olmaqla südlə qəbul edilir.
- ✓ Biyan kökü (1 xörək qaşığı) və boyaqotunun (2 xörək qaşığı) həlimi. Səhər 1 stəkan qəbul edilir.
- ✓ Itburnu meyvəsinin həlimi. 0,5 stəkan gündə 3 dəfə qəbul edilir.

BÖYRƏKDAŞI XƏSTƏLİYİ

- ✓ 1 çay qaşığı kətan toxumu 1 stəkan suda qaynadılaraq gün ərzində 2 saatdan bir 0,5 stəkan qəbul edilir. Dadı yaxşılaşdırmaq üçün limon şirəsi əlavə etmək olar.
- ✓ Zirə, murdarça qabığı, gülxətmi, nanə yarpağı və sürvə (hər biri 1 xörək qaşığı) 1 stəkan suda dəmlənir, axşam yatmadan əvvəl 1 stəkan qəbul edilir.
- ✓ Badrinc (*Melissa officinalis*) yarpağı, nanə yarpağı və çobanyastığı çiçəyi 1 stəkan suda dəmlənir və gün ərzində qəbul edilir.
- ✓ Dəmirvotu və nanə yarpağı 2 çay qaşığı 1 stəkan suda dəmlənir və gün ərzində 2 dəfə (səhər və axşam) yeməkdən əvvəl 1 stəkan qəbul edilir.

BRONXIT (öskürmə)

- ✓ 500 q baş soğan ət maşınından keçirilərək, üzərinə 1 litr su, 50 q bal, 400 q şəkər tozu əlavə edilir. 2 saat ərzində zəif odda qaynadılır və soyudulur. 2 xörək qaşığı gündə 3 dəfə qəbul edilir. Qarışıq hava keçməyən şüşə qabda saxlanılmalıdır.
- ✓ Qara turpu süzgəcdən keçirilərək tənziflə sıxmaq, 1 stəkan şirəyə 400 q bal qatmaq lazımdır. 2 xörək qaşığı günorta yeməkdən qabaq və axşam yatmadan əvvəl qəbul edilir.

- ✓ 4 hissə və 1 hissə şəkər qarışdırılaraq mayenin yarısı buxarlananadək zəif odda qızdırılır. 1 çay qaşığı gündə 2-4 dəfə qəbul edilir (İtaliya təbabəti).
- ✓ 2 xörək qaşığı qliserin, 1 limon şirəsi və 200 q bal qarışdırılaraq 1 çay qaşığı gündə 2 dəfə qəbul edilir (Polşa təbabəti).
- ✓ 2 baş sarımsaq və 5 limon süzgəcdən keçirilərək üzərinə 1 litr su əlavə edilir. 5 gün saxlanılır, tənizdən süzülür. 1 xörək qaşığı gündə 2 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl qəbul edilir (Polşa təbabəti).
- ✓ Payızın sonunda yığılmış moruq kökü (50 q 0,5 litr su) zəif odda qaynadılır, 0,25 stəkan gündə 2-3 dəfə qəbul edilir (Polşa təbabəti).

VEGETATIV DAMAR DISTONİYASI (damar xəstəliyi)

- ✓ Yemişan, damotu, nanə (hər biri 1 çay qaşığı) 1 stəkan qaynar suda dəmləyərək, tənizdən süzülür. 1 xörək qaşığı gündə 3 dəfə qəbul edilir. 3 həftə fasilə verdikdən sonra müalicə davam etdirilə bilər.

VIRUS HEPATITI (qara ciyər xəstəliyi)

- ✓ Pişikotu kökü, yemişan çiçəyi, zərinc qabığı və nanə yarpağı (hər biri 1 xörək qaşığı) 1 stəkan qaynar suda dəmlənilir və gün ərzində 2 dəfə (səhər və axşam) yeməkdən qabaq 1 stəkan qəbul edilir.
- ✓ Solmazçiçəyi, boymadərən, acı yovşan, razyana və nanə yarpağı (hər biri 1 xörək qaşığı) 1 stəkan qaynar suda dəmlənilir və gün ərzində 2 dəfə (səhər və axşam) yeməkdən qabaq 0,5 stəkan qəbul edilir.
- ✓ Quşarmudu və itburnu meyvəsi (hər biri 1 xörək qaşığı) gün ərzində 3 dəfə yeməkdən qabaq 0,5 stəkan qəbul edilir.

QASTRIT (mədə xəstəliyi)

- ✓ 2-3 kartof təmiz yuyularaq süzgəcdən keçirilir, sıxaraq şirəsi çıxarılır. Hər dəfə təzəsini hazırlamaq lazımdır. Səhər uşağına 1-2 ay içmək lazımdır.
- ✓ İtburnu toxumu dəmlənir.
- ✓ Qələvər köklünün üzərinə qaynadılmış su (1:10) əlavə edilərək, 15 dəqiqə dəmlənir. Gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 2 xörək qaşığı qəbul edilir.

QƏBİZLİK

- ✓ Qəbizliyi aradan götürmək üçün buğda kəpəyini aşağıdakı kimi qəbul etmək lazımdır.

I. 10-12 gün 1 çay qaşığı kəpəyin üzərinə 1 stəkan qaynar su əlavə edilir. Süzülür, yeməklə gündə 3 dəfə qəbul edilir.

II. İkinci tsikl 2 həftə davam edir və kəpəyin dozası hər qəbulda 2 xörək qaşığına qədər artırılır və gündə 3 dəfə qəbul edilir.

III. Bundan başqa 2 ay müddətində kəpək quru halda 2 çay qaşığı olmaqla gündə 3 dəfə qəbul edilir.

- ✓ Gündə 2 dəfə qara çörək qəbul edilməsi məsləhətdir.
- ✓ 1 xörək qaşığı arpa və ya yulaf toxumu 4 stəkan suda qaynadılır, süzülür və üzərinə 1 xörək qaşığı xörək duzu əlavə edilir və imalə edilir.

QRİP

- ✓ Ağ söyud qabığı, çobanyastığı və itburnu meyvəsi (hər biri 1 xörək qaşığı) 1 stəkan qaynar suya əlavə edilir, 10 dəqiqə dəmlənir sonra süzülür, gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 0,5 stəkan qəbul edilir.
- ✓ Moruq mürəbbəsi ilə limonlu çay tez-tez içilməlidir.
- ✓ Balla isti süd içmək.
- ✓ Sarımsaq suyu eyni həcmli balla qatılaraq yatmadan qabaq 1 xörək qaşığı qəbul edilir.

- ✓ Soğan şirəsində isladılmış tamponu 10-15 dəqiqə buruna yerləşdirmək.

DƏRİ XƏSTƏLİKLƏRİ

- ✓ Epidermisin buynuzlaşması və dəri qırışları zamanı:
Parçadan hazırlanmış torbacığın içərisinə 1 stəkan buğda kəpəyi və çovdar unu və 0,5 stəkan sabun qırıntısı yığıb, vannada suyun içərisinə yerləşdirilir. 15 dəqiqə sonra vanna qəbul edilir.
- ✓ Yağlı seborreya və sızanaqlar zamanı:
Ardıc, çobanyastığı, zəif dazı (hər biri 25 q), kəklikotu və nanə yarpağı (hər biri 50 q) torbacığa yığılır və qazana qoyulur. Üzərinə 2 litr su əlavə edib qaynadılır. 30 dəqiqə zəif odda saxlanılır və vannaya süzülür. Həftədə 1 dəfə qəbul etmək kifayətdir.
- ✓ Dərinin «qara nöqtələrini» yulaf kəpəyi ilə təmizləmək olar:
1 stəkan yulaf kəpəyini 1 çay qaşığı çay sodası ilə qarışdırılır. 1 xörək qaşığı sıyıq əmələ gələnə kimi su əlavə edərək qarışdırılır. Sıyıq üzə yaxılır və 5-6 dəqiqə masaj edilir. Həftədə 1 dəfə etmək kifayətdir.

DİŞ AĞRISI

- ✓ Ağrılı dişə duzla sarımsağın qarışığını qoyaraq, üzərinə pambıq örtmək.
- ✓ Karies dişin içərisinə 10-15 ədəd üzərlik toxumu yerləşdirmək. 25-30 dəqiqəyə ağrı tamamilə kəsilir.
- ✓ Ağrılı dişin tərəfindən biləyin üzərinə (nəbzın üzərinə) sarımsaq qoyaraq bağlamaq.

ZİYİL

- ✓ Ziyilin üzərinə yovşan dəmləməsi qoyaraq bağlanılır.
- ✓ Sarımsaq və donuz piyinin məlhəmini (hər biri 50 q) ziyilin üzərinə qoyaraq bağlanılır.

ZÖKƏM

- ✓ Sarımsaq və yerləkə şirəsi qarışdırılıb, hər burun dəliyinə 2-3 damcı salınır.
- ✓ Qıtlıqotu (xren) süzəcdən keçirilir 0,3 stəkan 2 limonun şirəsi ilə qarışdırılır. 0,5 çay qaşığı səhər yeməyindən 20-25 dəqiqə sonra qəbul edilir.

IMPOTENSIYA

- ✓ Qida rasionunda cəfəri, qoz, 2 yumurta (həftədə 2 dəfə) və balın olması vacibdir.
- ✓ Sutqada 8-10 saat dərin yuxu vacibdir.
- ✓ Həftədə 1 dəfə buxar hamamı (20-30 dəqiqə).
- ✓ Günəş vannaları.
- ✓ Oruc tutmaq və müalicəvi aclıq (ildə 2-3 dəfə 3-7 gün)
- ✓ Çiy tərəvəzlər, turp, çuğundur, cəfəri, soğan, sarımsaq təşkil edən salatlar qəbul edilməlidir.
- ✓ Jənşen tinkurası 20-25 damcı gündə 2-3 dəfə.
- ✓ Ürək damotu dəmləməsi (15 q 1 stəkan qaynar su) 1 xörək qaşığı axşamlar qəbul edilir.
- ✓ Yarıqnotu (0,25 q) dəmlənilir və gündə 4 dəfə qəbul edilir.
- ✓ 100 q çətənə toxumu qovrularaq 1 xörək qaşığı bal ilə qarışdırılaraq gündə 2-3 dəfə qəbul edilir.
- ✓ Ətirşah bitkisinin (1 çay qaşığı) 1 stəkan qaynar suda 10 dəqiqə saxlamaq. Səhər və axşam hər dəfə 1 stəkan qəbul edilir.
- ✓ Səhər və axşam ayaqları isti və soyuq suda (kontrast iqlim) yumaq, sərin duş qəbul etmək.
- ✓ Artıq yemək, spirtli içki, tünd çay və kofe qida rasionundan çıxarılmalıdır.

AZƏRBAYCANLILARIN UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ İSTİFADƏ ETDİKLƏRİ DƏRMAN BITKİLƏRİ

AĞ CIYƏR VƏ TƏNƏFFÜS YOLU XƏSTƏLİKLƏRİ

Şərq başlıqotu	Əkin yerkökü
Kartof	Ağ zirə
Qara qarağat	Qırmızı çuğundur
Kiçik qızılçətir	Adi dəvədabanı
Dərman qulançarı	Meşə əməköməci
Adi razyana	At əvəliyi
Sarımsaq	Şərq fisdığı
Sıxçiçək sığırquyruğu	Qara kəndələş
Mavi süsən	Dərman gülxətmi
Meşə üzümü	Innab
İkievli gicitkan	Bostan kələmi

ANEMIYA

Şərq alması	Ağ tut
Şərq başlıqotu	Meşə üzümü
Bozumtul böyürtkən	Əkin yerkökü
Cəfəri	Acı yovşan
Əncir	Dərman zəncirotu
At əvəliyi	Adi zirinc
Ağacəoxşar əzvay	Quşqonmaz
Heyva	Adi moruq
İtburnu	Dərman şahtərəsi
Adi kasnı	

ANGINA VƏ TONZILLIT

Adi başınağac	Qırmızı çuğundur
Adi qaraqınıq	Zəif dazı
Adi qaragilə	Zaqafqaz kəklikotu
Qatıqotu	Ağ tut
Limon	Meşə üzümü
Adi nar	Adi zirinc
Adi palıd	Şərq fisdığı
Dərman sincanotu	Qara kəndələş
Dərman sürvəsi	Dərman gülxətmi
Bozumtul böyürtkən	Dərman gülünbahar
Aptek çobanyastığı	Aptek gücotu

ARTRIT

Adi dağtərxunu	Adi qaragilə
Üçbölümlü qanqal	Acı yovşan

ASTMA

Çəltik	Acı yovşan
Ağacəoxşar əzvay	Adi heyva
Əncir	Sıxçiçək sıgırquyruğu
Turp	

AVITAMINOZ VƏ HIPOVITAMINOZ

Bozumtul böyürtkən	Soğan
Dərman şahtərəsi	çaytikanı
Murdarçayabənzər	At əvəliyi
Cəfəri	Qara kəndələş
Quşqonmaz qarağacyarpaq	İkievli gicitkan
Limon	İtburnu
Pomidor	Bostan kələmi
Sarımsaq	Əkin yerkökü
Sallaq tozağacı	Qara qarağat
Turp	

BƏLGƏMGƏTİRİCİLƏR

Zaqafqaz kəklikotu
Dərman qulançarı
Sıxçiçək sığırquyruğu
Böyük bağayarpağı
Çılpaq biyan
Qara çörəkotu
Adi dəvədabarı
Dərman zəncirotu
Meşə əməkəməci
Bataqlıq gəcəvəri
İkievli gicitkan
Dərman gülxətməi
Dərman xəşənbülü

Adi qaraqınıq
Qırtıqotu
Adi moruq
Adi razıyana
Mavi süsən
İylə şüyüt
Meşə üzümü
Adi zirinc
Adi ardıc
Adi ərək
İnnab
Hündür andız

BİŞMƏCƏ

Adi şam
Üçbölümlü qanqal
Sancaqvari plaun

BÖYRƏK XƏSTƏLİKLƏRİ

Dərman qulançarı
Mərzə
Adi nar
Reyhan
Büküslü solmazçiçək
Mavi süsən
Əkin yerköküsü
Hamar yırımqotu
Dərman zəncirotu
Adi zirə

Adi balqabaq
Gürcü boyaqotu
Cəfəri
Adi dəvədabarı
Əncir
Qara kəndələş
İkievli gicitkan
İtburnu
Bostan kələmi
Kasni
Qara qarağat

BRONXIT

Şərq alması	Hündür andız
Adi palıd	Şərq başlıqotu
Dərman sürvəsi	Sıxçiçək sığırquyruğu
Turp	Çılpaq biyan
Meşə üzümü	Şərq fisdığı
Adi heyva	

ÇIBAN (FRUNKULYOZ)

Böyük bağayarpağı	Zəif dazı
Bostan kələmi	Dərman zəncirotu
Adi qaraqınıq	Aptek çobanyastığı
Dərman gülünbaharı	Dərman xəşənbülü

DƏRİNİN IRINLI VƏ MÜXTƏLİF XƏSTƏLİKLƏRİ

zəncirotu	Büküslü solmazçiçək
Bataqlıq gəcəvəri	Murdarçayabənzər çaytikanı
Qıtıqotu	Aptek çobanyastığı
Dərman gülünbaharı	Ökin yerkökü
Quşqonmaz qarağacyarpaq	İtburnu
Adi palıd	Böyük bağayarpağı
Qaya rəvənd	Dərman Sarımsaq
Dərman xəşənbülü	Soğan
Adi dağtərxunu	Çılpaq biy
ri dəmrovotu	Üçbölümlü qanqal
Adi dəvədabanı	Ağacəoxşar əzvay
Şərq fisdığı	

DƏRİ YARALANMALARİ

Böyük bağayarpağı	İtburnu
Dərman xəşənbülü	Əncir
Ağacəoxşar əzəvay	Adi nar
İkievli gıcitkan	Sallaq tozağacı
Aptek gücotu	

DƏMROV*

Bozumtul böyürtkən
Murdarçayabənzər çaytikanı
Quşqonmaz qarağacyarpaq
Sıxçiçək sığırquyruğu
Dərman gülünbaharı

DİATEZ

Üçbölümlü qanqal
Sancaqvari plaun

DİZENTERİYA

Şərq alması	Əncir
Şərq başlıqotu	Adi kasnı
Quşqonmaz qarağacyarpaq	Sarımsaq
Böyük bağayarpağı	Aşı sumaq
Qafqaz quşarmudu	Meşə üzümü
Dərman sincanotu	Adi zoğal
Zaqafqaz kəklikotu	At əvəliyi
Çöl qatırquyruğu	

DISPEPSİYA

Şərq alması	Mərcangilə
At əvəliyi	Aşı sumaq
Kiçik qızılçətir	

EKZEMA

Çılpaq biyan	Kartof
Bozumtul böyürtkən	Sıxçiçək sığırquyruğu
Murdaçayabənzər çaytikanı	Sallaq tozağacı
Aptek çobanyastığı	Acı yovşan
Qara çörəkotu	Dərman zəncirotu

ENTEREBIOZ

Sallaq tozağacı
Acı yovşan

ENUREZ (GECƏ)

Adi qaragilə
Mərcangilə
Hamar yırmıqotu

EPILEPSIYA

Şərq başlıqotu
Dərman qulançarı
Adi qaraqınıq

FARINGIT

Zəif dazı	Qara kəndəlaş
Meşə əməköməci	Adi qaraqınıq
Aptek gücotu	Adi palıd
Şərq fisdığı	Meşə üzümü

GÖY ÖSKÜRƏK

Böyük bağayarpağı	Dərman qulançarı
Adi başınağac	Çılpaq biyan
Sıxçiçək sığırquyruğu	Sarımsaq
Şərq başlıqotu	Turp

HEMORRARGİK DIATEZ

Çin çayı	Şərq küncütü
Itburnu	

HƏZMI YAXŞILAŞDIRICI

Şərq almsı	Əkilən nanə
Böyük bağayarpağı	Adi nar
Adi boymadərən	Pomidor
Cəfəri	Adi razyana
Ağ dalamaz	Soğan
Adi ərək	İyli şüyüt
Bataqlıq gəçəvəri	Türp
Adi kasnı	Meşə üzümü
Zaqavqaz kəklikotu	Əkin yerköküsü
Üçbölümlü qanqal	Acı yovşan
Dərman zəncirotu	Adi zirə
Kiçik qızılçətir	Qatıqotu
Dərman qulançarı	Adi zoğal

XOLESISTIT

Adi dağtərxunu	Adi qaraqınıq
Zəif dazı	Adi razyana
İri dəmrovotu	Acı yovşan
Dərman gülümbaharı	İtburnu
Dərman sincanotu	Adi zirinc
Qara qarağat	

ISHAL

Şərq alması	Əncir
Adi boymadərən	Ağ dalamaz
Aptek çobanyastığı	At əvəliyi
Adi dağtərxunu	Mərcangilə
Dərman sincanotu	Mərzə
Çöl qatırquyruğu	Adi palıd
Qarağacyarpaq quşqonmaz	Aşı sumaq
Bataqlıq kəcəvəri	Meşə üzümü
Dərman gülxətmi	Adi zoğal

Aptek çobanyastığı
Qırmızı çuğundur
İri dәмrovotu
Ağacaoxşar əzvay
Sıxçiçək sığırquyruğu
Dərman zəncirotu
Qara kəndalaş

Adi boymadərən
Bozumtul böyürtkən
Cəfəri
At əvəliyi
Ağacaoxşar əzvay
Bataqlıq kəcəvəri
Adi kasnı
Üçbölümlü qanqal
Dərman şahtərəsi
Dərman zəncirotu
Qara qarağat
Adi qaraqımıq
Kiçik qızılçətir

Şərq alması
Böyük bağayarpağı
Dərman gülxətmi

Gürcü boyaqotu
Adi dağtərxunu
Dərman qulançarı
Zəif dazı
Aptek gücotu
Dərman gülünbaharı
Büküşlü solmazçiçək

İŞLƏDİCİ

Adi razıyana
Qara rəvənd
İyli şüyüt
Əkin yerköküsü
Avropa zeytunu
Qaracayarpaq quşqonmaz
Mərcangilə

İŞTAHARTIRICI

Adi moruq
Əkilən nanə
Adi nar
Pomidor
Qara rəvənd
Soğan
Aşı sumaq
Turp
Acı yovşan
Adi zirə
Qıtıqotu
Adi mayaotu

KOLIT

At əvəliyi
Zəif dazı
Heyva

QARA CİYƏR XƏSTƏLİKLƏRİ

Limon
Mərcangilə
Mərzə
Mavi süsən
Meşə üzümü
Əkin yerköküsü
Acı yovşan

Bostan kələmi
Dərman zəncirotu
Üçbölümlü qanqal
Çətirçiçək qızılçətir

Adi kasnı
Itburnu
Adi zirinc

QASTRIT

Çılpaq biyan
Adi boymadərən
Aptek çobanyastığı
Zəif dazı
At əvəliyi
Ağacəoxşar əzvay
Dərman gülxətmi
Dərman gülünbaharı

Bostan kələmi
Adi qaragilə
Qara qarağat
Kiçik qızılçətir
Adi mayaotu
Mərcangilə
Əkilən nanə
Acı yovşan

QƏBZLIK

Adi balqabaq
Ağacəoxşar əzvay
Dərman zəncirotu

Meşə üzümü
Sarımsaq
Əkin yerköküsü

QICOLMALAR

Aptek çobanyastığı
Sıxçiçək sıgırquyuğu

Adi mayaotu
Reyhan

QIZILCA

Adi başınağac
Qara kəndəlaş

QIZDIRMASALICI, TƏRQOVUCULAR

Hündür andız
Adi başınağac
Şərq başlıqotu
Bozumtul böyürtkən
Qara çörəkotu

Qara qarağat
Limon
Mərcangilə
Adi moruq
Adi nar

Üçdilimli dağrazyanası
Adi dağtərxunu
Adi dəvədabanı
Dərman sincanotu
Dərman qulançarı
Qarağacyarpaq quşqonmaz
Üçbölümlü qanqal

Adi razyana
Ağ tut
Adi üzərlik
Əncir
Qara kəndəlaş
Adi heyva
Adi kasnı
Meşə üzümü

QIZIL YEL

Üçbölümlü qanqal
Adi qaraqınıq

QOTURLUQ

Adi dağtərxunu
Adi şam
Ağ tut

Sallaq qozağacı
Adi üzərlik

QRIP

Bataqlıq kəcəvəri
Soğan

QURDQOVUCULAR

Hündür andız
Ekək ayıdöşəyi
Adi balqabaq
Şərq başlıqotu
Qara çörəkotu
Zəif dazı
Əncir
Adi ərək
İkievli gicitkan
Zaqafqaz kəklikotu
Mərcangilə

Adi nar
Sarımsaq
Büküşlü solmazçiçək
Sallaq qozağacı
Ağ tut
Acı yovşan
Çətirçiçək qızılçətir
Qarağacyarpaq quşqonmaz
Adi mayaotu

QUSMA ƏLEYHİNƏ

Əncir
Limon
Adi moruq

Əkilən nanə
İyli şüyüt

LARINGIT

Meşə üzümü

MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİNƏ TƏSİR GÖSTƏRƏNLƏR

Adi ərək
Pomidor

Meşə üzümü

MALYARIYA

Üçdilimli dağrazyanası
Qara kəndəlaş
Adi kasnı
Dərman zəncirotu
Limon

Aşı sumacağı
Adi üzərlik
Adi zirinc
Sarımsaq
Adi zoğal

METEORIZM

Aptek çobanyastığı
Bataqlıq kəcəvəri
Dərman xəşənbülü
Zaqafqaz kəklikotu
Adi qaraqınıq
Kiçik qızılçətir
Dərman şahtərəsi
Mərzə
Əkilən nanə

Adi razyana
Reyhan
Qaya rəvəndi
İyli şüyüt
Acı yovşan
Adi tizirə
Adi zoğal

MƏDƏ-BAĞIRSAQ YOLU XƏSTƏLİKLƏRİ

Sıxçiçək sıgırquyruğu
Dərman sincanotu
Büküslü solmazçiçək
Böyük bağayarpağı
Adi balqabaq

Qara qarağat
Mərzə
Adi nar
Pomidor
Adi razyana

Adi başınağac
 Bozuntul böyürtkən
 Murdarçayabənzər çaytikanı
 Qırmızı çuğundur
 Adi dağtərxunu
 Qafqaz quşarmudu
 Dərman zəncirotu
 Adi dəvədabanı
 Meşə əməköməci
 Dərman şahtərəsi
 İkievli gicitkan
 Aptek gücotu
 Adi heyva
 Itburnu

Sarımsaq
 Mavi süsən
 Adi üzərlik
 Acı yovşan
 Avropa zeytunu
 Zəif dazi
 Adi zirə
 Adi zirinc
 Şərq alması
 Hündür andız
 At əvəliyi
 Adi zoğal
 Kartof
 Bostan kələmi

MƏXMƏRƏK

Çin çayı
 Kəndələş

Ağ tut

MƏRKƏZİ SISNİR SİSTEMİNİN SAKİTLƏŞDİRİCİLƏRİ

Adi başınağac
 Aptek çobanyastığı
 Dərman zəncirotu
 Tüklü damotu
 Beşyuvahı yemişan

Adi mayaotu
 Meşə üzümü
 Acı yovşan
 Ağ dalmaz
 Adi kasnı

ORQANİZM MÖHKƏMLƏNDİRİCİLƏRİ

Başlıqotu
 Çəltik
 Üçdilimli dağrazyanası
 Əkin yerköküsü
 Əncir
 Ağacəoxşar əzvay

Itburnu
 Limon
 Adi nar
 Meşə üzümü
 Adi kasnı
 İnnab
 Adi zoğal

OTIT

Şərq alması

ÖDQOVUCU

Adi ardıc

Adi balqabaq

Gürcü boyaqotu

Zəif dazı

Iri dəmrəvotu

At əvəliyi

Bataqlıq kecəvəri

Adi heyva

İtburnu

Adi kasrı

Kiçik qızılçətir

Əkilən nanə

Qaya rəvəndi

İyli şüyüt

Sallaq qozağacı

Turp

Meşə üzümü

Dərman

zəncirotu

Adi zirinc

PIYLƏNMƏ

Şərq alması

RAXIT

Dərman gülünbaharı

Üçbölümlü qanqal

Adi şam

Meşə üzümü

Adi zirinc

REVMATİZM

Şərq alması

Dərman qulançarı

Adi ardıc

Erkək ayıdöşəyi

Çöl qatırquyruğu

Aptek çobanyastığı

Zəif dazı

Qara kəndəlaş

Aptek gücotu

Dərman xəşənbülü

Dərman zəncirotu

Adi kasrı

Zaqafqaz kəklikotu

Qıtıqotu

Ağ küstüşam

Mərcangilə

Cəfəri

Adi nar

Sallaq qozağacı

Turp

Ağ tut

Adi üzərlik

Meşə üzümü

Hamar

yrmıqotu

Acı yovşan

Adi qaragilə
Qara qarağat

Adi zirinc
Adi qaraqınıq

SARILIQ

Adi balqabaq
Dərman şahtərəsi
Dərman zəncirotu
Üçbölümlü qanqal

Limon
Adi kasnı
Dəmrəvotu
Adi zirinc

SISTIT

Dərman qulançarı
Adi dəvədabanı
Hamar yırıqotu
Dərman zəncirotu
Dərman gülxətmi
Çöl qatırquyuğu

Adi mayaotu
İtburnu
Zəif dazı
Adi zirinc
Ağ dalamaz

SKARLATINA

Çin çayı
Ağ tut

STOMATIT

Adi başınağac
Murdarçayabənzər çaytikanı
Dərman gülünbaharı
Dərman sincanotu

Zəif dazı
At əvəliyi
Adi qaragilə
Meşə üzümü

SPAZMOLITIKLƏR

Adi başınağac
Cəfəri
Aptek çobanyastığı
Qaraqınıq
Adi mayaotu
Mərzə

Əkilən nanə
Reyhan
İyli şüyüt
Əkin
yerköküsü
Acı yovşan
Adi zirə

ŞƏKƏRLİ DIABET

Şərq alması	Limon
Bozumtul böyürtkən	Adi nar
Dərman çəpişotu	Adi palıd
Qara kəndəlaş	Sarımsaq
İkievli gicitkan	Aşı sumaq
Adi kasnı	Turp
Bostan kələmi	Meşə üzümü
Adi qaragilə	Adi zirinc
Dərman qulançarı	Adi zoğal
Quşarmudu	

TENİDOZLAR

Adi balqabaq

ÜRƏK-QAN-DAMAR SİSTEMİ XƏSTƏLİKLƏRİ

Şərq alması	Əncir
Adi başınağac	Adi ərək
Bozumtul böyürtkən	Qara qarağat
Dərman çəpişotu	Pomidor
Dərman qulançarı	Soğan
Dərman gülünbaharı	Iyli şüyüt
Beşyuvalı yemişan	Ağ tut
Əkilən yerköküsü	Adi heyva
Meşə üzümü	Adi kasnı
Ağ küstüşəm	Acı yovşan

VƏRƏM

Adi başınağac	Qırmızı çuğundur
Şərq fıstığı	Çöl qatırquyruğu
Ağacəoxşar əzvay	Dərman çincanotu
Çılpaq biyan	Zəif dazi
Bozumtul böyürtkən	Adi dəvədabanı

VIRUS HEPATITI

Limon

Itburnu

YANIQLAR

Böyük bağayarpağı

Kartof

Bozumtul böyürtkən

Bostan kələmi

Murdaçayabənzər çaytikanı

Adi palıd

Ağacəoxşar əzvay

Zəif dazı

Dərman gülünbaharı

Əkin yerköküsü

Dərman sincanotu

Itburnu

Dərman zəncirotu

Avropa zeytunu

YUXUSUZLUQ

Şərq başlıqotu

Ağ dalamaz

Dərman zəncirotu

Adi mayaotu

Zaqafqaz kəklikotu

ZƏHƏRLƏNMƏLƏR

Çılpaq biyan

At əvəliyi

ZİYİL

Dəmrovotu

Dərman gülünbaharı

Stasionar müşahidələr göstərmişdir ki, həmin xəstəliklərdə və profilaktik məqsədlər üçün də yuxarıda göstərilən dərman bitkilərinin istifadəsini aparmaq mümkündür.

Göstərilən reseptlər praktikada sınaq olmuş və etibarlı müalicə effektivə malikdir.

UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN DƏRMAN BITKİLƏRİNƏ AID RESEPTLƏR

1. Rp.: Inf. fol. Urticae dioicae ex 15,0-200,0
D. S. 1x.q. 3-4 dəfə gündə (qan bərpa edici kimi).
2. Rp.: Inf. fl. et fol. Malvae sylvestris ex 10,0 – 100,0
D.S. Qarqara üçün (və ya daxilə xörək qaşığı ilə).
3. Rp.: Infusi corticis Berberi ex 10,0 – 200,0
D.S. Gündə 2-6 dəfə, hər dəfə 1- xörək qaşığı 4. Rp.: Berberini hydrochlorici 0,02
Sacchari albi 0,3
M.f. pulv. D.t.d.№ 12.
D.S. Gündə 3 dəfə, hər dəfə 1 toz qəbul etməli
5. Rp.: Harmini hydrochlorici 0,02
D.t.d. № 10 in tabulettis
S. Hər dəfə 1 tablet qəbul etməli
6. Rp.: Tincturae Menthae piperitae 20,0
D.S. Hər dəfə 5-15 damcı qəbul etməli
7. Rp.: Aquae Menthae piperitae 200,0
D.S. Gündə 3-4 dəfə, hər dəfə 1 x. q.
8. Rp.: Infusi foliorum Salvia ex 20,0 – 200,0
D.S. Qarqara etmək üçün
9. Rp.: Tincturae Allii sativi 15,0
D.S. 10-20 damcı gündə 2 dəfə, yeməkdən 30 dəq. əvvəl süd ilə qəbul etməli (bağırsaqlar atoniyasında)

10. Rp.: Alli sativi 100,0

D.S. 40 qr sarımsaq 100 qr araqda, bağlı qabda dəmlənir -- sonra nanə dəmləməsi əlavə olunur. 10 damcı gündə 2-3 dəfə yeməkdən 30 dəq. əvvəl

11. Rp.: Allilcerpi 50,0

D.S. 15-20 damcı gündə 2-3 dəfə (10-15 gün içməli – bağırsaq atoniyasında).

12. Rp.: Herbae Chelidonii pulveratae

Lanolini

Vaselini aa-10,0

Sol. as. carbonici 0,25 % gtt X

M. f. pasta (Plantasanum)

D.S. Xaricə (dəri vərəmində, ziyillərdə)

13. Rp.: Fructus Carvi 100,0

D.S. 1 xörək qaşığı 1 stəkan suda 5 dəq. qaynatdıqdan sonra, 1 stəkan dəmləməyə 1 xörək qaşığı şəkər tozu töküb, 1 çay qaşığı ilə gündə 5-6 dəfə içməli (köpdə-qazqovucu kimi).

14. Rp.: Inf.herbae Herniariae ex 20,0 – 200,0

D.S. 1 disert qaşığı gündə 3-4 dəfə

15. Rp.: Sirupus Rosae 250,0

D.S. 1 disert qaşığı gündə 3 dəfə (polivitamin kimi)

16. Rp.: Fructus Rosae 100,0

D.S. 1 xörək qaşığı meyvə 2 stəkan qaynar suda, örtülü vəziyyətdə 10 dəq. qaynadılır. Sonra süzülüb 1/2 – 1/4 stəkan gündə 2-3 dəfə içməli (infeksion xəstəliklərdə, polivitamin kimi)

17. Rp.: Fructus Rubi idaei 50,0

D.S. 2 xörək qaşığı quru meyvə 1 stəkan qaynar suda 15-20 dəq. dəmlənir, süzülür, 1-2 saat ərzində 2-3 stəkan qaynar dəmləmə içilir (tərqovucu kimi)

18. Rp.: T-ae Scutellariae 25,0

D.S. 10-15 damcı gündə 2-3 dəfə yeməkdən 30 dəq. əvvəl (tərqovucu, öskürəyi sakitləşdirici kimi)

19. Rp.: Radicis Rhet 0,3 (0,5)

D.t.d. № 6 in tabulettis

S. Gündə bir dəfə, 1/2 tablet qəbul etməli (10 yaşlı uşaqlar üçün dərman kimi)

20. Rp.: T – rae Rhet amarae spirituosae 50,0

D.S. Bir çay qaşığı gündə 2 dəfə yeməkdən əvvəl (məh-kəmləndirici kimi)

21. Rp.: Fructus Sorbi

Fructus Rosae aa 30,0

M.f. species

D.S. 2 çay qaşığı 2 stəkan suda 1 saat dəmlənib, süzülür, şəkər əlavə edib 1/3 stəkandan gündə 3-4 dəfə içməli (hipovitaminozlarda)

22. Rp.: Fructus Sorbi 100,0

D.S. 1 desert qaşığı, 1 stəkan suda çay kimi dəmlənib, 1/3 stəkan gündə 2-3 dəfə içməli (hipovitaminozun profilaktikası üçün)

23. Rp.: Dec. Gemmarum Pini ex 10,0 – 200,0

D.S. 1 des. qaşığı gündə 2-3 dəfə (bəlğəmgətirici, tərqovucu kimi)

24. Rp.: Inf. Gemmarum Pini ex 10,0-100,0

D.S. Tənəffüs yolu xəstəliklərində inqalyasiya üçün

25. Rp.: Tab. herbae Millefolii 0,3
D. t. d. № 20.
S. 1/2 tab. gündə 3 dəfə (qanbərpaedici kimi)
26. Rp.: Inf. herbae Millefolii ex 15,0-200,0
D.S. 1 des. qaşığı gündə x 3 dəfə (həzmi yaxşılaşdırmaq, qanbərpa etmək üçün)
27. Rp.: Fructus Ribis nigri 50,0
D.S. 1 xörək qaşığı 1 stəkan qaynar suda dəmlənir, 1/2 stəkan gündə 1 neçə dəfə içilir (vitaminli içki kimi)
28. Rp.: Dec. fructus Ribis ex 20,0-200,0
D.S. 1/2 xörək qaşığı gündə 3 dəfə (sidikqovucu)
29. Rp.: Fructus Rosae
Fructus Ribis nigri aa 50,0
M.f. species
D.S. 1 xörək qaşığı 1 stəkan qaynar suda dəmlənir, 30 dəq. Gün ərzində 1/2 - 1 stəkan 1 neçə dəfə içilir (iştahartırıcı kimi, vitaminli içki)
30. Rp.: Inf. fruct. Sambuci nigrae ex 18,0-180,0
D.S. 1-2 desert qaşığı gündə 3 dəfə (tərqovucu)
31. Rp.: Florum Sambuci 100,0
D.S. 1 xörək qaşığı 1 stəkan qaynar suda 20 dəq. dəmlənib, süzülür, 1/4 stəkan 3-4 dəfə içilir (tərqovucu, sidikqovucu kimi)
32. Rp.: Inf. flores Chamomillae ex 20,0-200,0
D.S. Desert qaşığı ilə 2/3 dəfə (bağırsaqlarda iltihab zamanı, dermatitlərdə, boğaz, ağız, əsnək qarqarası zamanı)
33. Rp.: Flores Chamomillae 200,0
D.S. 1 xörək qaşığı 1 stəkan qaynar suda dəmlənib, soyudulur. (imalə və qarqara üçün)

34. Rp.: Inf. flores Chamomillae ex 15,0-200,0
D.S. 1 desert qaşıǵı 2-3 dəfə (enterokolitdə)
35. Rp.: Inf. baccarum Jiniperi ex 10,0-200,0
D.S. 1 xörək qaşıǵı – gündə 3-4 dəfə (sidikqovucu)
36. Rp.: Foliorum Vaccinium myrtillusi 100,0
D.S. 1 desert qaşıq yarpaq 1 stəkan qaynar suda 30 dəq. dəmlənir, sonra 1 desert qaşıq 3-4 dəfə içilir (sidikqovucu)
37. Rp.: Inf. grandularum Lupuli ex 10,0-200,0
D.S. 1 desert qaşıq gündə 3 dəfə (sistitdə sidikqovucu kimi)
38. Rp.: Inf. grandularum Lupuli ex 10,0 -200,0
D.S. 1 desert qaşıǵı 2-3 dəfə (sakitləşdirici, yuxu-gətirici kimi, qıcolma əleyhinə)
39. Rp.: T-rae Plantaginis majoris 30,0
D.S. 15-20 damcı gündə 3-4 dəfə (bəlğəmgətirici kimi)
40. Rp.: Inf. fol. Plantiginis majoris ex 30,0-200,0
D.S. 1-2 desert qaşıǵı 2 saatdan bir – 10 yaşında (öskürəkdə)
41. Rp.: Succı Plantaginis 500,0
D.S. 1 desert və ya çay qaşıǵı gündə 3 dəfə yeməkdən 15 dəq. əvvəl (xroniki kolit, qastritdə)
42. Rp.: Inf. rad. Althaeae ex 10,0 – 200,0
D.S. 1 desert qaşıǵı gündə 3 dəfə (bəlğəmgətirici)

43. Rp.: Tincturae Absinthii 30,0
D.S. 15 damcı yeməkdən 30 dəq. əvvəl (acı maddə kimi)
44. Rp.: Herbae Absinthii
Folii Salviae
Fructus Juniperi aa 30,0
M.D.S. 1 çay qaşığı 1 stəkan qaynar suda dəmlənir, 1/2 stəkan gündə 2 dəfə qəbul edilir (ödqovucu kimi)
45. Rp.: Dec. florum Helichrysi plicatii ex 6,0 (12,0)- 300,0
D.S. 1/2 - 1/3 stəkan gündə 2-3 dəfə (ödqovucu kimi)
46. Rp.: Flaminii 0,05
D.t.d. № 20 in tabul.
S. 1/2 - 1/3 tablet gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəq. əvvəl (xroniki xolesistitdə)
47. Rp.: Infusi herbae Fumariae officinalis ex 10,0-15,0-300,0
D.S. Gündə 2-3 dəfə, hər dəfə 1 çay qaşığı, desert qaşığı qəbul etməli (maddə –bağırısaq xəstəliklərində)
48. Rp.: Extracti Fumariae officinalis fluidi 50,0
D.S. Gündə 3 dəfə, hər dəfə 40-50 damcı qəbul etməli (qanazlığında, sarılıqda)
49. Rp.: Decocti foliorum Farfarae ex 15,0-200,0
D.S. 1 çay qaşığı və ya 1 desert qaşığı 2-3 saatdan bir (bəlgəmgətirici kimi)
50. Rp.: Foliorum Farfarae 50,0
D.S. 2 xörək qaşığı 1 stəkan qaynar suda çay kimi dəmlənir, 1 çay qaşığı, 1 desert qaşığı 2-3 saatdan bir içilir (bəlgəmgətirici kimi)

51. Rp.: Extr. Filicis maris aetherei 0,5
D.t.d. № 10 in capsulis gelatinosis
S. 1 kapsuladan 12 yaşdan böyük uşaqlarda hər 20 dəqiqədən bir, 2 %-li çay sodası məhlulu ilə içməli. Axırncı kapsuladan 20 dəqiqə sonra işlədici duz içməli (lentvari qurdların qovulması)
52. Rp.: Filixani 0,5
D.t.d. № 16 in tabulettis
S. 1 tabletdən hər 5 dəqiqədən bir, axırncı tabletdən sonra işlədici duz qəbul etmək (lentvari qurdları qovmaq üçün)
53. Rp.: Inf. h. Leonuri ex 20,0-200,0
D.S. 1 desert qaşığı gündə 3 dəfə (sedativ kimi)
54. Rp.: Herbae Leonuri
Folii Menthae
Radice Valerianae aa 15,0
M.f. species
D.S. 1 çay qaşığı 1 stəkan qaynar suda dəmlənir, 1/3 stəkan gündə 3 dəfə qəbul olunur (sakitləşdirici və spazmalitik təsir edir)
55. Rp.: Olei Sesami 200,0
D.S. Gündə 3 dəfə, hər dəfə 1 çay və ya desert qaşığı qəbul etməli (qanın laxtalanmasını sürətləndirir)
56. Rp.: Chloroformii 5,0
Olei Sesami 25,0
M.D.S. Xaricə sürtmək üçün

57. Rp.: Olei Hyperici 30,0
D.S. Zədələnmiş nəhiyəyə sürtməli (yaralarda)
58. Rp.: Tincturae Hyperici 15,0
D.S. Gündə damağa 2-3 dəfə sürtməli və ya 1/2 stəkan suya 20-30 damcı töküüb qarqara etməli (stomatitlərdə, anginada, üzdə səpgilər olduqda)
59. Rp.: Dec. h. Hyperici ex 8,0 – 200,0
D.S. 1/3 – 1/4 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəq. əvvəl və ya yeməkdən 1 saat sonra (mədə-bağırsaq, qara ciyər xəstəliklərində)
60. Rp.: Florum Calendulae 40,0
D.S. 1,5 çay qaşığı 2 stəkan qaynar suda 15 dəq. dəmlənir, süzülüb gün ərzində içməli (qastritdə)
61. Rp.: T-rae Calendulae 25,0
D.S. 15-20 damcı gündə 3 dəfə (yaşdan asılı olaraq) və ya xaricə - binti isladılıb zədələnmiş nəhiyəyə qoyurlarıyınıqda, donmada, yaralarda və s. (iltihab əleyhinə)
62. Rp.: T-rae Calendulae 5,0
Vaselini 25,0
M.f. ung.
D.S. Dərinin zədələnmiş nəhiyəsinə sürtməli - yara, xora, dəmrov, yanıq və s. (iltihab əleyhinə)
63. Rp.: Ol. Hippophaeae 100,0
D.S. 1 desert qaşığı 3 dəfə (xora xəstəliyində)
64. Rp.: Inf. herbae Origani ex 15,0 – 200,0
D.S. 1 desert qaşığı gündə 2-3 dəfə (bağırsaq atoniya-sında)

65. Rp.: *Herbae Origani* 10,0
 Foliorum Farfarae
 Radicis Althaeae aa 20,0
 M.f. species
 D.S. Qarışıqdan 1,5 – 2 çay qaşığı 1 stəkan qaynar suda 20 dəq. dəmlənir, süzülür, sonra 1/3 stəkan 2-3 dəfə gün ərzində içilir (bəlğəmgətirici)
66. Rp.: *Inf.h. Bidentis* ex 6,0 – 200,0
 D.S. 1 çay qaşığı gündə 3-4 dəfə (vitaminli vasitə kimi)
67. Rp.: *Gummarum Betulae* 50,0
 D.S. 1/2 çay qaşığı 1/2 stəkan qaynar suda dəmlənir, süzülüb gün ərzində içilir (sidikqovucu kimi)
68. Rp.: *Herbae Meliloti*
 Florum Chamomillae aa 50,0
 M.f. species
 D.S. 1-2 desert qaşığı 1 stəkan qaynar suda dəmlənir, 2-3 desert qaşığı gündə 2-3 dəfə içilir (yelqovucu kimi)
69. Rp.: *Pulv. Liquiritiae compositi* 50,0
 D.S. 1/2 çay qaşığı gündə 1 – 2 dəfə (işlədici kimi)
70. Rp.: *Speciei pectoralis* 100,0
 D.S. 1 çay qaşığı 1 stəkan qaynar suda dəmlənir, 1 çay qaşığı, 1 desert qaşığı gündə 2-3 dəfə içməli (bəlğəmgətirici kimi)
71. Rp.: *Sem. Anethi* 50,0
 D.S. 1 xörək qaşığı 1 stəkan qaynar suda dəmlənir, soyudulur. 1/4 - 1/3 stəkan qəbul edilir (qazqovucu, ödəqovucu kimi)

72. Rp.: Extr. Aleus 1,0
D.t.d. № 10 in amp.
S. 1 ml dəri altına (biogen stimulyator)
73. Rp.: Extr. Aloes
Pulv. rad. Rhei aa 0,1
M. f.pulv. D.t.d. № 20
S 1/2 - toz – gecə vaxtı (işlədici kimi)
74. Rp.: T-rae Centaurii 25,0
D.S. 10-15 damcı gündə 3-4 dəfə yeməkdən 15-30
dəq. əvvəl (iştah artırmaq üçün) – yaşdan asılı olaraq
75. Rp.: Dec. rad. Calami ex 6,0 – 200,0
D.S. 1-2 desert qaşığı gündə 2-3 dəfə (bəlgəmgətirici
kimi)
76. Rp.: Inf. rhiz. Calami ex 15,0 – 200,0
D.S. 1 çay qaşığı gündə 3 dəfə (qazqovucu kimi)
77. Rp.: T-rae Calami aromatici 20,0
D.S. 10-15 damcı gündə 2 dəfə yeməkdən əvvəl (işta-
h artırıcı kimi)
78. Rp.: Herbae Agrimoniae eupatoriae 50,0
D.S. 1 çay qaşığı 1 stəkan qaynar suda dəmlənir - bağlı
qabda, 1/2 - 1/3 stəkan gündə 3 dəfə istifadə olunur
(qarqara üçün)
79. Rp.: Pulv. herbae Agrimoniae eupatoriae 0,5
D.t.d. № 8.
S. 1/2 - 1 toz, gündə 2-3 dəfə (qara ciyərin xəstəliklə-
rində)
80. Rp.: Inf. herbae thymus transcaucasici ex 15,0 – 200,0
D.S. 1 desert qaşığı gündə 3 dəfə (bəlgəmgətirici)

81. Rp.: Extr. thymus transcaucasicus fluidi 10,0
 Sirupi simpl. seu Althaeae 90,0
 M.D.S. 1 çay qaşığı gündə 3 dəfə (uşaqlarda öskürəkdə)
82. Rp.: Felletierint 0,3
 Acidi tannici 0,5
 Aquae destillatae 30,0
 M.D.S. Ac qarnına qəbul etməli və 1 saatdan sonra işlədici dərman verməli (lentsəkill qurdların müalicəsində)
83. Rp.: Extracti corticis Granati fluidi 5,0
 Spiritus vini 5,0
 Sirupi simplicis 90,0
 M.D.S. 1/2 - 1 çay qaşığı, gündə 1 neçə dəfə qəbul etməli (gastritdə, ishalda)
84. Rp.: Methylii salicylici
 Olei Olivarum aa 25,0
 M.D.S. Xəstə oynaqlara sürtmək üçün
85. Rp.: Pulv. rad. Rumicis conferti 0,25
 D.t.d. № 12
 S. 1/2 toz, gündə 2-3 dəfə (büzücü, ishal əleyhinə)
86. Rp.: Pulv. rad. Rumicis conferti 0,5
 D.t.d. № 6
 S. 1/2 - 1 toz axşam qəbul etməli (işlədici kimi)
87. Rp.: Dec. rad. Rumicis sonferti ex 3,0 – 180,0
 D.S. 1 çay qaşığı gündə 3 dəfə (ishal əleyhinə)
88. Rp.: Daucarini 0,02
 D.t.d. № 50 in tabul.
 S. 1 tablet gündə 3 dəfə (böyüklərdə stenokardiya)

89. Rp.: Ung. Carotonapthalani 30,0
D.S. Dəri xəstəliklərində işlətmək üçün
90. Rp.: Seminis Cucurbitae decorticatae 300,0
D.S. Həvəngdəstədə döyüb, 50 q mürəbbə əlavə edib, 1 saat müddətində qəbul etməli (lentvari qurdlarda)
91. Rp.: Seminis Cucurbitae 150,0
D.S. Bişirməsini hazırlayıb 10 yaşında uşağa verməli (lentvari qurdlarda)
92. Rp.: Des. Seminis Cucurbitae decorticatae ex 50,0 – 200,0
D.S. 3-4 yaşlı uşağa ac qarınına qəbul etməli (lentvari qurdlarda)
93. Rp.: Inf. flor Tanaceti ex 20,0-200,0
D.S. 1 desert qaşığı gündə 3 dəfə (askaridozda, bizquyruqda)
94. Rp.: Inf. flor Tanaceti ex 5,0-200,0
D.S. İsti halda 4-5 dəfəyə içməli (enterokolitdə)
95. Rp.: Pulv. h. Tanaceti 10,0
Seminis Cucurbitae pulv. 70,0
M.f. pulv.
D.S. 2 gün müddətində qəbul etməli (lentvari qurdların müalicəsində)
96. Rp.: Inf. fol. Rubi caesii ex 10,0-200,0
D.S. Qarqara üçün (boğaz ağrılarında)
97. Rp.: Dec. cort. Quercus ex 20,0-200,0
D.S. Stomatitlərdə qarqara üçün

98. Rp.: Dec. cort. Quercus ex 40,0-200,0
Sterilis!
D.S. Yanıqlarda, xaricə
99. Rp.: Foliorum Vitis idaeae 100,0
D.S. 1 desert və ya çay qaşığı 1 stəkan qaynar suda 30 dəq. dəmlənir, 1 çay və ya desert qaşığı gündə 2-3 dəfə içilir (sidikqovucu kimi)
100. Rp.: Decocti rad. Sanguisorbae ex 20,0 – 200,0
D.S. 1 çay və ya desert qaşığı gündə 3-4 dəfə (ağ ciyər qanaxmasında və ya qanlı ishalda)
101. Rp.: Extr. Sanguisorbae fluidi 30,0
D.S. 20-40 damcı gündə 3-4 dəfə (yaşdan ası olaraq ishalda)
102. Rp.: Herbae Equiseti arvensis 50,0
D.S. 3 çay qaşığı 2 stəkan qaynar suda dəmlənir – 15 dəq. müddətində.
Sonra isti halda gün ərzində içilir (sidikqovucu kimi)
103. Rp.: Herbae Equiseti arvensis 50,0
D.S. Gün ərzində 3 stəkan soyuq suda dəmləməli, sonra vanna, kompres və yumaq üçün işlətməli
104. Rp.: Extr. Equiseti fluidi 30,0
D.S. 1 çay qaşığı gündə 2-3 dəfə (sidikqovucu kimi)

**AZƏRBAYCANIN MÜXTƏLİF BÖLGƏLƏRİNDƏN
DƏRMAN BITKİLƏRİNİN İSTİFADƏSİNDƏ DAIR
ƏLDƏ EDİLMİŞ
XALQ TƏBABƏTİ RESEPTLƏRİ**

ATEROSKLEROZ ƏLEYHİNƏ FITOTERAPIYA

Qarışıq №1

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miq. hissə-lərlə
Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	kök, yarpaq, tumurcuq	2
Solmazçiçəyi - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək və meyvə	1
Yemişan - (<i>Crataegus pentagyna</i>)	çiçək və meyvə	2
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	1
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	yarpaq	1
Adi qazayağı - (<i>Falcaria vulgare</i>)	yarpaq və toxum	0,5
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	0,5
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	1
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	meyvə	2
Doğranmış qarışıqdan 2-3 xörək qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənib, gündə 3 dəfə yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 4 həftədir.		

Qarışıq №2

İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	1 hissə
Məşə çiyləyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq və meyvə	1 hissə
Suyoncası - (<i>Menyanthes trifoliata</i>)	yarpaq və çiçək başcıqları	1 hissə
Gürcü böyürtkəni - (<i>Rubus ibericus</i>)	yarpaq və meyvə	1 hissə
Adi dəvədabanı - (<i>Tussilago farfara</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	1 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə və kök	1 hissə
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	1 hissə
Kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq, çiçək	2 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	3 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Yemişan - (<i>Crataegus pentagyna</i>)	meyvə, yarpaq	1 hissə

Doğranmış qarışdırıldıqdan 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənib, sonrakı gündən başlayaraq gündə 3 dəfə yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 3-4 həftədir.

Qarışıq № 3

Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	3
Gülümbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	1
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq və çiçək	4
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	1
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	1
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	2

Doğranmış qarışıqdan 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənib, gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 7 həftədir.

Qarışıq № 4

Bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	zirvə yarpaq, çiçək	2 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	1 hissə
İkiyüclü gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	1 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	2 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	1 hissə
Toppuztikan - (<i>Echinops oruentalus</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Qara qaragilə - (<i>Solanum nigrum</i>)	meyvə və yarpaq	1 hissə
Adi quşarmudu - (<i>Sorbus aucuparia</i>)	yarpaq və meyvə	1 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	kök	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə

Doğranmış qarışıqdan 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmləyib, gündə 3 dəfə yeməkdən 45 dəqiqə əvvəl qəbul edilir.

Qarışıq № 5

Solmazçiçəyi - <i>Helichrysum arenarium</i>	çiçək səbətləri ilə	2 hissə
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və meyvə	1 hissə
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	yerüstü hissə və kök	1 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə və kök	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə
Qulançar - (<i>Asparagus officinalis</i>)	yerüstü hissəsi	2 hissə

Doğranmış qarışıqdan 2-3 xörək qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənib, gündə 3 dəfə yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 4-6 həftədir.

HIPERTONİK TIPLI NEYROSİRKULYAR DİSTONİYA VƏ HIPERTONİYA ƏLEYHİNƏ FITOTERAPİYA

Qarışıq № 6

Şirquyruğu - <i>Leonuris quinquelobatus</i>	yarpaq və çiçək	4 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq və toxum	1 hissə
Zəyərək - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	0,5 his.
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə

2-3 xörək qarışığı quru bitki xammalını 2,5 stəkan qaynar suya əlavə edərək, 6-8 saat termosda dəmləmək lazımdır. Sonra bütün məhlulu gün ərzində 3 dəfəyə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Profilaktik məqsədlə 1 xörək qarışığı itburnu meyvəsini də əlavə edərək dəmləmək olar. Müalicə kursu 3-4 həftədir.

Qarışıq № 7

Şirquyruğu - <i>L. quinquelobatus</i>	yarpaq və çiçək	5 hissə
Yemişan - (<i>Crataegus pentagyna</i>)	çiçək, yarpaq, meyvə	2 hissə
Valerianı - (<i>Valeriane officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	0,5 hissə
Qırxbuğum - <i>Polygonum aviculare</i>	yarpaq və çiçək	1 hissə
Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	0,5 hissə
Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	kök, yarpaq, tumurcuq	2 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	0,25 his.

2-3 xörək qaşığı bitki xammalını 3 stəkan qaynar suya əlavə edərək, 6-8 saat termosda dəmləmək lazımdır. Sonra bütün məhlulu gün ərzində 3 dəfəyə yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 3-4 həftədir.

Qarışıq №8

Şirquyrugu – <i>L. quinquelobatus</i>	yarpaq və çiçək	5 hissə
Boymadərən - <i>Achilleae millefolium</i>	çiçək və yarpaq	1 hissə
Toppuztikan - <i>Echinops orientalis</i>	meyvə və çiçək	1 hissə
Bədrinc- (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Qara qaragilə - (<i>Solanum nigrum</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq və toxum	1 hissə
Quru bitki xammalı kiçik hissələrə bölünərək qarışdırılır.		
Qarışdırıldıqdan sonra 2-3 xörək qaşığı qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmləyib, sonrakı gündən başlayaraq gündə 3 dəfə yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 4 həftədir.		

Qarışıq № 9

Şirquyrugu – <i>L. quinquelobatus</i>	yarpaq və çiçək	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	0,5 his.
Qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Quşarmudu - (<i>Sorbus aucuparia</i>)	yarpaq və meyvə	1 hissə
Əvəlik - (<i>Rumex acetosella</i>)	kök	1 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	zirvə yarpaqları, çiçək	2 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	kök	2 hissə
Boymadərən - <i>Achilleae millefolium</i>	çiçək və yarpaq	1 hissə
Gülümbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	çiçək	5 hissə
Quru bitki xammalının 2-3 xörək qaşığını 3 stəkan qaynar suya əlavə edərək, 6-8 saat termosda dəmləmək lazımdır. Sonra bütün məhlulu gün ərzində 3 dəfəyə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Profilaktik məqsədlə 2-3 xörək qaşığı qarışığın üzərinə 1 xörək qaşığı xırdalanmış itburnu meyvəsi əlavə edərək termosda dəmləmək olar. Müalicə kursu 3-4 həftədir.		

Qarışıq № 10

Şirquyruğu - <i>L. quinquelobatus</i>	yarpaq və çiçək	7 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	1 hissə
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq, çiçək	1 hissə
Qara qaragilə - (<i>Solanum nigrum</i>)	meyvə və yarpaq	3 hissə
İltburnu - (<i>Rosa corumbifera</i>)	çiçək və kök	1 hissə
Adi razyana - (<i>Foeniculum vulgare</i>)	çiçək, yarpaq, meyvə	2 hissə
Şığırquyruğu - <i>Verbascum phlomoides</i>	çiçək	1 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	1 hissə
Yunan qozu - (<i>Juglans regia</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək, yarpaq və meyvə	1 hissə
Gürcü böyürtkəni - (<i>Rubus ibericus</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə

2-3 xörək qaşığı qarışıq 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənib, gündə 3 dəfə yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 6 həftədir.

Qarışıq №11

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	0,5 hissə
Adi qaraqırmıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Zəif dazi - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	7 hissə
Adi ardıc - (<i>Juniperus communis</i>)	yarpaq və meyvə	3 hissə
İltburnu - (<i>Rosa corumbifera</i>)	çiçək və kök	2 hissə
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	0,5 hissə

2-3 xörək qaşığı qarışıq 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənib, gündə 3 dəfə yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 3-4 həftədir.

Qarışıq №12

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	kök, yarpaq, tumurcuq	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	0,5 hissə
Məşə çiyələyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq və gövdə	1 hissə
Toppuztikan - (<i>Echinops orientalis</i>)	meyvə və çiçək	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə və kök	2 hissə
İltburnu - (<i>Rosa corumbifera</i>)	çiçək və kök	3 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissəsi	1 hissə
Qara qarağat - (<i>Ribes nigrum</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə

Quru bitki xammalı xırdalanaraq qarışdırılır. Qarışdırıldıqdan sonra 2-3 xörək qaşığı qarışıq 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənib, sonrakı gündən başlayaraq gündə 3 dəfə yeməkdən 25-30 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 4 həftədir.

Qarışıq №13

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	0,5 his.
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	zirvə yarpaqları, çiçək	1 hissə
Meşə çiyələyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	çiçək, yarpaq, meyvə	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	7 hissə
İt burnu - (<i>Rosa corumbifera</i>)	çiçək və kök	0,5 his.
Boymadərən - (<i>Achilleae millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq, çiçək	1 hissə

Quru bitki xammalı xırdalanaraq qarışdırılır, sonra 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənir və gündə 3 dəfə yeməkdən 25-30 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 4 həftədir.

Qarışıq №14

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	kök, yarpaq, tumur.	3 his.
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	0,5 his.
Meşə çiyələyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq və gövdə	1 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	0,5 his.
Bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq və toxum	1 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achilleae millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Gürcü böyürtkəni - (<i>Rubus ibericus</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə

Quru bitki xammalı xırdalanaraq qarışdırılır, 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənib sonrakı gündən başlayaraq gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 3 həftədir.

Qarışıq №15

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	0,5 his.
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	zirvə yarpaqları	1 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	1 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	5 hissə
Toppuztikan - (<i>Echinops orientalis</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə

Xammal xırdalanaraq qarışdırılır. Qarışdırıldıqdan sonra 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənib, gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 4 həftədir.

Qarışıq №16

Solmazçiçəyi - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	zirvə yarpaqları	2 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	çiçək və meyvə	1 hissə
Dağ tərşumu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq, çiçək	1 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Bitki xammalı xırdalanaraq qarışdırılır. Sonra 2-3 xörək qaşığı 1,0 litr qaynanmış suda dəmlənib gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilir. Müalicə kursu 3-4 həftədir.		

NEYROSİRKULYAR DISTONİYANIN KARDIAL TİPİNDƏ APARILAN FITOTERAPİYA

Qarışıq №17

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqdarı
Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	0,5 his.
Qalxancıqlı itburnu - (<i>Rosa corumbifera</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və yarpaq	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq və meyvə	0,5 his.
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Quş qırxbuğumu - (<i>Polygonum aviculare</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Quru bitki xammalı 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda (termos) 6 saat ərzində dəmlənilərək isti halda yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Dəmləmə zamanı zövqə uyğun olaraq 1 xörək qaşığı itburnu meyvəsi də əlavə etmək olar. Müalicə kursu 3-4 həftədir.		

Qarışıq №18

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	kök, yarpaq, tumurcuq	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	zirvə yarpaqları	2 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	0,5 hissə
Meşə çiyələyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə
İkivli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq və gövdə	1 hissə
Toppuztikan - (<i>Echinops orientalis</i>)	meyvə və çiçək	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	0,5 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	meyvə və budaq	2 hissə
Qara qarağat - (<i>Ribes nigrum</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	1 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	3 hissə

2-3 xörək qaşığı quru bitki xammalı 0,5 litr qaynanmış suda (termos) 6 saat ərzində dəmlənilərək isti halda yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Dəmləməyə zövqə uyğun olaraq 1 xörək qaşığı itburnu və ya quşarmudu meyvələri də əlavə etmək olar. Müalicə kursu 3-4 həftədir.

Qarışıq №19

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	0,5 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	zirvə yarpaqları	1 hissə
Zəif dazi - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və yarpaq	7 hissə
Meşə çiyələyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	1 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq və çiçək	1 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə

2-3 xörək qaşığı quru bitki xammalı 0,5 litr qaynanmış suda (termos) 6 saat ərzində dəmləmək lazımdır. İsti halda yeməkdən 25 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Zövqə uyğun olaraq 1 xörək qaşığı itburnu meyvələri də əlavə etmək olar. Müalicə kursu 5 həftədir.

Qarışıq №20

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq, çiçək	3 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	0,5 his.
Meşə çiyələyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	2 hissə
Gürcü böyürtkəni - (<i>Rubus ibericus</i>)	yarpaq və meyvə	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	0,5 his.
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq və toxum	1 hissə
Qırxbuğumu - (<i>Polygonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə

Quru bitki xammalını 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda (termos) 6 saat ərzində dəmləmək lazımdır. İsti halda gün ərzində yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Zövqə uyğun olaraq qarışığa 1 xörək qaşığı itburnu meyvələri və 1 çay qaşığı limon şirəsi də əlavə etmək olar. Müalicə kursu 4 həftədir.

Qarışıq №21

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	0,5 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	zirvə yarpaqları	1 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Toppuztikan - (<i>Echinops orientalis</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə

Quru bitki xammalını 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda 3 saat ərzində dəmləyərək isti halda yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 3 həftədir.

Qarışıq №22

Ssolmazçiçəyi - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	zirvə yarpaqları	2 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	çiçək	1 hissə
Dağ tərşumu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq, çiçək	1 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	3 hissə

Bitki xammalının 3 xörək qaşığı 1,0 litr qaynanmış suda (termos) 6 saat ərzində dəmləmək lazımdır. Yeməkdən 25-30 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 5-7 həftədir.

Qarışıq №23

Beşyuvalı yemişan - (<i>Crataegus pentagyna</i>)	çiçək, yarpaq, meyvə	5 hissə
Dərman xəşənbüllü - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	1 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Adi mayaotu - (<i>Humulus lupulus</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə

Bitki xammalı 2-3 xörək qaşığı 0,5-1,0 litr qaynanmış suda 3 saat ərzində dəmləmək lazımdır. Gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Qarışıqə zövqə uyğun olaraq 1 xörək qaşığı quşarmudu meyvəsi əlavə etmək olar. Müalicə kursu 3 həftədir.

Qarışıq №24

Dərman valerianı - (<i>Valeriane officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Dərman badrinci - (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Şərq toppuztikan - (<i>Echinops oruentalus</i>)	meyvə və çiçək	1 hissə

Xammalın 2-3 xörək qaşığı 0,7 litr qaynanmış suda 2 saat ərzində dəmləmək lazımdır. Yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 4 həftədir.

Qarışıq №25

Yemişan - (<i>Crataegus pentagyna</i>)	meyvə və çiçək	5 hissə
Xəşənbüllü - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	1 hissə
Meşə ciyələyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	1 hissə
Gülümbaharı - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	3 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	3 hissə

3 xörək qaşığı quru bitki xammalını 0,5 litr qaynanmış suda 2 saat ərzində dəmləmək lazımdır. Yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 4 həftədir.

Qarışıq №26

Dərman valerianı - (<i>Valeriane officinalis</i>)	yarpaq, kök, çiçək	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Adi dəvədabanı - (<i>Tussilago farfara</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə
Dərman badrinci - (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Qara qaragilə - (<i>Solanum nigrum</i>)	meyvə və yarpaq	2 hissə
Dağ tərşumu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə

2-3 xörək qaşığı quru bitki xammalını 1,0 litr qaynanmış suda 4 saat ərzində dəmləmək lazımdır. İsti halda yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 4-6 həftədir.

Qarışıq №27

Xəşənbüllü - (<i>Melilotus officinalis</i>)	meyvə və çiçək	5 hissə
Meşə ciyələyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Gülümbaharı - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	3 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə

Quru bitki xammalının 2-3 xörək qaşığını 0,5 litr qaynanmış suda 3 saat ərzində dəmləyərək gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 3-4 həftədir.

Qarışıq №28

Dərman valerianı - (<i>Valeriana officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	1 hissə
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Adi dəvədabanı - (<i>Tussilago farfara</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə
Dərman badrinci - (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Qara qaragilə - (<i>Solanum nigrum</i>)	meyvə və yarpaq	2 hissə
Dağ tərsumu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Quru bitki xammalının 2-3 xörək qaşığını 0,5 litr qaynanmış suda 3 saat ərzində dəmləyərək gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 3 həftədir.		

Qarışıq №29

Yemişan - (<i>Crataegus pentagyna</i>)	meyvə və çiçək	5 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Şirquyruğu - (<i>Leonuris quinquelobatus</i>)	yarpaq və çiçək	7 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	1 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	kök	2 hissə
Ənbər sülvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Quru bitki xammalının 2-3 xörək qaşığını 0,5-0,7 litr qaynanmış suda 3 saat ərzində dəmləyərək gündə 3 dəfə yeməkdən sonra qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 3-4 həftədir.		

Qarışıq №30

Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	zirvə yarpaqları,	2 hissə
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək çiçək və meyvə	4 hissə
Gülumbaharı - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Dərman badrinci - (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Adi boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Iyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
Sürünən keklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Xammalın 2-3 xörək qaşığı 1,0 litr qaynanmış suda 2 saat ərzində dəmlənməlidir. İsti şəkildə gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Müalicə kursu 4 həftədir.		

TƏNƏFFÜS ORQANI XƏSTƏLİKLƏRİNİN FITOTERAPIYASI

Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri zamanı hərarətsalıcı, iltihabəleyhinə, antiseptik, öskürəkkəsici, spazmalotik və ümum-möhkəmləndirici dərman bitkilərindən istifadə etmək lazımdır.

Qarışıq №31

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	2 hissə
Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq, çiçək	1 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	1 hissə
Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	1 hissə
Meşə çiyləyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Bu tərkibin güclü dozası 4-6 xörək qaşığı hesab olunur. Bu miqdarı 0,7-1,0 litr qaynanmış suda (termosda) dəmləyərək yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 4 həftədir.		

Qarışıq №32

Adi zırə - (<i>Carum carvi</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	1 hissə
Zəif dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
İkivli gicəltkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	2 hissə
Ürəkşəkilli çökə - (<i>Tilia cordata</i>)	yarpaq	3 hissə
Adi dəvədabanı - (<i>Tussilago farfara</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	4 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə
Adi razyana - (<i>Foeniculum vulgare</i>)	çiçək	2 hissə
Ücrəng bənövşə - (<i>Viola tricolor</i>)	çiçək, yarpaq və meyvə	4 hissə
60 q xammalı 1,0 litr qaynanmış suda (termosda) dəmləmək lazımdır. Yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl gündə 3 dəfə qəbul edilməlidir. Müalicə kursu 3-4 həftədir.		

Qarışıq №33

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	1 hissə
Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq və çiçək	2 hissə
Valerian - (<i>Valeriane officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	1 hissə

Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
2-3 xörək qaşığı quru bitki xammalı 0,5 litr qaynanmış suda 3 saat ərzində dəmləyərək gündə 3 dəfə yeməkdən 2-3 saat sonra qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 4 həftədir.		

Qarışıq №34

Dərman gülxətmi - (<i>Althea officinalis</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq və	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	çiçək	1 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	zirvə yarpaqları və çiçək	2 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və kök	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və yarpaq	4 hissə
Meşə çiyləyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	çiçək və meyvə	1 hissə
Gülümbaharı - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə
Sığırquyuğu - (<i>Verbascum phlomoides</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Ürəkşəkilli çökə - (<i>Tilia cordata</i>)	çiçək	2 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	yarpaq	2 hissə
Adi zirə - (<i>Carum carvi</i>)	kök	1 hissə
Adi razyana - (<i>Foeniculum vulgare</i>)	çiçək, yarpaq və meyvə	1 hissə
Kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	çiçək, yarpaq və meyvə	3 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
	yarpaq, çiçək və toxum	
Bu qarışıq 14-21 gün ərzində 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənərək qəbul edilməlidir.		

Bu qarışıq 2-3 sutqa ərzində bəlgəmi azaldaraq temperaturu normallaşdırır və baş ağrısını kəsir. Xalq təbabətində soyuq-dəymə xəstəliklərinin müalicəsində ot dəmləməsi təkcə daxilə deyil, həm də isti ayaq vannası, kompres, qarqara və inqalyasiya şəklində istifadə edilir. Inqalyasiya şəklində dərman sürvəsi, kəklikotu, qatırquyuğu, boymadərən, bənövşə, gülümbahar, zəif dazı və çobanyastığından həm ayrıca və həm də qarışıq şəklində istifadə edilə bilər. Xırdalanmış 3-4 xörək qaşığı bitki qarışığına 0,5 litr qaynanmış su əlavə edilir və 10 dəqiqə ərzində çini

çaynikdə dəmlənilir. Çaynik od üzərindən götürülərək qıfı kağızla bağlanılır, ağız və burun isti buxarla inhalyasiya edilir.

Gülxətmi şərbəti: Gülxətminin quru kökünün cövhəri 2:98 nisbətində hazırlanır. Eyni zamanda aşağıdakı kimi də hazırlanır. Rp.: Inf. rad. Altaeae 6,0-180,0. Sir. Liquiritiae ad 200,0

M.D.S. 2 saatdan bir 1 xörək qaşığı daxilə (böyüklərə) qəbul edilir.

Sinə eliksiri: Biyan kökünün ekstraktı 60 hissə, nişatır spirti 10 hissə, cırə yağı 1 hissə, etil spirti 49 hissə və su 180 hissə. Gün ərzində 3-4 dəfə hər dəfə 20-40 damcı qəbul edilməlidir (böyüklər).

Pertussin: Kəklikotu cövhəri 12 hissə, kalium bromid 1 hissə, 80% li etil spirti 5 hissə Böyüklər 1 xörək qaşığı, uşaqlar isə 0,5 çay qaşığı gün ərzində 3 dəfə qəbul edə bilərlər.

Tərlədici qarışıq: Moruq meyvələri 2 hissə, dəvədabanı 2 hissə, qaraqınıq 1 hissə. Kruppoz pnevmoniya, eksudativ plevrit, bronxoektaziya, ağ ciyər vərəmi və bronxial astma xəstəliklərində istifadə edilir.

Qarışıq № 34 və qarışıq №36 ilə xroniki bronxit, xroniki pnevmoniya bronxoektaziya, ağ ciyər vərəmi və bronxial astma xəstəliklərini müalicə etmək olar. Bu qarışıqlar bronxial astma xəstəliklərində antiallergik, bronxolitik, iltihabsorucu, öskürəkkəsici və orqanizmi möhkəmləndirici təsir edir. Qanhayxırma və ağ ciyər qanaxmalarında qanqəsici tərkib kimi qarışıq №37-dən istifadə edilir.

Qarışıq №35

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	1 hissə
Suyoncası - (<i>Menyanthes trifoliata</i>)	yarpaq və çiçək başcıqları	3 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq və gövdə	1 hissə
Gürcü böyürtkəni - (<i>Rubus ibericus</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Adi dəvədabanı - (<i>Tussilago farfara</i>)	yarpaq və meyvə	3 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə və kök	1 hissə
Yunan qozu - (<i>Juglans regia</i>)	yerüstü hissə və kök	1 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	yarpaq və meyvə	1 hissə
Qırxbuğumu - (<i>Polygonum aviculare</i>)	çiçək	3 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Üçrəng bənövşə - (<i>Viola tricolor</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə

Bu qarışıq 28-30 gün ərzində 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənərək qəbul edilməlidir.

Qarışıq №36

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqdarı
Adi zirə - (<i>Carum carvi</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
Valerian - (<i>Valeriane officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	1 hissə
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Adi dəvədabanı - (<i>Tussilago farfara</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
İstiot nanəsi - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	1 hissə
Qara qarağat - (<i>Rubus nigrum</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	1 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yerüstü hissələri	3 hissə

Bu qarışıq 14-21 gün ərzində 2-3 xörək qaşığı 0,5 litr qaynanmış suda dəmlənərək qəbul edilməlidir.

Qarışıq №37

Suyoncası - (<i>Menyanthes trifoliata</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə

Bu qarışığın 2-3 xörək qaşığını 0,5 litr qaynanmış suda (termosda) dəmləyərək qəbul etmək lazımdır. Müalicə kursu 4 həftədir.

MƏDƏ-BAĞIRSAQ XƏSTƏLİKLƏRİNİN FITOTERAPIYASI

Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin fitoterapiyası zamanı iltihab-sorucu, bürüyücü, işlədici, büzücü, ağrıkəsici, spazmalotik və qankəsici bitkilərdən istifadə edilir. Fitoterapiya zamanı mikroba qarşı təsirlə bağırsaqlarda normal mikroflora yaradılmaqla, dis-bakteriozun inkişafına şərait yaradılmamalıdır. Dərman bitkiləri ilə sinir və endokrin, mədə-bağırsaq sisteminin trofikasını (qidalanmasını) normallaşdıraraq, zədələnmiş hüceyrələri bərpa etmək mümkündür.

Xroniki qastrit, hiperqastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliklərində aşağıdakı qarışıqlardan istifadə etmək məqsədəuyğundur.

Qarışıq №38

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	2 hissə
Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq və	2 hissə
Ağ söyüd - (<i>Salix alba</i>)	çiçək	1 hissə
Ddazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və yarpaq	5 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
Bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Şirquyruğu - <i>Leonuris</i>	yarpaq və toxum	5 hissə
<i>quinquelobatus</i>	yarpaq və çiçək	
Qara qarağat - (<i>Rubus nigrum</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə
Bu qarışığın 2-3 xörək qaşığını 0,5 litr qaynanmış suda (termosda) dəmləməklə, gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1,5-2 aydır.		

Qarışıq №39

Gülxətmi - (<i>Althaea officinalis</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Suyoncası - (<i>Menyanthes trifoliata</i>)	yarpaq və çiçək başcıqları	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və gövdə	3 hissə
Meşə çiyləyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə
Gülümbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	1 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	4 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	3 hissə
Adi dəvədabanı - (<i>Tussilago farfara</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	1 hissə

2-3 xörək qaşığı qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda (termosda) dəmləməklə, gündə 3-4 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 2 aydır.

Qarışıq №40

Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Dağtərxunu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Şirquyruğu - (<i>Leonuris quinquelobatus</i>)	çiçək və yarpaq	1 hissə
Adi mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	toxum, çiçək	3 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	kök	2 hissə
Adi zirə - (<i>Carum carvi</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə

Bu qarışığın 2-3 xörək qaşığını 0,5 litr qaynanmış suda (termos) dəmləməklə, gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1,5-2 aydır.

Qarışıq №41

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	2 hissə
Dərman valerianı - (<i>Valeriane officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	2 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	6 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	4 hissə
Dərman badrinci - (<i>Melissa offisiralis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Adi razıyana - (<i>Foeniculum vulgare</i>)	çiçək, yarpaq, meyvə	2 hissə
Sürünən kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
Çöl qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	3 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə

2-3 xörək qaşığı qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda (termosda) dəmləməklə, gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 1,5-2 aydır.

Ağbaş kələminin təzə şirəsi: Kələminin şirəsinin tərkibində U vitamini olduğundan xroniki qastrit, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliklərinin müalicəsində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Təzə hazırlanmış 0,5 və ya 1 stəkan şirəni gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20-40 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1,5-2 aydır.

Mədə turşuluğunu neytrallaşdırmaq üçün mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliklərində kartofun şirəsi əvəzedilməzdir. 0,5 stəkan şirəni gündə 1 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl səhər qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 2-4 aydır.

Zəyərk toxumu dəmlənərək (2 xörək qaşığı toxum, 0,5 litr qaynanmış su) gündə 3 dəfə 0,5 stəkan yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Mədə və onikibarmaq bağırsağ, xüsusən də böyrək və sidik yollarının daş xəstəliklərində istifadə edilir.

Qarışq №42 (tərlədici)

Adi zirə - (<i>Carum carvi</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
Valerian - (<i>Valeriane officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	2 hissə
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Güllümbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
İstiot nanəsi - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	3 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	çiçək, yarpaq, meyvə	2 hissə
Adi razyana - (<i>Foeniculum vulgare</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Adi mayaotu - (<i>Humulus lupulus</i>)	çiçək, yarpaq, meyvə	2 hissə

Mədə xorasının konservativ müalicəsi zamanı bu tərkibin 3 xörək qaşığı 0,5 stəkan suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 4 aydır.

Qarışıq №43

Gülxətmi - (<i>Althea officinalis</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Adi zəyərək - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	5 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə, kök	2 hissə
Dağ tərsumu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə

45 q bu xammal qarışıq 0,5 stəkan qaynanmış suda dəmlənilməli gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Xroniki qastrit və sekreksiyanın azlığı ilə müşayiət edilən mədə xəstəliklərində bu qarışıq olduqca faydalıdır. Müalicə müddəti 4 aydır.

Qarışıq №44

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq, çiç .	2 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	2 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
Güllümbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Adi zəyərək - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Yunan qozu - (<i>Juglans regia</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Adi əvəlik - (<i>Rheum acetosa</i>)	yarpaq və gövdə	3 hissə
İlyi şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə

Mədə xorasının konservativ müalicəsi zamanı bu tərkibin 3 xörək qaşığı 0,7-1,0 stəkan suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 3-4 aydır.

Razyana yağı (*Oleum Foeniculi*) -Meteorizmdə 5-10 damcı qəbul etmək lazımdır.

Şüyüd dəmləməsi (*Aqua Anethumi*) -Maddələr mübadiləsi pozğunluqlarında, xüsusən duzlaşmalarda və qaraciyər pozğunluqlarında əzəzədlənməz dərmandır.

Tərlədici qarışıq (*Species Carminativae*) -Tərkibi razyana, nanə və valerian kökündən ibarətdir. Qəbizlikdə 1 xörək qaşığı 300 ml qaynanmış suda həll edərək, 0,5 stəkan gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul etmək lazımdır.

Qarışıq №45

Bahar bulaqotu - <i>Veronica verna</i>	yarpaq və meyvə	2 hissə
Adi zirinc - <i>Berberis vulgaris</i>	yarpaq və toxum	1 hissə
Zəyərək - <i>Linum usitatissimum</i>	yarpaq, çiçək və toxum	0,5 his.
İstiot nana - <i>Mentha piperita</i>	yarpaq, çiçək və toxum	1 hissə
İri buğayarpağı - <i>Plantago major</i>	çiçək	2 hissə
Mollubaşı - <i>Matricaria chamomilla</i>	çiçək, yarpaq və meyvə	1 hissə
Adi zirə - <i>Carum carvi</i>	yarpaq və çiçək	1 hissə
Adi mayaotu - <i>Humulus lupulus</i>	yarpaq və çiçək	3 hissə
Dəmrövət - <i>Chelidonium majus</i>	yarpaq, çiçək və toxum	4 hissə
Ünbər sürvə - <i>Salvia sclarea</i>	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə

40 q qarışıq 0,5 stəkan suda dəmlənərək isti halda gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 2 aydır.

Qarışıq №46

Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	zirvə yarpaqları	2 hissə
Ağ söyüd - (<i>Salix alba</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Mavi güləvər - (<i>Centaurea cyanus</i>)	yarpaq və gövdə	5 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə, kök	4 hissə
Şirquyruğu - <i>Leonuris quinquelobatus</i>	yarpaq və çiçək	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Adi mayaotu - (<i>Humulus lupulus</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
Kəklükotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə

50-55 q qarışıq 1,0 stəkan suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 25-30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 1-1,5 aydır.

Qarışıq №47

Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	2 hissə
Yovşan - <i>Artemisia absinthium</i>	yarpaq və çiçək	1 hissə
Şüyüd - <i>Anethum graveolens</i>	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
Kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq, çiçək	1 hissə

45-50 q xammal 200 ml qaynanmış suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 2 aydır.

Qarışıq №48

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	2 hissə
Gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	8 hissə
Zəncirotu - <i>Taraxacum officinale</i>	çiçək, yarpaq	4 hissə
Yovşan - <i>Artemisia absinthium</i>	yarpaq, çiçək	3 hissə
Qatırquyruğu - <i>Equisetum arvense</i>	yerüstü hissələri	4 hissə
45-50 q xammal 200 ml qaynanmış suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 3 həftədir.		

Qarışıq №49

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, çiçək	4 hissə
Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	6 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	3 hissə
Yunan qozu - (<i>Juglans regia</i>)	yarpaq və meyvə	5 hissə
Adi kasni - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq, çiçək	4 hissə
50 q qarışıq 0,5 stəkan suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 25-30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Yunan qozu: Araqda (30q, 1 litr araq) həll edərək (9 gün) 1 çay qaşığı gündə 3 dəfə yeməkdən 45 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 2 aydır.		

Qarışıq №50

Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	3 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq və gövdə	7 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	5 hissə
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq və toxum	5 hissə
Iyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	3 hissə
60 q bu xammal 250 ml qaynanmış suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 21 gündür.		

XRONIKI ENTERKOLIT XƏSTƏLİKLƏRİNİN FITOTERAPIYASI

Xalq təbabətində bağırsağın əksər xəstəliklərində (qarışıqın tərkibindən asılı olaraq qəbizlikdə və əksinə ishalda) tətbiq edilir.

Qarışıq №51

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqda rı
Suyoncası - (<i>Menyanthes trifoliata</i>)	yarpaq və çiçək başcıqları	5 hissə
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
Zəif dazi - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Dərman bədrinci - (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	kök	1 hissə
Adi razyana - (<i>Foeniculum vulgare</i>)	çiçək, yarpaq və meyvə	1 hissə
60 q bu xammal 400 ml qaynanmış suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 14 gündür.		

Qarışıq №52

Qara kəndəlaş - (<i>Sambucus nigra</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	5 hissə
Dəmrovotu - (<i>Chelidonium majus</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
60 q xammal 250 ml qaynanmış suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 7-10 gündür.		

Qarışıq №53

Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	1 hissə
Adi zirə - (<i>Carum carvi</i>)	zirvə yarpaqları	2 hissə
Duzı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Li ətəpənğı - (<i>Arctium lappa</i>)	yarpaq, çiçək və kök	5 hissə
Şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	1 hissə
Quşarınudu - (<i>Sorbus aucuparia</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Adi əvəlik - (<i>Rheum acetosa</i>)	kök	4 hissə
45 q xammal 2 stəkan qaynanmış suda dəmlənərək gündə 2 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 30 gündür.		

Qarışıq №54

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	2 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	1 hissə
Çiyələk - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə
Gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	3 hissə
Böyürtkən - (<i>Rubus ibericus</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Qara qarağat - (<i>Ribes nigrum</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
Kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
15-20 q xammal 250 ml qaynanmış suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 21 gündür.		

Babasil əleyhinə qarışıq: Səna yarpağı 2 hissə, boymadərən bitkisi 2 hissə, şüyüd toxumları 1 hissə, biyan kökü 20 hissə. Çay kimi dəmlənib, yeməkdən 2 saat sonra 3-4 həftə qəbul edilməlidir.

Qarışıq №55

Vaierian - (<i>Valeriane officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	2 hissə
Güləmbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Dəvədabanı - (<i>Fussilago farfara</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə
Yunan qozu - (<i>Juglans regia</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Xammalın 60 qramını 0,5 stəkan qaynanmış suda dəmləməli və gündə 3 dəfə yemək zamanı qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 7-10 gündür.		

Qarışıq №56

Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	7 hissə
Quşəppəyi - (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	çiçək, yarpaq, gövdə	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
45 q qarışıq 0,5 stəkan suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 25 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 1 aydır.		

Qarışıq №57

Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Su yoncası - (<i>Menyanthes trifoliata</i>)	zirvə yarpaqları	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
55-60 q xammal 0,5 stəkan suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl və ya 2 saat sonra qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 1 aydır.		

Qarışıq №58

Gülxətmi - (<i>Althaea officinalis</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Dağtərxunu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	çiçək və yarpaq	1 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə və kök	3 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polgonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
45 q qarışıq 0,5 stəkan suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 25-30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 7-8 gündür.		

Qarışıq №59

Ucu andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	2 hissə
Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
Güllümbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Yunan qozu - (<i>Juglans regia</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
60 q xammal 180-200ml qaynanmış suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl və ya 2 saat sonra qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 1 aydır.		

Qarışıq №60

Adi qaraqımıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Məşə çiyələyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	2 hissə

Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	4 hissə
---	----------------------	---------

60 q xammal 500-700 ml qaynanmış suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 2 aydır.

Qarışıq №61

Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Əkin güləvəri - (<i>Centaurea cyanus</i>)	zirvə yarpaqları	3 hissə
Ağ söyüd - (<i>Salix alba</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və gövdə	5 hissə
Şirquyruğu - (<i>Leonuris quinquelobatus</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
Adi boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Sürünən kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə

Xammalın 30 qramını 0,5 stəkan qaynanmış suda dəmləməli və gündə 3 dəfə yemək zamanı qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 7-10 gündür.

Qarışıq №62

Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	2 hissə
Yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq, çiçək	4 hissə

Xammalın 30 qramını 0,5 stəkan qaynanmış suda dəmləməli və gündə 3 dəfə yemək zamanı qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 1 aydır.

Qarışıq №63

Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə və kök	4 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	4 hissə
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq və çiçək	2 hissə

55-60 q xammal 0,5 stəkan suda dəmlənərək gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl və ya 2 saat sonra qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 1 aydır.

Qarışıq №64

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	2 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	zırvə yarpaqları	8 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə və kök	4 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	4 hissə
20 q xammal 0,5 stəkan suda dəmlənərək gündə 2 dəfə yeməkdən 2 saat sonra qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 2 aydır.		

Qarışıq №65

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq və	4 hissə
Adi ardıc - (<i>Juniperus communis</i>)	çiçək	2 hissə
İstiot nanəsi - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq və meyvə	3 hissə
Yunan qozu - (<i>Juglans regia</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	5 hissə
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	yarpaq və meyvə	4 hissə
40q xammal 180-250ml qaynanmış suda dəmlənərək gündə 2 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 1 aydır.		

Qarışıq №66

Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Bədrənc - (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Adi əvəlik - (<i>Rheum acetosa</i>)	yarpaq və gövdə	2 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	kök	3 hissə
Razyana - (<i>Foeniculum vulgare</i>)	çiçək, yarpaq, meyvə	1 hissə
Xammalın 45 qramı 180-200ml qaynanmış suda dəmlənərək gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 2 aydır.		

Qarışıq №67

Qara kəndəlaş - (<i>Sambucus nigra</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	5 hissə
Dəmrovotu - (<i>Chelidonium majus</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
30q xammal 200ml qaynanmış suda dəmlənərək yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 1 aydır.		

Qarışıq №68

Adi zirə - (<i>Carum carvi</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
Valerian - (<i>Valeriane officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	2 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	4 hissə
Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
İri atpıtrağı - (<i>Arctium lappa</i>)	yarpaq, çiçək və kök	5 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə və kök	4 hissə
Quşarmudu - (<i>Sorbus aucuparia</i>)	yerüstü hissə və kök	2 hissə
Şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq və meyvə	1 hissə
At əvəliyi - (<i>Rumex confertus</i>)	yarpaq və gövdə	4 hissə

Xammalın 60 qramını 500-700ml qaynanmış suda dəmləməli və gündə 3 dəfə yemək zamanı qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 7-10 gündür.

Qarışıq №69

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	2 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	1 hissə
Zəif dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	yarpaq	3 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Gürcü böyütkəni - (<i>Rubus ibericus</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	4 hissə
Qara qarağat - (<i>Rubus nigrum</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	4 hissə

Xammalın 30 qramını 200 ml qaynanmış suda dəmləməli və gündə 2 dəfə yeməkdən 2 saat sonra qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 30 gündür.

Qarışıq №70

Gülxətmi - (<i>Althaea officinalis</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Valerianı - (<i>Valeriane officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	2 hissə
Gülümbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Adi dəvədabanı - (<i>Tussilago farfara</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə
Yunan qozu - (<i>Juglans regia</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə

Xammalın 25 qramı 0,5 stəkan suda dəmləməli gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə 14 gündür.

Qarışıq №71

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq, çiçək	2 hissə
Ağ söyüd - (<i>Salix alba</i>)	zirvə yarpaqları	3 hissə
Pıtraq - (<i>Xanthium spinosum</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	7 hissə
Quşəppəyi - (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	çiçək, yarpaq, gövdə	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə

25 qram qarışıq 1,0 stəkan qaynanmış suda 20 dəqiqə dəmlənməli, gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda qəbul edilməlidir. Müalicə müddəti 10 gündür.

Qarışıq №72

Suyoncası - (<i>Menyanthes trifoliata</i>)	zirvə yarpaqları	5 hissə
Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	2 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	4 hissə

2 xörək qaşığı qarışıq 0,5 litr suda zəif od üzərində 10 dəqiqə ərzində dəmləmək lazımdır. Gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda içilməlidir. Müalicə müddəti 15 gündür.

Qarışıq №73

Gülxətmi - (<i>Althaea officinalis</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
Gülümbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə

2 xörək qaşığı qarışıq 0,5 litr suda zəif od üzərində 10 dəqiqə dəmlənilməlidir. Soyuduqdan sonra imalə etmək olar. Müalicə müddəti 5-7 gündür.

Qarışıq №74

Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	5 hissə
Dağ tərşumu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə

1 xörək qaşığı qarışıq 0,5 litr suda zəif od üzərində 10 dəqiqə dəmlənilməlidir. Gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda içilməlidir. Müalicə müddəti 20 gündür.

HELMINT XƏSTƏLİKLƏRİNİN FITOTERAPIYASI

Dərmanlarla helmintrlərə qarşı mübarizə etmək olduqca xoşagəlməz hallar törədir. Belə ki, mərkəzi sinir sistemində, qaraciyərdə ciddi fəsadlar yaranır. Ona görə də dərman bitkiləri ilə müalicə etmək daha məqsədəuyğundur.

Qarışıq №75

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqdarı
Valerian - (<i>Valeriana officinalis</i>)	yarpaq, kök və çiçək	2 hissə
Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq və çiçək	2 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	5 hissə
Dağ tərsumu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və çiçək	5 hissə
2 xörək qaşığı qarışığı 0,5 litr suda zəif od üzərində 10 dəqiqə dəmləmək lazımdır. Gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl isti halda içilməlidir. Müalicə müddəti 20-30 gündür.		

Qarışıq №76

Solmazçiçək - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	5 hissə
Adi qaraqıymıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Adi qarğıdalı - (<i>Zea mays</i>)	yarpaq	3 hissə
Yunan qozu - (<i>Juglans regia</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
2 xörək qaşığı xammal 0,5 litr suda zəif od üzərində 10 dəqiqə ərzində dəmləmək lazımdır. Gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içilməlidir. Müalicə müddəti 21 gündür.		

Sitvar yovşanı (*Flores cinæ*) - qurdəleyhinə (askarid) dərman bitkisi. Xəstə 1-ci gün axşam imalə edilməlidir. 2 və 3-cü günlər yovşanın 5q toxumu (yeniyetmələr) yeməkdən 1-1,5 saat əvvəl qəbul edilməlidir. Axşam yenidən xəstə imalə olunmalıdır. Yaş və doza arasındakı asılılıq aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Yaş	Doza qramla
1-3 yaş	0,25-0,75
4-6 yaş	1-1,5
7-9 yaş	1,75-2,25
10-14 yaş	2,5-3,5
15 yaş	4,0
Yuxarı yaşlar	5,0

QARACİYƏR, ÖD YOLLARI VƏ XRONİKİ PANKERATITIN FITOTERAPIYASI

Qaraciyər, öd yolları və xroniki pankreatitin dərman bitkiləri ilə müalicəsində spazmolitik, antiallergik və iltihabəleyhinə bitkilərdən istifadə edilməlidir ki, öd yollarının spazmı aradan qalx-sın, diurez normallaşsın, öd pigmentləri və toksinlər orqanizm-dən kənar olsun. Bu xəstəliklərə qarşı müalicə işi aparmaq üçün aşağıdakı qarışıqlar təklif edilir:

Qarışq №77

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqda rı
Solmazçiçək - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	3 hissə
Gülumbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	5 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	2 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	3 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	2 hissə
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə
2-3 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5 litr) 3 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 21 gündür.		

Qarışıq №78

Solmazçiçək - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	4 hissə
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
Suyoncası - (<i>Menyanthes trifoliata</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Adi zəyərək - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	4 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
Adi boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Sürünən kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
2-3 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5 litr) 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3-4 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 21-30 gündür.		

Qarışıq №79

Solmazçiçək - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	6 hissə
Zəif dazi - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Adi zəyərək - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	3 hissə
Quşəppəyi - (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	çiçək, yarpaq və gövdə	4 hissə
Adi boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	5 hissə
2-3 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5 litr) 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3-4 dəfəyə qəbul etmək lazımdır.		

Xroniki qastrit və sarılıq zamanı həftədə 2-3 dəfə çobanyastığı ilə isti imalə etmək lazımdır. Xroniki hepatitin fitoterapiyası qaraciyər toxumasında iltihabi-distrofik dəyişikliyin sağlamlası (remissiya) illərlə davam edə bilər.

Qarışıq №80

Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	2 hissə
Solmazçiçək - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	7 hissə
Gülümbaharı - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	5 hissə
Adi qarğıdalı saçağı - (<i>Zea mays</i>)	yarpaq	2 hissə
Adi zəyərək - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	1 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	2 hissə
Adi kəsni - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq və çiçək	3 hissə

2-3 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5 litr) 6 saat ərzində dəmləyərək, 20-30 dəqiqə yeməkdən əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 2 aydır.

Qarışq №81

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq, çiçək	2 hissə
Solmazçiçək - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	5 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Meşə çiyələyi - (<i>Fragaria vesca</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
Adi zəyərək - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	3 hissə
Iyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Sürünən kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	5 hissə
Dərovotu - (<i>Chelidonium majus</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə

2 xörək qaşığı xammal 0,5 litr suda zəif od üzərində 10 dəqiqə ərzində dəmlənməlidir. Gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl qəbul edilir. Müalicə müddəti 2 aydır.

Qarışq №82

Solmazçiçək - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	6 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	3 hissə
Adi zəyərək - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	3 hissə
Dağtərxunu (<i>Tanacetum vulgare</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Adi razyana - (<i>Foeniculum vulgare</i>)	çiçək, yarpaq və meyvə	2 hissə

2 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5 litr) 3 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1 aydır.

ÖDDAŞI VƏ XRONIKI PANKERATITIN FITOTERAPIYASI

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində xalq təbabətində öddaşı və xroniki pankeratitin müalicəsi bir və ya bir neçə bitkinin tətbiqi ilə aparılır.

Qarışıq №83

Bitkinin Azərbaycan və Latın dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqda rı
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Solmazçiçək - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	7 hissə
Zəif dazi - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
İkivli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	5 hissə
Qızılağac kövrək murdarça - (<i>Frangula alnus</i>)	meyvə və toxum	2 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	1 hissə
Quşəppəyi - (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	çiçək, yarpaq və gövdə	2 hissə
Dağtərxunu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq və çiçək	4 hissə

2-3 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5 litr) 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 3 aydır.

Qarışıq №84

Solmazçiçək- (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	5 hissə
Zəif dazi - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və meyvə	3 hissə
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	yarpaq	4 hissə
Adi qarğıdalı - (<i>Zea mays</i>)	yarpaq və toxum	4 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yerüstü hissə və kök	2 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə və kök	2 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	çiçək, yarpaq və meyvə	5 hissə
Adi razyana - (<i>Foeniculum vulgare</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Dəmrovotu - (<i>Chelidonium majus</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə

2 xörək qaşığı qarışığı 3 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl 2 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 2 aydır.

Qarışıq №85

Solmazçiçək - (<i>Helichrysum arenarium</i>)	çiçək səbətləri ilə çiçək	3 hissə
Gülumbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Ördək qaytarma - (<i>Potentilla anserina</i>)	yarpaq	2 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	4 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	2 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Sürünən kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Yemişan - (<i>Crataegus sanguinea</i>)	meyvə və çiçək	4 hissə
2-3 xörək qaşığı qarışığı termosda 2 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1 aydır.		

BÖYRƏK VƏ SIDİK YOLLARI XƏSTƏLİKLƏRİNİN FITOTERAPIYASI

Böyrək və sidik yolları xəstəliklərinin müalicəsi zamanı iltihabqovucu, qankəsici, antikauqlyant, hipotenziv, antiallergik, dezintoksikasiyaedici və sidikqovucu dərman bitkilərindən istifadə etmək lazımdır. Kəskin və xroniki qlomerulonefrit və digər nefrotik sindromların müalicəsi zamanı aşağıdakı qarışıqlardan istifadə etmək lazımdır.

Qarışıq №86

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqdarı
Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	1 hissə
Adi palıd - (<i>Quercus robur</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Gülumbaharı - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	3 hissə
2-3 xörək qaşığı qarışığı termosda 4 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1 aydır.		

Qarışıq №87

Qara kəndəlaş - (<i>Sambucus nigra</i>)	zirvə yarpaqları	2 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	1 hissə
Adi dəvədabanı - (<i>Tussilago farfara</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Şirquyruğu - (<i>Leonuris quinquelobatus</i>)	yarpaq və çiçək	7 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	4 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə

3 xörək qaşığı xammalı 2 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 2 aydır.

Qarışıq №88

Dərman gülxətmi - (<i>Althaea officinalis</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və gövdə	3 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	5 hissə
İkivli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	4 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Şirquyruğu - (<i>Leonuris quinquelobatus</i>)	yarpaq və çiçək	8 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	3 hissə

3 xörək qaşığı xammalı 4 saat ərzində 1,0 litr suda dəmləyərək, yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1,5 aydır.

Qarışıq №89

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq, çiçək	4 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və meyvə	3 hissə
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	yarpaq	3 hissə
Qaytarma - (<i>Potentilla anserina</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	çiçək, yarpaq, gövdə	3 hissə
Quşəppəyi - (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	kök	4 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Ücrəng bənövşə - (<i>Viola tricolor</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə

5 xörək qaşığı xammalı 3 saat ərzində 1,0 litr suda dəmləyərək, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 2 aydır.

XRONIKI PIELONEFRIT VƏ XRONIKI SISTITIN FITOTERAPIYASI

Qarışıq №90

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqdarı
Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	2 hissə
Qara kəndəlaş - (<i>Sambucus nigra</i>)	zirvə yarpaqları	4 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
Badrinc - (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	5 hissə
Ayıqulağı - (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>)	meyvə və çiçək	5 hissə
Adi razyana - (<i>Foeniculum vulgare</i>)	çiçək, yarpaq, meyvə	2 hissə

5 xörək qaşığı xammalı 3 saat ərzində 1,0 litr suda dəmləyərək, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1 ildir.

Qarışıq №91

Gülxətmi - (<i>Althaea officinalis</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq və gövdə	5 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	4 hissə
Üçrəng bənövşə - (<i>Viola tricolor</i>)	yarpaq və çiçək	5 hissə

2 xörək qaşığı xammalı 2 saat ərzində 1,0 litr suda dəmləyərək, yeməkdən əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 3 həftədir.

Qarışıq №92

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqdarı
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və gövdə	5 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Adi qarğıdalı saçağı - (<i>Zea mays</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə

2 xörək qaşığı xammalı 1,0 litr suda 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3-4 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 2-3 həftədir.

Qarışıq №93

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq, çiçək	2 hissə
Qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	7 hissə
Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Cəfəri - (<i>Petroselinum crispum</i>)	yarpaq	5 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	5 hissə

2-3 xörək qaşığı xammalı termosda (0,5litr) 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3-4 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1-1,5 ildir.

Qarışıq №94

Ayıqulağı - (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>)	meyvə və çiçək	5 hissə
Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq, çiçək	3 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	5 hissə

(Sidikqovucu qarışıq) 3 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5litr) 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə 14-21 gün ərzində qəbul etmək lazımdır.

Qarışıq №95

Ayıqulağı - (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	7 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	kök	1 hissə

(Sidikqovucu qarışıq) 3 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5litr) 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə 10-14 gün ərzində qəbul etmək lazımdır. Xroniki qlomerulonefritdə müalicə müddəti fasilə ilə ömür boyu aparılmalıdır.

Qarışıq №96

Ayıqulağı - (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
Adi ardıc - (<i>Juniperus communis</i>)	yarpaq, meyvə	2 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	kök	1 hissə

(Sidikqovucu qarışıq) 3 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5litr) 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 10-14 gün ərzində qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1 ildir. Sistit zamanı bu tərkiblə vanna etmək də mümkündür.

Qarışıq №97

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumur, çiçək	5 hissə
Qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Qara qarağat - (<i>Ribes nigrum</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	5 hissə
Üçrəng bənövşə - (<i>Viola tricolor</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə

(Sidikqovucu qarışıq) 3 xörək qaşığı qarışıqı termosda (0,5 litr) 3 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 10-14 gün ərzində qəbul etmək lazımdır.

Qarışıq №98

Gülumbaharı - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	5 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	5 hissə
Dəmrovotu - (<i>Chelidonium majus</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə

(Sidikqovucu qarışıq) 3 xörək qaşığı qarışıqı termosda (1 litr) 4-5 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1-1,5 ildir.

Qarışıq №99

Xəşənbülü - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	5 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	5 hissə

(Sidikqovucu qarışıq) 3 xörək qaşığı qarışıqı termosda (1 litr) 4 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə 10-14 gün ərzində qəbul etmək lazımdır.

BÖYRƏKDAŞI XƏSTƏLİYİNİN FITOTERAPİYASI

Böyrəyin daş və konkrimentlərində, iltihabi xəstəliklərində (pielonefrit, sistit, pielosistit) aşağıdakı qarışıqlar olduqca səmərəlidir.

Qarışıq №100

Bitkinin Azərbaycan və Latın dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqda rı
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	çiçək və toxum	2 hissə
Qara qaragilə - (<i>Solanum nigrum</i>)	yarpaq və meyvə	5 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və toxum	3 hissə
Adi əvəlik - (<i>Rheum acetosa</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	meyvə və yarpaq	5 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
3 xörək qasıği qarışıği termosda (1 litr) 6-10 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə 10-14 gün ərzində qəbul etmək lazımdır.		

Qarışıq №101

Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	5 hissə
İri atpıtrağı - (<i>Arctium lappa</i>)	yarpaq, çiçək və kök	4 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Quşəppəyi - (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	çiçək, yarpaq və gövdə	2 hissə
Qırxbuğum - (<i>Polygonum aviculare</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
3 xörək qasıği qarışıği termosda 0,5 litr 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə 10-14 gün ərzində qəbul etmək lazımdır.		

Qarışıq №102

Dızı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
Adi qarğıdalı - (<i>Zea mays</i>)	çiçək və yarpaq	4 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	3 hissə
Cəfəri - (<i>Petroselinum crispum</i>)	yarpaq	5 hissə
Qara qarağat - (<i>Ribes nigrum</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	4 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
3 xörək qasıği qarışıği termosda (1 litr) 4 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə 10-14 gün ərzində qəbul etmək lazımdır.		

Təqdim edilən reseptləri böyrək sancılarında və həm də müalicəvi dərman bitkiləri həll edilən vanna da (39°C) qəbul etmək olar. Konkrimentlər kənar edildikdən sonra 6-8 həftə ərzində 98 №-li qarışıqdan profilaktik olaraq 2 həftə qəbul edilməlidir. Bundan başqa yaz-payız aylarında yolxucu xəstəliklər zamanı 2 ay müddətində gündə bir dəfə yeməkdən sonra 2 stəkan içilməlidir. Daş xəstəliyi ilə bağlı əməliyyatdan sonra bu qarışığın 3-5 gün ərzində qəbul edilməsi məsləhətlidir. Yaxşı olar ki, bundan sonra əlavə olaraq 5-7 gün ərzində 5-6 xörək qaşığı quş qırxbuğumu (quşdili) bitkisi 1 litr suda dəmlənərək qəbul edilsin. Xalq təbabətində böyrəkdaşı xəstəliyində kök şirəsi ilə bal qarışığını (1:2) 1 xörək qaşığı gündə 3 dəfə yeməkdən 30-40 dəqiqə sonra qəbul edilir. Müalicə 3-4 həftə davam etdirilməlidir. Bir neçə aydan sonra müalicə təkrar edilməlidir. Böyrəkdaşı xəstəliyinin profilaktikası zamanı kəskin, duzlu, turş, alkoqol və siqaret qadağan edilməlidir. Xəstə çəkisi müqabilində maye (2-3 litr meyvə şirələri, su, bitki çayları) qəbul etməlidir.

Zəif dazının səhər yeməkdən əvvəl qəbul edilməsi uşaqlarda gecə sidiyinin saxlaya bilməməsinin qarşısını alır.

OYNAQ XƏSTƏLİKLƏRİNİN (REVMATİZM VƏ REVMATOID ARTRIT) FITOTERAPIYASI

Oynaq xəstəliklərinin müalicəsində iltihabsorucu, möhkəmləndirici, ağrıkə-sici, antiallergik və sidikqovucu dərman bitkilərindən istifadə etmək lazımdır. Fitoterapiya ilə eyni zamanda dərman müalicəsi, fizioterapiya, müalicə gim-nastikası və refleksoterapiyanın aparılması daha da effektivdir.

Qarışıq №103

Bitkinin Azərbaycan və Latın dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqda rı
Gecəvər - (<i>Acorus calamus</i>)	çiçək və toxum	1 hissə
Yemişan - (<i>Crataegus pentagyna</i>)	çiçək, yarpaq, meyvə	5 hissə
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	5 hissə
Badrənc - (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Qara qaragilə - (<i>Solanum nigrum</i>)	meyvə və yarpaq	3 hissə
Üçrəng bənövşə - (<i>Viola tricolor</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
Kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə

3 xörək qaşığı xammalı 6 saat ərzində 0,5 litr suda dəmləyərək, yeməkdən əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 10-14 gündür.

Qarışıq №104

Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	3 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Zəyərək - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Adi ardıc - (<i>Juniperus communis</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	2 hissə

Xammalın 3 xörək qaşığını 0,5 litr suda 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 14 gündür.

Qarışıq №105

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq, çiçək	2 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	5 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	2 hissə

İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	1 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	çiçək	3 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	1 hissə
Adi mayaotu - (<i>Humulus lupulus</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
3 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5 litr) 6-10 saat ərzində dəmləyərək, 20-30 dəqiqə yeməkdən əvvəl 3 dəfəyə 21 gün ərzində qəbul etmək lazımdır.		

METOBOLİK ARTRITIN FITOTERAPİYASI

Metabolik artrit, oynaq xəstəlikləri, podaqrik artrit və xondrokalsinozlarda müşahidə olunur. Metabolik artritin aşağıdakı reseptlərlə müalicə edilməsi məqsədəuyğundur.

Qarışiq №106

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqdarı
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	yarpaq	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Cəfəri - (<i>Petroselinum crispum</i>)	yarpaq	1 hissə
Qulançarı - (<i>Asparagus officinalis</i>)	yerüstü orqanları	2 hissə
Üçrəng bənövşə - (<i>Viola tricolor</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
3 xörək qaşığı qarışığı termosda (0,5 litr) 6 saat ərzində dəmləyərək, 20-30 dəqiqə yeməkdən əvvəl 3 dəfəyə 10-14 gün ərzində qəbul etmək lazımdır.		

Qarışiq №107

Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	zirvə yarpaqları	3 hissə
Qara kəndələş - (<i>Sambucus nigra</i>)	çiçək və meyvə	4 hissə
Dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Dağ tərsumu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	yerüstü hissə, kök	3 hissə
Zəncirotu - (<i>Taraxacum officinale</i>)	yerüstü hissə, kök	3 hissə
Adi mayaotu - (<i>Humulus lupulus</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə

Xammalın 3 xörək qaşığı 0,5 litr suda 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 25-30 gündür.

Qarışıq №108

Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	Yarp., tumurc., çiçək	3 hissə
Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	3 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	yarpaq, çiçək və kök	4 hissə
İri atpıtrağı - (<i>Arctium lappa</i>)	meyvə və yarpaq	3 hissə
Qara qaragilə - (<i>Solanum nigrum</i>)	zirvə yarpaqları	2 hissə
Qara qarağat - (<i>Ribes nigrum</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
İyli şüyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	gövdə, yarpaq, çiçək	4 hissə
Adi kəsni - (<i>Cichorium intybus</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə

Xammalın 5-6 xörək qaşığı qarışığı 1 litr suda 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə 3-5 həftə ərzində qəbul etmək lazımdır. 7-10 gün fasilədən sonra müalicə təkrar oluna bilər

Bu qarışıqlar revmatizm və revmatoid artrit xəstəlikləri zamanı qəbul edilməlidir. Revmatizm və revmatoid artritin müalicəsi zamanı həm də bol vitaminlərdən istifadə olunmalıdır. Metabolik artrit zamanı bir çox qidalar, xüsusən tərkibində bol purin maddələr (ətli suplar, böyrək, beyin, balıq, balıq kürüsü, yağlı ət, gül kələmi, spirtli içkilər, qatı kofe və çay) menyudan çıxarılmalıdır. Qida əsasən südlü-bitkili, qaynanmış ətdən ibarət olmalıdır. Balıq həftədə 2 dəfə qəbul edilə bilər. Yaxşı olar ki, yükəzaltma günləri təyin edilsin. Axşam çobanyastığı və sürvə ilə (1,5-2 litr) imalə edilməli, sonrakı gün isə südlü-bitkili qidalar qəbul edilməlidir. illərlə yükəzaltma günləri (həftədə 1 dəfə) davam etdirilməsi xoş və sakit ömür sürməyin əsasıdır.

Qarışıq №109

Qara kəndələş - (<i>Sambucus nigra</i>)	meyvə və çiçək	3 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	zirvə yarpaqları	2 hissə
Dağ tərsumu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
Qara qarağat - (<i>Ribes nigrum</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	3 hissə
Qatırquyruğu - (<i>Equisetum arvense</i>)	yerüstü hissələri	4 hissə

Hər axşam 2-3 xörək qaşığı qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda (termos) dəmləyərək, bir dəfəyə yeməkdən 2 saat sonra qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 30 gündür.

Qarışıq №110

Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	4 hissə
İri atpıtrağı - (<i>Arctium lappa</i>)	yarpaq, çiçək, kök	4 hissə
Adi küknar - (<i>Pinus silvestris</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Adi mayaotu - (<i>Humulus lupulus</i>)	yarpaq və çiçək	5 hissə
2-3 xörək qaşığı qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda (termos) dəmləyərək, 3 dəfəyə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 40 gündür. 37-40°C temperaturda günaşırı olmaqla 10-15 vanna da qəbul etmək olar.		

Qarışıq №111

Qaraqımıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Adi ardıc - (<i>Juniperus communis</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Üçrəng bənövşə - (<i>Viola tricolor</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
2-3 xörək qaşığı qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda (termos) dəmləyərək, 3 dəfəyə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 40 gündür. 37-40°C temperaturda günaşırı olmaqla 10-15 vanna da qəbul etmək olar.		

Oynaq ağrılarında aşağıdakı məlhəmi (xəşənbül və zəif dazının 2 xörək qaşığı ovuntusunu 70 q vazelinə qatmaqla) hazırlayaraq oynaqlara yaxmaq olduqca faydalıdır.

ENDOKRİN XƏSTƏLİKLƏRİN FITOTERAPIYASI

Xüsusi şəkər xəstəliyində endokrinoloqla məsləhətləşərək dərman müalicəsi tətbiq etmək məsləhətdir. Dərman bitkilərindən ibarət aşağıdakı qarışıqlar məsləhət görülür.

Qarışıq №112

Bitkinin Azərbaycan və Latın dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqda rı
Ağ tozağacı - (<i>Betula alba</i>)	yarpaq, tumurcuq, çiçək	2 hissə
Yemişan – (<i>Crataegus pentagyna</i>)	çiçək, yarpaq və meyvə	3 hissə
İri atpıtrağı - (<i>Arctium lappa</i>)	yarpaq, çiçək və kök	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və gövdə	5 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	2 hissə
Şirquyruğu - <i>Leonuris quinquelobatus</i>	yarpaq və çiçək	3 hissə
Tüksüz biyan - (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	kök	2 hissə
Adi kasnı - (<i>Cichorium intybus</i>)	gövdə, yarpaq və çiçək	4 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə

2-3 xörək qaşığı qarışığı 1,0 litr qaynanmış suda dəmləyərək, 3 dəfəyə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 40 gündür. 37-40°C temperaturda günəşirı olmaqla 12-15 vanna da qəbul etmək olar.

Qarışıq №113

İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	3 hissə
İkievli gicitkan - (<i>Urtica dioica</i>)	zirvə yarpaqları	3 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Şirquyruğu - <i>Leonuris quinquelobatus</i>	yarpaq və çiçək	5 hissə
Kəklıkotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	4 hissə
Qaragılə - (<i>Vaccinum myrtillus</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	7 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	3 hissə

2-3 xörək qaşığı qarışığı 1,0 litr qaynanmış suda dəmləyərək, 3 dəfəyə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 25-30 gündür.

Qarışıq №114

Dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Adi qarğıdalı - (<i>Zea mays</i>)	çiçək və yarpaq	4 hissə
İri atpıtrağı - (<i>Arctium lappa</i>)	yarpaq, çiçək, kök	5 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	2 hissə
Yunan qozu - (<i>Juglans regia</i>)	yarpaq və meyvə	3 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə

2-3 xörək qaşığı qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda (termos) dəmləyərək, 3 dəfəyə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 40 gündür.

Qarışıq №115

İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Qara kəndəlaş - (<i>Sambucus nigra</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
Adi zəyərək - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək və toxum	3 hissə
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	3 hissə
Qara qarağat - (<i>Ribes nigrum</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	7 hissə
Qara qaragilə - (<i>Solanum nigrum</i>)	yarpaq, çiçək və meyvə	2 hissə

2-3 xörək qaşığı qarışığı 1,0 litr qaynanmış suda (termos) dəmləyərək, 2 dəfəyə yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 25 gündür.

ZOBUN (DIFFUZ TOKSIKI URUN) FITOTERAPIYASI

Şəkərli diabetdə olduğu kimi diffuz toksiki urun (zob) müalicəsi də dərman müalicəsi ilə başlanılmalıdır. Sonra isə dərman bitkiləri ilə müalicəni davam etdirmək məsləhətdir.

Qarışıq №116

Bitkinin Azərbaycan və Latin dillərində adı	Bitkinin istifadə orqanı	Miqdarı
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	3 hissə
Xəşənbülü - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	3 hissə
Gülumbahar - (<i>Calendula officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Dərman badrinci (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Dağtərxunu - (<i>Tanacetum vulgare</i>)	çiçək və yarpaq	2 hissə
Adi zəyərek - (<i>Linum usitatissimum</i>)	yarpaq və toxum	4 hissə
Adi mayaotu - (<i>Humulus lupulus</i>)	yarpaq və çiçək	3 hissə
Ənbər sürvə - (<i>Salvia sclarea</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	4 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	3 hissə

Xammalın 5-6 xörək qaşığı qarışığını 1,0 litr suda 6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə 3-4 həftə ərzində qəbul etmək lazımdır.

Qarışıq №117

Tikanlı pıtraq - (<i>Xanthium spinosum</i>)	meyvə və çiçək	5 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
Acı yovşan - (<i>Artemisia absinthium</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
Boymadərən - (<i>Achillea millefolium</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Kəklikotu - (<i>Thymus serpyllum</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə

Hər axşam 2-3 xörək qaşığı qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda (termos) dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 2 ildir.

Qarışıq №118

Yemişan - (<i>Crataegus sanguinea</i>)	meyvə və çiçək	2 hissə
Valerian - (<i>Valeriana officinalis</i>)	yarpaq, kök , çiçək	1 hissə
Tikanlı pıtraq - (<i>Xanthium spinosum</i>)	çiçək və yarpaq	6 hissə
Adi qaraqınıq - (<i>Origanum vulgare</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Dərman badrinci - (<i>Melissa officinalis</i>)	yarpaq və çiçək	2 hissə

Şirquyruğu - <i>Leonuris quinquelobatus</i>	yarpaq və çiçək	5 hissə
İyli şitəyüd - (<i>Anethum graveolens</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə

Xammalın 5 xörək qaşığı qarışığını 1,0 litr suda 4-6 saat ərzində dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl 3 dəfəyə qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1,5 ildir.

Qarışıq №119

Uca andız - (<i>Inula helenium</i>)	çiçək və kök	1 hissə
Xəşənbül - (<i>Melilotus officinalis</i>)	çiçək və yarpaq	3 hissə
Pıtraq - (<i>Xanthium spinosum</i>)	çiçək və yarpaq	5 hissə
Zəif dazı - (<i>Hypericum perforatum</i>)	çiçək və meyvə	2 hissə
Bahar bulaqotu - (<i>Veronica verna</i>)	yarpaq və meyvə	2 hissə
Adi zirinc - (<i>Berberis vulgaris</i>)	yarpaq, çiçək, toxum	1 hissə
İstiot nanə - (<i>Mentha piperita</i>)	yarpaq və toxum	2 hissə
İri bağayarpağı - (<i>Plantago major</i>)	çiçək	2 hissə
Mollabaşı - (<i>Matricaria chamomilla</i>)	yarpaq və çiçək	1 hissə
Üçrəng bənövşə - (<i>Viola tricolor</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə
İt itburnu - (<i>Rosa canina</i>)	yarpaq, çiçək, meyvə	2 hissə

Axşamlar 2-3 xörək qaşığı qarışığı 0,5 litr qaynanmış suda (termos) dəmləyərək, yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl qəbul etmək lazımdır. Müalicə müddəti 1 ildir.

ABOUT ETHNOBOTANICAL HISTORY OF MEDICINAL PLANTS

Study of the medicinal plants and their use has been started since the ancient periods – Primitive community of the history. Even the primitive man tried wide use of plants to survive. Information about the medicinal plants passed orally from generation-to-generation before the discovery of writing. Afterwards sets of scientific transactions about medicinal plants were written. The Sumers creating medicinal sciences related with three subjects – astronomy, religion and mathematics on the base of medicinal plants presented interesting information. Babils changed the Sumers 4 thousand years B.C. further the Assyrians getting achievements earned by the Sumers in the fields of medical and pharmaceutical sciences developed them much more. On the regulation purposes of cure by means of plant-based medicine they applied measure and weight ways, put writing system in order and caused more wide study of the medicinal plants.

Egyptians' code of medical transactions named "Papyrus-Ebersa" contained of 7 Volumes is a very valuable and historical work dedicated to the study and use of the medicinal plants. Scientific names of certain medicinal plants, their receipt time-tables and rules of use at different diseases have been described with a special accuracy in this work. India, China, Greece, Egypt, Iran and Rome have played a significant role in the field of medicinal plants study. Many human diseases and their cure methods were indicated in the ancient Chinese medicine.

The most ancient and well-known code of the Indian medicine "Ayur Veda" (Life Science) was written in 2600 B.C. Indian physician Sushurta generalised all medical literatures until Asklipida's activities in this work. Botanical description, geographical spread areas, collection date, rules of their use at different diseases of separate medicinal plants were shown here. The medicinal plants as: rhubarb (*Rheum* L.), cinnamon (*Cinna-*

monum L.), ginger (*Zingiber Adans.*), ginseng (*Panax* L.), hemp/kenaf (*Cannabis* L.) were already known in world markets.

Wide information about Assyria tsar Ashshurbanipalan's medicinal plants (660-s B.C.) on the clay boards in Nineveh are remaining in the ancient libraries of the world. Rules of medicinal plants' use at certain diseases were indicated on these writings.

Unfortunately archeological excavations didn't completely explain the ancient medicinal plants for us. The initial writings on the culture monuments and sculptures in India and China make us to know use of plants on the cure purposes. Interesting information about special use of plants was met on the Sanskrit, Ancient Jewish, Chinese, Greek and Roman culture monuments and sculptures.

Ancient Greece has also played a great role in the development of medicine and pharmaceuticals. Medical science started its development in the Hippocrates' period (460-377-s B.C.). Significant role of the medicinal plants in development of medical science was noted at every page of Hippocrates collection named "Corpus Hippocraticum" which was created during his activities as a physician and it didn't lose its importance up today. It seems some of this information was extracted from the Egyptian medicine. Hippocrates indicated 236 plant species used as cure means in the Ancient Greek medicine.

The first medicinal encyclopedia or cure encyclopedia belongs to Avlu Cornelu Celsuya (the end of the 1st Millennium B.C.). Azii Dioscorid – a physician of the Roman Army presented a list of about 500 medicinal plants in the half of the 1st Millennium A.D. that were known and widely used at that time. This book played a role not only for botanists but at the same time for pharmacologists as a specific source.

A well-known physician and pharmacologist Claudius Galen came from the Ancient Rome (129-201-s A.D.) greatly served in new medicinal plants' study. He wrote about 200 works in the field of medicine as a founder of science of the Technology for

Medicinal Forms. Two works of them belong to Botany which is of an important significance and plays a great role in medicine. C.Galen's works were repeatedly translated into Arabian, Syrian, Persian and The Ancient Jewish languages. He was the first who initiated obtaining of preparations, ointments and extractions from the raw material of plants. Today these medicinal preparations called "Galen preparations" hasn't lost their significance in medicine yet.

During the Arabians Rule the works created in medical and pharmacological fields a great son of the Tadjik people, physician and pharmacologist – Abu-Ali ibn-Sina (known as Avicenna in Europe) won glory in all over the world. The mankind noted 1000-th Anniversary of the great representative of the Arabic school of medicine – Avicenna in 1980. His collection of "The Canon of the Medicinal Science" consisted of 5 Volumes was repeatedly translated into many languages of the world and became a Guidebook of Arabian and European scientists in the Medieval Centuries. Avicenna presented wide information about 900 medicinal plants in his books.

First Arabians made an independent form of Pharmacology as science and established schools providing qualification on this field.

A pharmacopoeia book titled as "Garabeddin Kabir" was written as well as several theoretical and practical activities were implemented related to use and study of the medicinal plants. In the subsequent periods – IV Millennium a Latin man – botany compiler by the name Arileem appeared.

A graduate of the ancient Chinese school Li-Shi-Chjeniya (1522-1596) in the book of "Bases of Pharmacognosy" gave detailed information about the character of many cure means.

Physicians of the Ancient India have cured many diseases by means of medicines of plant sources along with blood-letting. Also the plants grown in India (especially food plants) were carried to Roman Empire. Many of these plants including giant

fennel (*Ferula* L.) were accessed into the European medicinal practice. If the medicinal plants would be considered from the medical point of view one can say “we live in the world of plant” as it’s said in the ancient Buddha medical secrets.

In IX-X Centuries Dioskorid, Galen and Arileem’s works about Botany were first translated into European languages as: Italian, French, English and German. However the original works about The European Botany appeared very lately – in XV-XVI Centuries. This information has been partly extracted from Latin and Greek botanists.

Russian monarchs also have already started dealing with study of the medicinal plants and their use on the cure purposes in XI Millennium. In the early years of the XVII Millennium an enterprise named “Aptekarski prikaz” (The druggist’s order) was founded in Kremlin of Moscow that managed medicinal and drugstore activities all around Russia. In the early years of the XVIII Millennium a well-known druggist Messerschmitt is sent to Siberia on the purpose of study medicinal plants more deeply and thoroughly.

In the XIX Millennium the most comprehensive information on use of the medicinal plants was ascertained by the researcher George Everson investigating Egypt when studying cigarette. The researcher collected separate parts of the book “Drug preparation for all parts of the organism” into one. There are lots of receipts here used by the ancient Egyptians for cure of many diseases. They consist of a compound structure of different ointments and mixtures. Oils, balsams and resins with aroma were widely spread in this period. But cure significance of the plants as: aloe (*Aloe Torun*), plantain (*Plantago* L.), castor-bean (*Ricinus communis*) was known.

In the late XIX Millennium a well-known botanist of Siberia P.N. Krylov issues a collection book presenting comprehensive information on aboriginal medicinal plants of Siberia and Altay. About 180 different medicinal plants were collected these years.

Even 850 years ago the names of many medicinal plants and their use instruction were shown in the works of the great Azerbaijan poets and philosophers Nizami Ganjevi and Muhammad Fizuli. Curative significance of mummy (at body injure), saffron (*Crocus*) at (fever), cucurbit (*Cucurbita*) (at worms and diarrhea), mint (*Mentha*) (at gastrointestinal disease) was indicated in the well-known "Khamsa" (five great poems). the great Azerbaijan poet and philosopher Muhammad Fizuli who lived in the XVI Millennium gave extended information in his works "Səhhət və mərz" (Health and Diseases) and "Söhbətül əsmar" (Dispute of Fruits). Curative significance and harmful effects of fruits is said in the work of "Söhbətül əsmar" (Dispute of Fruits).

A rich flora and vegetation cover has been formed in the territory of Azerbaijan. More than 4500 high sporous, bear-seeded and flowered plant species in this ancient Country that majority of them are useful and widely used pants in different fields of the national economy. About 1500 medicinal plants researched and being researched in the Azerbaijan Republic are being studied in a complex by botanists, pharmacognosts, pharmacologists and clinists and an opportunity for their use on medicinal purposes is being created at present. For example: oleander (*Nerium* L.), valerian (*Valeriana* L.), barberry (*Berberis* L.), horse-tail (*Equisetum* L.), marjoram (*Origanum majorana*), pot-marigold (*Calendula* L.), orchis (*Orchis* L.), hawthorn (*Crataegus* L.), dog-rose (*Rosa canina*) et al.

About 3000 plant species have spread in the territory of the Nakhichevan Autonomous Republic which is an integral part of Azerbaijan. 722 sp.of them are curative medicinal plants. Resource of raw material of the curative medicinal plants is not inexhaustible and infinite. As a result of anthropogenic factors the natural resources of the valuable medicinal plant species are being continuously exhausted which causes threat of their lose. They should be protected and properly kept rules of their

sustainable use. Just that is why the Ordubad National Park named after Hasan A.Aliyev, The Shahbus State Natural Reservation, Lengthways-Araz Reservation, Gek-Gel National Park in Small Caucasus, Eldar Shamy (*Pinus eldarica*) Reserve, Ag-Gel Reserve, Hirkan National Park in Talysh, Zagatala Reserve in the Great Caucasus and tens of other parks, reserves and reservations have been established to protect the nature of the Autonomous Republic. A sustainable use of the medicinal plants is required to transfer them to the future generation.

At present some books of medicinal plants in comparison with the ancient books lag behind. We consider specialists dealing with medicinal plants should:

- be enriched from the archives;
- study the structure of the plants used at making of medicinal preparations;
- new books should be published in integration of their personal investigations.

We can transfer our world values to the future generations through this way only.

Republic of Azerbaijan – is the biggest country in the Caucasus Region of Eurasia. It is situated in Caucasus – in the basin of the Caspian Sea that is on the crossing of Europe and Central Asia. Its area is 86.600 km² (11,5% – forests, 1,6% – water basins, 50% – cultivated lands, including: 27% pastures, 36,9% the other/miscellaneous lands). The nature of Azerbaijan differs with its specific and original varieties, so rich flora and a harmonious vegetation cover is formed in the area. There are about 1.000 genera contained all plant groupings, about 5.000 plant species with higher spore, naked and covered seeds, flowers belonged to 200 families, in this ancient Country that are nearly 70% of the Caucasus flora; 5% (370 species) of them are regional endemic and rare plants [Achundov, 1972; Hacıyev and Musayev, 1996; Musayev, 2005; Asgerov, 2005-2011]. Azerbaijan flora is rich with its semi-genera of the 3-rd era for ex: ironwood (*Parrotia*

persica), acacia (*Acacia lencoranica*), oak (*Quercus sp.*), Caucasian persimmon (*Diospyros lotus caucasica*) et al. All of these are mainly met in Talysh Zone.

The solvable role in flora biodiversity belong to perennial grasses (66,4%), on the 2nd place annual ephemera and ephemeroids (23,4%), the rest are other plants. The Azerbaijan flora is also differed with its 435 species of rich tree and bush plants.

These plants have formed a special plant cover as well as almost all areal types of Caucasus Region as: ancient, forest, desert, semi-desert, caucasus, boreal, steppe, xerophyl, adventive et al can be met [Hajiyev, 2004].

One can consider the Azerbaijan flora like a source of medicinal, essential oils and generally row material rich of bioactive substances. To render effective medical aid by using vegetation cover of Azerbaijan, update treatment-and-prophylactic medical products preparation and use is the most actual question of present-day.

However modern understanding of scientific research of medicinal and aromatic plants in Azerbaijan has been commenced since the 20th of the last century. I.Y.Hajiyev [1938], Isayev Y.M., [1940], A.A.Grossheyim [1948], I.I.Karyagin [flora Azerbaijan 1950-61], F.Y.Gasimov [1968], L.I.Prilipko [1970], I.A.Damirov [1974; Damirov et al, 1988], N.M.Ismayilov [1975], E.R.Ahmedova [Ahmedova et al, 1982; 1984; 1993], A.A.Fyodorov [1979], Qasimov M.A. [1992], Qadimov Sh. [1997], Aliyev N. [1998] who remained special scientific contribution for the development of Botany in our Country and present collaborators of the Institute of Botany of the Azerbaijan National Academy of Sciences: M.A.Kasumov (1968-2011); S.V.Serkerov (1975-2011), E.N.Novruzov (1978-2011), S.J.Ibadullayeva (1984-2011), F.A.Rasulov (1987-2011), A.N.Aleskerova (1988-2011), N.P.Mehdiyeva (1989-2011), S.A.Zeynalova (1991-2011), S.J.Mustafayeva (1992-2011), L.Kh.Mustafayeva (1992-2011), G.Sh.Shiraliyeva (2004-2011), N.V.Movsu-

mová (2007-2011) and many other doctorants carried out research works on medicinal and aromatic plants of our flora. For many years our specialists have periodically made expeditions to regions of our Republic; chemical structure and pharmaceutical properties of the collected plant species have been studied, several preparations made as well as valuable results were achieved. 800 species of medicinal, 850 species of essential oil plants have been collected and defined during the initial inventory of our flora. At present as a result of the research works carried out by the Azerbaijan scientists more than 1545 medicinal plants (including 315 species of alkaloid, 150 species of coumarine, and 1000 species of essential oil) represented 178 families and 740 genera have been ascertained in the Country. About 400 of them were tested in medicine and economical significance of 55 species of them were defined. More than 100 new sources of valuable medicinal substances as: alkaloid, coumarine, aromatic, terpene compounds, sesquiterpene lactones and leucorin, sabinene, ephedrine, mellicetin, berberine, tauremizine, santonine, sesquiterpene, radiotinine, radiotinol, plum-bagin, safranal and cochloselin were ascertained [Гурвич, 1948, Растительное сырье Азербайджана..., 1971; Лекарственные растения Азербайджана..., 1972; Mustafayeva, 1984; Mamedova, 1987; Ibadullayeva, 1994; 2000; Ibadullayeva and Serkerov, 2001; Serkerov, 2005; Mehdiyeva, 2006; 2008; Kasumov, 2006; Ibadullayeva and Jaffarli, 2007; Zeynalova et al, 2007; Muradov et al, 2008; Gasymov et al, 2009]. The obtained substances and medicinal preparations have been patented. Biochemical researches have been directed towards change, interrelations of effecting substances' acquisition in the medicinal plants (alkaloids, coumarine, saponine, essential oils et al), mutual selection of essential oil plants depending on the environmental effects and exchange of substances. The most valuable and comprehensively studying essential oil plants spread in different areas of Azerbaijan as: *Nepeta* L. [Mamedova and

Ibadullayeva 2011], *Thymus* L. [Kasumov, 2006], *Ziziphora* L., *Artemisia* L. [Serkerov and Aleskerova, 2006], *Ligustrum* L., *Achillea* L. [Mustafayeva, 1989] and representatives of the *Apiaceae* L. family – *Grammosciadium* DC., *Heracleum* L., *Cuminum cyminum*, *Chaerophyllum* L., *Carum carvi* L. and *Coriandrum* L. species [Ibadullayeva, 1999; 2001; 2004].

According to the systematic classification the majority of the plants accessed into the Azerbaijan medicinal flora are of *Magnoliophyta* Department (1461 species – 94,6%) and plants in a very few number are of *Polypodiophyta* & *Lychenoptya* Department (each have got 26 species – 1,7%), *Pinophyta* Department (18 species – 1,2%), *Equisetophyta* Department (6 species – 0,4%), *Gnetophyta* Department (3 species – 0,2%), *Bryophyta* & *Lycopodiophyta* Department (each have got 2 species – 0,13%) and *Ginkophyta* Department (1 species – 0,06%).

More species in *Magnoliopsida* Class – *Asteraceae* Dumort. (160 species), *Fabaceae* Lindl. (102 species), *Lamiaceae* Lindl. (97 species), *Rosaceae* Juss. (82 species); of the Families: *Apiaceae* Lindl. (72 species), and *Brassicaceae* Burnett; and the next are of: *Rumunculaceae* Juss. (46 species), *Caryophyllaceae* Juss. (39 species), *Chenopodiaceae* Vent. (38 species), *Scrophulariaceae* Juss. (31 species), *Polygonaceae* Juss. (30 species), *Boraginaceae* Juss. (30 species), *Euphorbiaceae* Juss. (25 species), *Malvaceae* Juss. (24 species), *Solanaceae* Juss. (19 species) and *Rubiaceae* Juss. (17 species). Medicinal plants of these families are more widely spread in the forest and meadow cenozes.

Leading families of the *Liliopsida* Class – *Poaceae* Barnhart (47 species) and *Orchidaceae* Juss. (28 species), as well as the followings are: *Cyperaceae* Juss. (19 species), *Liliaceae* Juss. (15 species), *Alliaceae* J. Agardh (12 species), *Hyacinthaceae* Batsch and *Juncaceae* Juss. (each have got 11 species), *Iridaceae* Juss. (8 species) and *Amaryllidaceae* J. St.-Hil (7 species) families.

The indicate families and medicinal species included into these families are in the leading place of the floristic spectrum of Azerbaijan in whole. Genera richer with medicinal plants from the taxonomic point of view are: *Potentilla* L., *Rumex* L., *Orchis* L., *Euphorbia* L., *Salvia* L., *Centaurea* L., *Viola* L., *Galium* L., *Stachys* L., *Erisimum* L., *Allium* L., *Artemisia* L., and *Chenopodium* L..

According to their life mode of medicinal plant species spread in the Azerbaijan flora are specified as follows: 122 species tree, 115 species bushes, 13 species semi-bush, 11 species small bush, 22 species Semi-small-bush, 11 species bush-liana, 1 species - liana, 750 species perennial, 85 species biennial, 350 species annual grass plant, at the same time 26 species Lichen, 2 species *Muscus* moss, 1 species plaun, 26 species *Dryopteris* Adans. fern and 6 species *Equisetum* L. horse-tail.

Geographical relief of Azerbaijan is of factors effecting enough onto the medicinal plants' areal. 940 species of the medicinal plants have been spread as follows: middle-mountainous, 870 species – low-mountainous, 800 species– desert and foothills, 4003 species– high-mountainous, 250 species– subalpine and 75 species alpine mountainous belts. They are mainly met in the vegetation types as: weed, forest-bush, mountainous-meadow, as well as mountainous-xerophytes, forest, rocky-stony, mountainous-grayish, arid-grayish, savannah, watery-marshy, psammophyte-literal and meadow.

According to the share of medicinal plants per each botanical & geographical region of Azerbaijan – Guba Tract of the Great Caucasus (600 species) and mountainous part of Nakhichevan (600 species) are richer than the rest regions. Northern and Central Regions of the Small Caucasus have been presented with medicinal plants correspondingly 460 species and 450 species, Eastern and Western Regions of the Great Caucasus – correspondingly 400 species and 395 species, mountainous part of Lenkoran – 356 species, Southern Regions of the Small Cauca-

sus – 300 species, Kür-Araz (Kura-Araks – Russian pronunciation) and Lenkoran Lowlands – correspondingly 340-350 species, 320 species, Kür and Nakhichevan Plains – correspondingly 450 species and 250 species, Steppe Plateau 250-260 species, Gobustan 250 species, Diabar 150 species, Absheron 200 species, Samur-Shabran Lowland 220-230 species, Alazan-Ayrichai Valley 150 species, Mughan Zone of Lenkoran 50-60 species.

Medicinal plants of our flora are classified as follows: 900 species are flavanoids, 600 alkaloids, 500 species are vitamin C, 450 species are fat and 470 species are essential oils, 450 species are tanning agents, 320 species are saponines, 300 species are coumarins, 280 species are steroids, 250 species are anticians, 230 species are organic acids, 225 species are carotinoids, 210 species are triterpenoids, 200 species are carotins, 140 species are glycosides, 110 species are gum and about 100 species are rich with other bioactive substances.

135 species of the medicinal plants in whole are officinal species accessed into the Pharmacopoeia [Государственная фармакопoeия СССР, 1987; 1989]. At the same time these plants are medicinal plants used at: 1400 species folk medicine, 220 species scientific and 160 species practical medicine, 800 species experiments, 150 species clinical tests, 200 species Tibet medicine, each per 100 species Chinese and Indian medicines, 500 species Medieval medicine of Azerbaijan, 220 species pharmacology, 300 species veterinary.

According to their therapeutic peculiarities classification of effects among the medicinal plants of Azerbaijan are as follows: 360 species– antibacterial, 136 species– analgesic, 140 species– jaundice, 125 species– anti-neoformation, each 120 species – sedative and tonus-raising, 320 species– wound-curative, 255 species– softening, 250 species– anti-inflammatory, 200 species – antihelminth, 440 species – diuretic, 200 species – contractive, 170 species – haemostatic, 160 species – expectorate, each 140

species – fever reducer and hypotensive, each 115 species – temperature-settler and preventing blood, 115 species – antiseptic, 90 species – protosticid and 100-130 species – antivirus. There are 170 species among medicinal plants that are poisonous. Majority of the plants integrate several features of these ones within themselves.

Diversity of diseases cured by the medicinal plants as well as medicinal plants used for cure also is wide enough. These plants are used in: 215 species – cordial, 380 species – skin, 230 species – festering wounds, 215 species – digestive, 200 species – bronchitis and bronchial asthma, 200 species – liver, 180 species – women diseases, 170 species – lungs tuberculoses, 160 species – haemorrhoids, each 150 species – kidney and podagra, 125 species – keen respirator infections, 120 species – eyes, 115 species – throat, 85 species – gall bladder, each 80-90 species – neurotic and diabetic, 400 species – stomach, 270 species – rheumatism, 25 species – allergic diseases and 95 species – burns.

Resources of the following plants as: 4.000ton liquorice, 50-60 ton *Astragalus* L., 12 ton *Berberis* L. barberry root, 27ton haw and 3,5 ton haw-thorn flower, 400ton sea-buckthorn fruit, 30 ton *elecampane* inula, 14ton *Heracleum*, 136 ton *Hypericum perforatum* L., 7ton *Rhamnus* L.-buckthorn fruit, 6 ton *Tilia* lime, linden, 23 ton *Rubia tinctorum-madder*, 54 ton sumach, 500 ton hips, 8,3 ton *Helichrysum* Mill., 10 ton *Achillea* L. and other valuable plants have been ascertained as well maps of their spreading areals were compiled in the Republic.

On the result of the biological and ecological researches possibility of 350 species of aromatic plants introduction was realized. *Crocus* sp, *Grindelia* sp, *Geranium* sp, *Rosa* sp of the cultivated species and chemical content of the essential oils of acacia, *Heracleum* sp and *Ligustrum* sp, their aromatic properties et al beeng researched they were recommended for production [Ibadullayeva, 2001; 2004]. Productive species of Rose (Ga-

zanlig, Girmizi, Krim, Raduga) have been planted for 10-s of hectares in the Zagatala Essential Oil Plant Cultivating Farms; much economic profit was gained of them through obtaining valuable essential oils in the period of the former Soviet Union. Unfortunately activities of the Zagatala Plant for Essential Oil Production have been stopped for more than 20 years.

Essential oils are a compound of natural substances that have been especially used on scientific and commercial purposes in many production enterprises for many years. They are mainly on cosmetic, medicinal, food production, aromatherapeutic and phytotherapeutic purposes. Essential oils of: eucalyptus, lavender, *Carium carvi* L., *Cuminum* L., *Heracleum* L., *Mentha* et al are the strongest and effective antifu means. Recently cancer disease has begun to be cured by means of the essential oils of Thyme, rozmarin and *Salvia sp* [Suzan, 2004]. Even during The 1st War physisians cured gangrena, tuberclosis and other diseases by means of essential oils when there was a deficite of medicaments. Essential oils of vegetables as: garlic, onion and *Juniperus* L. dissolve gallstones and urinary calculus, at the same time essential oil of *Juniperus* strenghtens memory by affecting onto human hormones. Essential oil obtained of: pine, lemon, *Saturea*, coreandr, incense and redwood nearly creates an iron barrier between the human body and his spirit, releases tiredness, stops exciteness, strengthens clear consuecness as well as refreshes and rebuilds memory. Essential oil is also widely used in culinary. Essential oils occupy the 1st place in the production of cosmetic means and perfumery. As essential oils have got a wide range of applying they became a field of interest of many scientists recently and chemical content of these oils began to be investigated as well as bioactive substances of their content caused a big interest.

Specific roles of essential oils have been identified in the plant chemistry, so these oils being accumulated in special canals are saving a complex of several bioactive substances inside them.

They also positively affect onto the plant resistance and save them from several stress factors. Hormones necessary for plants are much more concentrated in the essential oils. These valuable oils can be obtained from plants' flower, fruit, crust/peel, leaf, seed and wood. Essential oils are volatile oily substances that provide plants with specific aroma. They contain of oils 0,01 to 10% essential oils. Melting temperature of the essential oils changes between 160-240°C. Each plant has got its certain qualitative and quantity content. Content of their components can be consisting of up to 300 substances. Natural essential oils are a compound of bioactive substances and main content consists of phenols and terpene compounds. At the same time essential oils positively effect onto the plans' resistance and save them from several stress factors.

Today obtaining and evaluation of medicinal plants and their essential oils' pure and especially main substances is very significant from the both scientific and economical point of view. The results achieved by the Azerbaijan scientists prove that antimicrobial, antiviral, antioxidant antifungal activeness of essential oils of the essential oil plants belonged to the region are valuable to make medicinal preparations of them [Ibadullayeva et al, 2001; 2010, Aghabeyli, 2006; Zeynalova, 2007]. Besides, availability of use of pharmacological peculiarities of the essential oils in medical, cosmetic and other fields through their study was defined by us.

Essential oils obtained of the following species as: *Thymus*, *Saturea*, *Ziziphora*, *Cuminum*, *Chaerophyllum*, *Heracleum* have been tested in the production of various sosage articles, new alcohol free drinks, confectionary, canned and marinade as fragrant means in both single and composition state and some of them were patented.

There is a big resource of many plants with tanning property of medicinal significance in Azerbaijan that gives opportunity of use in both medicine and leather production. *Rheum* L., *Limo-*

nium Mill. sea lavender and other plant extractions have been recommended in production and the extraction obtained of pomegranate peel is used in industry, at the same time tanning properties of these plants are applied in pharmaceuticals [Ibadullayeva et al, 2008]. Wastes of *Alcea*, *Tagetes*, *Opuntia*, *Berberis*, *Sambucus*, *Rhamnu*, *Hypericum*, *Peganum* and also vegetable as: (tomato, eggplant, beet et al) processing are applied in carpet manufacture as colouring means. Extractions obtained of many cultivated dye plants as: (false safron, safron, henna, basma (a hair dye) et al) have been set into production. Safron is the most valuable medicinal and essential oil plant of colouring plants. It has got 3 species as a wild form in the Azerbaijan flora as well as its *Crocus sativus* being in the culture is widely used as a medicinal plant. Azerbaijan scientists have arranged its cultivation by creating new clones of its bulbs on the propagation purposes.

It becomes clear from all of the above-said so Azerbaijan flora is not rich with its medicinal and aromatic plants (MAP) only but it is also rich with the plants that accumulate lots of other useful properties within their content.

50% of the sold plants in the world market are food plants, 25% are cosmetic and 25% plants are of medicinal purposes. According to the statistic data (2005) 1000 plant species of 9000 spread in the neighbour country Turkey are medicinal and about 1000 plants are aromatic ones; the country gains a profit of approximately \$US 60-70 mln due to its export. Though about 1000 plant species of a bit more than 4700 spread in the Azerbaijan flora are aromatic, id est essential oil plants, more than 1445 are medicinal plants [Mehdyeva, 2008] the Azerbaijan Country can not achieve any profit of it on export purposes. It's possible bringing much income to the Country in the case of these plants use within the Country and on export purposes. From the other hand to use the essential oils on cure purposes thanked to foundation of 'Aromatherapy' clinics, change of food

additives by essential oils production of pure and organic products (for ex.: aromatizations of teas, canned making and conservation, perfumery, and cosmetic means production et al) and their use would change our Country into a modeller and modern one as well as a contact of the science with the production be created.

Several scientific researches have been carried out in this field. Almost synthetic means are more used in aromatization of the imported food products or the food products processed in the Republic of Azerebaijan. In order to prevent it a little essential oils of some plants have been obtained and first of all they were tested in aromatization of tea (because of the confidentiality of production data names of plants are not called); only 30gr essential oil was enough for aromatization of 1 ton tea. It is notable that natural essential oils are already being used in tea production in the Republic of Azerbaijan. According to the calculations the import of the synthetic aromatic means into the Republic is twice more expensive than the natural essential oil obtaining.

MEDICINAL PLANTS MOSTLY USED IN THE AZERBAIJAN FLORA ARE THE FOLLOWINGS

***DRYOPTERIS FILIX-MAS* (L.) SCHOTT.** Its roots are used in medicinal purposes which has got poisonous effect. There are nitrogen-free poisonous substances in the content of the roots that are floroglucine and oily acids. Filicales (*Dryopteris filix-mas*) juice cures wounds and ulcers. If the root of a male filicales brewing then adding into a bath it would help very much for reumatism pains and paralich of leg muscles. Even, sleeping in a bed of freshly collected fenugreek leaves is very useful.

***EQUISETUM ARVENSE* L.** Its green coloured fruitless stalks collected during whole summer period are used on the medical

purposes. Horsetail has mainly got diuretic and blood preventing effects. Besides, its fluid extraction is used in diuretic edemas (related to violation of blood circulation), bladder inflammation, pleuritis with broad diuretic exudate, dysentery, rheumatism, ulcers of mouth and pharynx, lung tuberculosis, lead poisoning, diarrhea.

***PINUS SILVESTRIS* L.** There are resins, essential oil, vitamin C, bitter substance called 'pinipicrin', phytoncids, as well as antocyanins in the content of its prickly/needle and peel. In medicine its leaf-buds are used against cough, pharyngitis; it is the most effective curative plant in some dermatic diseases, psoriasis, intertrigo, herpes, against cardiac defects happening at children by the way of having a bath with fluid extraction prepared of its leaves. Moreover, it is also characterised with its bacteriocide effect onto skin irritations in cure of wounds and diuretic effect.

***JUNIPERUS COMMUNIS* L.** Its fruits are used on medicinal purposes. There are followings in its content: essential oil, pinene, camphor (camphen), sabinene, cadinen, borneol, sugar, resin and pectic substances, camphor, mineral salts, yellow amorphous substance juniperin, vinegar, antacid and apple acid. In scientific medicine and folk medicine it is used being in the content of different mixtures as diuretic, against cough, gall-removing, improving digestion brew and decoction. Besides, for its antibacterial effect in rheumatism and neuralgia, it is used in the content of "Vishnevskaya" liniment.

***BETULA PENDULA* ROTH.** In the period of flowering its buds and leaves are used on medicinal purposes. In medicine it is used in boiled and brewed states as diuretic and bile-removing means, hypovitaminosis. Its decoction (1:5 ratio in 90° spirit) is used in cure of wounds, severe and chronic eczemas, rheumatism, scabies, leishmaniasis, during stomach aches, stomach

ulcers, edemas, as vermifuge (ascarides and tape-worm). In spring its fresh juice is used in reumatizm, podagrah, scurvy, edemas.

FAGUS ORIENTALIS LIPSKY. Its woods and nuts are used on medicinal purposes. Its nuts are eatable. Resin is obtained of pistachio wood's distillation. Resien contains vinegar acid and creozite. And the creozite consists of different fenols. There are fat oil, nitrogen substances et al in the content of its peeled nuts. The creozite in the content of the resien has got strong bacteriocide and anti-parazitar effects. It is applied as drugs in catarrah of upper bronchial canals, pneumonia, initial phases of tuberculosis, different derma-diseases.

QUERCUS ROBUR L. They use its peel and sometimes bolls on the medicinal purpose. Its peel is collected from its young green brunches, dried and cut/grinded in the early spring. There are about 20% tinning agents, protein substances, starch, pectine substance, flavanoid-cverstine, levuline et al in the content of an oak rind; and 5-8% tinning agents, starch, protein substances, suger and fat oils in the content of its boll. All parts of an oak-tree have got phytoncide and desinfectant effects. Watery infusion of an oak-tree rind posessing anti-inflammatory, contracting and anti-diharreal effects they are used in the following diseases: stomatitis, gingivites, chronical tonzillites, pharingite, stomach and gut bleeding, complex cure of burn and dermatic diseases; its mixture with glicerine is used in prespiration of hands and feet, diarrhea and stomach colic.

FICUS CARICA L. Its maturated fruits are used on the medicinal purposes. There are sugar, poli-sacharids, phosphatids, fat oil, lecetine, organic acids, B₁, B₂, B₆, PP, C, D, carotine vitamins, macro- and micro-elements (K, Ca, Mg, Fe, Zn, Al et al), sumbucine-chloride and sumbucine-anidinein in the content

of the ficus fruit. *Ficus* (Fig-tree) leaves contain furocumarines, essential oil, resin substances, organic acids – apple acid and lemon acid and other acids, rutine and vitamin C. Fig is used in heart-vascular diseases, anemia, also in weakness as strengthening means, in catarrhal diseases as decoction; it is also used in dry cough, sore throat, bronchial asthma as an expectorant; kidney diseases as a diuretic; in diarrhea, dysentery; to prevent vomiting; as an analgesic, vermifuge as well as in cure of skin wounds.

MORUS ALBA L. Its matured fruits, leaves, rind of its trunk and barks of its root are used on medicinal purposes. Leaves of white mulberry (*Morus alba*) contain organic substances, vitamin C, sugar substances, tanning agents et al; its fruits contain of sugar, organic acids, pectine substances, vitamins C, B₁, different amino-acids, flavonoids, essential oils sign, carotin; and its seeds contain 24-35% fat oil. In folk medicine infusion made of the leaves of white mulberry, its fresh fruits and boiled condensed juices (called in Azerbaijani language or [behmez]) are used at diseases of heart-vascular system, anaemia, scarlatina, itch, ulcer diseases of stomach and duodenum, angina (as rinsing); bath of its fruits is used in reumatism. Watery infusion made of its root's bark is used as vermifuge; watery infusion made of its leaves is used in catarrhal as anti-fever, in epilepsy; lymment made of its leaves and bark is used in scab disease.

URTICA DIOICA L. It grows and spreads in every part of Azerbaijan – from lower mountainous belt till the highest one, on sites with garbage dumps, in pastures, in orchards and gardens. Its leaves are used on the medicinal purposes. The leaves contain vitamins C, K₁, B₂, pantoten, ant acids, tanning and protein substances, phytosteron, ferrum salts. It is used in scientific medicine at bleeding of: kidneys, gats, lungs; as an activator of heart-vascular system and respiratory system. It is used in hypo-

vitaminosis, bleeding and difficult curing ulcers at children. Its infusion is used as anti-cough, worm-deducing and for reducing amount of sugar in the blood. Also when washing hair by nettle (*Urtica* L.) infusion it strengthens the hair roots.

***RHEUM RIBES* L.** The 3-4-year plants roots and rootstocks are used on medicinal purposes in summer months. It contains antraglycozide, tanoglycozide, gluco-reum-emodine, reochrizine, and tanning agents. There are Vitamin C, rutine, organic acids and much calium salts in its leavs and flowers. Powder of rhubarb (*Rheum* L.) is used in medicine: in big dose as a weak purgative, and in little doses for increasing appetite and as a contracting medicine, in dermo-diseases, as gall releasing means and in meteorizm. *Rheum* L. is used as: root powder, dry extraction, watery infusion, syrop and drug.

***RUMEX CONFERTUS* WILLD.** Its leavs are collected in the blossom perod, in the fruit maturation period and its rootstocks are collected in autumn. Rootstocks contain organic acids (tanning agents, pirogal, dock *Rumex* L.), vitamin K, essential oils, a few amount of ferrum, antraglucozides, chrizophanol and emodyne posessing bacteriocide effects. Its leavs and trunk contain flavanoids, in a big amount of Vitamin C and organic acids. Powder, watery infusion, boiled and fluid extraction made of its rootstock and fruits are used in gastric and intestinal diseases, dispepcias, enterocolits, diorrhea, dysentery et al, appetite increasing, anemia, at gut clearance on the result of poisoning, in the case of crack existence in the lower part of a thick gut – anus, at anacide gastrit, ulcer stomotids, gingivits. (*Rumex Confertus*) in big doses have got a purgative effect, and in little doses an effect to prevent diarrhea and gall releaseing effect. As the purgative effect occures only after 8-12 hours it should be drank in the evening.

BERBERIS VULGARIS L. There is berberine alkaloid in all parts of barberry (*Berberis* L.) besides its matured fruits. It also contains occiakantine, tanning agents, resin, vitamin C, organic acids, sugar, pectine substances, carotinoids, and the most significant is berberin. In scientific medicine it is used as watery infusion, tincture and spirit extraction at inner bleedings, inflammation of bladder and liver, gall bladder diseases, cure of leishmaniasis, scurvy, rachitis, anaemia, malaria, reumatism, gastric and intestinal diseases, jaundice, sacchar diabete, quinsy, cough and anti-inflammation at eye diseases.

CHELIDONIUM MAJUS L. Its trunks with leaves, flowers, buds and matured fruits are used on medicinal purposes. It contains chelidonine (hemi-chelidonine), chelerythrin, oxichelidonone alkaloids, also essential oils, vitamin C, amine acid, lemon acid and amber acid. Burning and astringent brown milk of *Chelidonium* L.celandine is used in the folk medicine to cure warts, wounds, ulcers; its juice is used at jaundice, as diuretic, analgesic, at dermo-diseases, tuberculosis of skin, cancer of skin, liver and gall diseases.

RIBES NIGRUM. Its berries and leaves are used on medicinal purposes. The berries are usually collected when they are completely matured. Before they use it the berries are placed into special drying rooms and dried at 50-60°C. The berries of *Ribes nigrum* L. black currant contain about 300 mg/% vitamin C, sugar, pectine substance, phosphoric acid, essential oil, tanning agent, vitamins P, B, carotin, potassium salts, phosphoric and ferrum salts. There are phytoncides and 250 mg/% vitamin C. Currant is eaten as fresh berry, jam and paste. It is used at avitaminosis, kidney diseases as diuretic, inflammation as a sweat bearer, gastritis, cholecystitis, enterocolitis, at intestinal diseases cure, anaemia, for appetite increase, anti-reumatism, at infectious diseases, to increase a tone at heart-vascular system, at diseases

of the upper respiratory ways in medicine. Watery infusion of its leaves is used at dermo-diseases, at releasing oxalate and uric acids out of organism.

***ROSA CANINA* L.** On the medical purposes its fruits are collected when they are completely matured. The fruits contain glucosides with flavanoids, tanning substances, colouring substances, nitrogenic substances, protein substances, sugar, pectine, essential oil, organic acids, Vitamin K, Vitamin C and mineral salts. As its fruits contain especially natural vitamins its oil is used at the following diseases: avitaminosis, scurvy, anaemia, haemorrhagic diathesis cure at children, after a serious illness to increase body resistance against infections, as a gall releaser at bilious canal diseases, at cholecistitis, hepatitis and other diseases of liver, as a diuretic at kidney and bladder diseases, at gastric and intestinal diseases, at burns and wounds cure.

***SORBUS CAUCASIGENA* KOM.** Its fruits are used on the medical purposes. The fruits contain glucose, fructose, saccharose, apple acid, lemon acid and vinegar acid, carotene, vitamins C and P, bitter substances and tanning agents, flavonoids, catechins et al. Juice and infusion of its fresh fruits and its dry fruits broth are used at gastric and intestinal diseases, mainly at dysentery, as a diuretic, at sacchar diabetic, as a purgative, as a blood restoration means, sweat releasing and at avitaminosis.

***RUBUS IDAEUS* L.** Its fruits and leaves are used on the medical purposes. Its fruits contain essential oil, apple acid, lemon acid, salicylic acid, caproic acid, 8% sugar, secretion, vitamins C, B, P, carotene, dye substance, potassium salt, copper salt, pectine, nitrogenic substances, tanning substances and anthocyanins. Infusion of its dry fruits, gain and jam are used at inflammation and fever especially to get children sweat. Besides, as an expectorant at bronchitis, as blood restorer at bleeding, anti-vomiting, to

increase appetite, as well as slightly diuretic. Raspberry juice is usually added into childrens preparations in pharmacological practice to make better tastes of mixtures.

CRATAEGUS PENTAGYNA WALDST ET KIT. Its fruits and flowers are used on the medical purposes. Fruits and flowers of *Crataegus* hawthorn contain about 10 flavonoids, saponins, lemon acid, coffeic acid, chlorogenic acid, tanning agents, vitamin C; its seeds contain amigdaline glucozide, choline and fat oil. Besides, sugar and protein substances, carotene, essential oils and sorbit. Hawthorn is used in scientific and folk medicines. Hawthorn reduces excitation of cardial muscls, strengthens its conraction, improves blood circulation of brain and heart, prevents arhythmia and tachicordia and liqudates feelings of heaviness on the heart area. It is also used at hypertircosis as a soothing means of the central nervous system. Inside reception is appointed as an extraction, infusion, drops or within the mixtures. Besides, jam and kissel are made of its fruits (through boiling).

GLYCYRRHIZA GLABRA L. Its roots and rootstock are used on medical purposes. Its roots contain kalium and calcium salts of the glycoside-shaped saponine-glicerizin acid, flavonoids, a big amount of sugar, pectine substances, resin, bitter substances, starch, mineral salts, sign of essential oil and asparagin. Powder, condensed watery extraction, dry extraction and sweet syrop of glabra root are usually used. Preparations made of glabra root are widely used as: week purgative, expectorant and anti-cough. It is in the content of breast elixir, diuretic, breast, stomach, purgative assortments. Besides, glicerizine and preparations of glabra root regulate water and salt exchange of an organizm [188, 203]. It greatly effects at stomach ulcer, inflammation processes, Addison disease, whooping cough, pulmonary tuberculosis, dry bronchitis, anti-poison at meet and mushrooms

poisoning, at dermo-diseases 2 % liniment together with antibiotics, at exema, worms and other diseases cure.

PEGANUM HARMALA L. All parts contain alkaloids, harmin, harmalin, harmalol and peganine the most significant of which is harmin. A harmin-hydrochloride preparation is obtained of harmin. It is used in several nervous diseases in medicine including epidemic encephalitis, Parkinsonism et al. Its infusion broths are used in folk medicine at inflammations, malaria, rheumatism, scab. It is used in Iranian folk medicine as uretic, sweat releaser and at stomach diseases.

RHUS CORIARIA L. Its young and tender leaves and fruits are only used in medical purposes. Sumach leaves contain a big amount of a very valuable tanning agent (12,5-21 %), about 20 % of which is tannin substance, apple acid, vinegar acid, flavonoids, vitamin C, gallic acid et al. Its fruits contain tanning agent, flavonoid, essential oil, fat and resin substances, organic acids, vitamins C, K and ash elements. Its leaves are usually collected in the blossom period. Its fruits and leaves are used as tincture, tea infusion and fluid extraction. It is used in scientific and folk medicines at malaria, stomach ache, bloody diarrhea, dysentery, sugar diabetes and to increase appetite.

ZIZYPHUS JUJUBA MILL (ZIZYPHUS SATIVA GARTN.). Its fruits contain sugar, organic acids, tanning agents, vitamin C, carotene, rutin, coumarins, pectic substances; additionally iodine compounds have been ascertained in the content of its not ripened fruits. Its leaves contain alkaloids, glycosides, saponins, tanning agents, resin substances, organic acids, vitamin C, ash elements, flavonoids, coumarin derivatives and 1,7% anesthetic substance. The leaves have got phytonicidal effect. Its root contains 12-15% tanning agents. For the medicinal purposes its fruits, roots and leaves are used. In the scientific and folk medicines its

not ripened fruits are used at cure of tea infusion of its leavs is used at: langs diseases as soothing means, anti-inflammation, anti-cough; and spirit extraction made of its root peel is used as stimulator at physical and intellectual tiredness, as a resistance supporter after a long period sickness.

MALVA SYLVESTRIS L. In medicine only one species is used. It has spread in all regions of Azerbaijan beginning from the low moutainous belt till the middle moutainous belt including moutains, fields, orchards, among bushes and spaces. Its flower and calyxes are used as medicine. Flowers contain secretion, antocian glycozide, malvine, carotine, vitamin C, sugar and dye/colouring substances. Its leavs and flowers are used as infusion, broth and plaster bar. In medicine its flowers infusion is used as anti-cough and at pharingit, receptor diseases, stomach-gut tract diseases and for gargling. Besides, its leavs are externally used as plaster bar in cold and inflammation processes.

ALTHAEA OFFICINALIS L. Its roots are used in medicinal purposes. The root contain: 35% secretion substance, 37% starch, sugar, asparagin acid, pectin substances, detain, about 10% fat oil. Its leavs and flowers contain thick essential oil. Alcea/hollyhock is used at resepiratory diseases as anti-inflammation, softening and expectorant, stomach ulcer, diarrhea, keen gastritis, enterocolitis, stomach gripes, bladder-inflammation, throat rinsing, washing of eyes. Dry, thick, fluid extractions, powder, juice and iflusion are made of alcea/hollyhock root and is added into different additives.

HYPERICUM PERFORATUM L. Its surface part is used in medicinal purposes. It contains: photo-active anthracene derivatives, flavanoids, essential oils, tanning agents, resins, saponins, antocian, seril spirit, alcaloid signs, carotine, nicotin

acid, vitamins C, P, PP, cholin, tocopherol and organic acids. It has got regenerative, anti-inflammation, closing up and contracting effects. It is used at diseases as: stomouch and guts inflammation – gastritis, stomouch and guts ulcers, enterocolit, cholecistit, hepatit, cistit, stomatit, pharingit, tonsillit, angina, reumatizm, tuberclosis, inner bleeding, furuncles, mastitis, abcess, wounds, burns as well as, like diuretic, and vermifuge.

It is spread in all mountainous regions of Azerbaijan. As food additive mainly its upper part and flowers are used. 10-13% tanning agents (in the flowerence phase), 5-6% antocian, 5% flovanoid, 7,5% resin, nicotin and ascorbinic acid, Vitamins P and PP have been found in its content. 0,15% essential oil has been obtained of the plats' flowers collected in Guba Region. A big amount of the people use the plant extraction at digestive, liver and gall canals diseases on the medical purposes. As the essential oil of the plant is antibacterial its use is recommended in canned of easely spoiling products like meat and fish products. For this property it is used under the name "Tiptalbiu preparation" in medicine.

DAUCUS CAROTA L. Its root-crops and seeds are used on medicinal purposes. The root-crops contain a big amount of sugar, a little amount of starch and pectine substances, a lot of lecitin, celluloze, other phosphatids, kalium of mineral salts, possessing a big significance carotine, vitamin group B: piridoxine, nicotine and folic acid, vitamins K, D. Besides, phytoen, phytofluen, flavonoids, antocianids, fat oils, essential oils, coumarine, ash elements (1,03mgr/% ferrum et al), free apple acid, mannit et al. Moreover it is used in fresh state at: avitaminosis of the vitamin A, weakening of sight, atrophic and dystrophic changes of eye epytel, avitaminosis of vitamin group B, toning up, colitis, liver, kidney, heart-vascular system diseases, mineral exchange violations, a weak purgative, diuretic, anaemia, improvement of general resistance of organizm,

digestion improvement, milk secretion increasing means and its mixture with honey or sugar is used at respiratory ways catarrh.

CARUM CARVI L. It is cultivated in Absheron as valuable plant of essential oil. Fruit of *Carium carvi* is used in scientific medicine. Its fruits contain: 3-7% essential oil, carvone, limonen and other components. Besides, there are about 20% fat oil, 22% protein and also flavanoid substances of cure significance. It is used as infusion, powder, fragrant water and essential oil in medicine. It has got effects of appetite increasing, digestive regulating and spasmolytic. It is used at stomach-gut diseases, bronchial respiratory diseases, as diuretic at kidney diseases, at swelling and stomach aches of children.

CORNUS MAS L. Cornel fruit contains: tanning agents, coranine glucoside, bitter and colouring substances, sugar substances, glucose, fructose, pectin substances, organic acids i.e. (lemon, apple, amber et al) and vitamin C. There are tanning agents in its leaves. Its watery infusion is used in folk medicine at diarrhea. Milling the stones of its fruits the powder fry in sunflower oil mix with honey; the obtained preparation is used as anti-diarrhea. Or it is possible widely to use as anti-diarrhea at children by mixing its flower pollen with egg-yellow. Watery distillate obtained of its fruits "Zoğal arığı" (in Azerbaijani) – "Cornel Vodka" at stomach-gut violations, its thick juice called "Zoğal turşusu" (in Azerbaijani) – "Cornel Sour" at digestion improvement, its fresh juice or its dried fruits infusion in cold water is used at malaria as cooling means on an empty stomach. Watery infusion, natural juice, a kind of plaste called "turshu lavash" (in Azerbaijani), of its fruits and leaves are used at diabetes, dysentery, swelling, digestion improvement and strengthening of organism.

MENTHA PIPERITA L. Only leaves of the cultivated ment is useful. Its leaves contain: about 2% essential oil, tanning agent, various organic acids, 65-70% mentol, flavonoids, a lot of carotene, ursol and oleanol acids et al. Menthol and mentol-acetate contained in the leaves of the cultivated mentha was adopted by the National Pharmacopoeia. In medicine menthol leaves are used as infusion, tincture and menthol water. In folk medicine it is used as "nanə cövhəri" (in Azerbaijani) – "menthol essence" in the cases of: stomach diseases, stomach ache occurred at children, swellings, as anesthesia of spasms, increasing appetite, preventing means of eructation, breathlessness, heartburn, vomiting, in the content of gall releasing and calming assortments, as well as in the content of Traskov mixtura against asthma.

It is met in small canals or riverbanks in Azerbaijan. People use it in fresh or dried state. Depending on the ecological condition of *Menta* spread area the quantity structure of the essential oil changes. Essential oils have been collected in the following rate: in Nakhichevan AR, Shahbuz Region, Batabat Massive in the plant collected in water-runs 3,1%, in the plant collected in the Kurekchai bank of Toghana Village of Gek Gyel Region 2,6%, in the plant cultivated in the private plot in Badamdar Settlement 0,3%. Alterations in the quality content of the essential oil also have been observed. Main components of oil are the following substances: mentol – 58,8%, dihydrocarbon – 8%, menton – 6,1%. Acid number is 0,5-5; essence number is – 16,5-21,2; and after acetillation essence number became 105,8-171,3. In 70% spirit (1:2) is dissolved. Essential oil is in yellowish-green colour and smells as mentol.

On the result of several researches carried out on the essential oil of *Mentha* it was realized that it could be used as anticeptic, anesthetic, cooling, sedative, anti-nausea and anti-diarrea. In medicine it is used in cholecistit, hepatit, gall-stone and digestive violations. From another hand *Mentha* has been used as food additives in meat meals since the ancient period. The plant has

got a specifically fine taste. Taking into account all of these Mentha plant and essential oil obtained of it can be widely applied in canned meat products and pastets.

THYMUS TRANSCAUCASICUS RONN. Its surface part is used on medicinal purposes. Thyme contains: essential oil with tymol, flavonoids, bitter substance, tanning agents, resin, fat substances, cuprum combinations in its ash and there are vitamin C in the content of its subserfice yuong parts. In scientific medicine its watery infusion is used as expectorant and anti-cough in the content of mixtures, at cold diseases sweat releasing, whooping cough and bronchitis. The tymol in the content of the essential oil has got a strong anticeptic and bacteriocide effects. In folk medicine watery infusion of thyme is used at: inner meteorism, stomach aches; its mixture with sugar at diarrhea; as digestion improving, diueretic, worms releasing, heart attacks (mainly in teenager period), at insomnia, angina, its plaster bars in muscle and joint pains. Thyme includes into Pertussin which is much more used as anti-cough among children.

ORIGANUM VULGARE L. On medicinal purposes its upper part is used in the period of blossom. It cotains essential oil, carvacrol, independent spirits, tanines, bitter substances, mineral salts, vitam in C, choline, flavonoids, tanning substances, geranilacetat et al. Origanum calms the central nervous system, increases panceras secretion of digestion system as well as bronchial and sweet glands, accelerates peristaltics of guts, renders anesthesia and desodoration effects to them. It is used both as internal and external in the infusion and broth states. In folk medicine it is used at: inflammation of erysipelatous, mouth cavity, larynx, pharyngitis, tooth aches, furuncles, different types of skin eruptions, reumatism, cholecistit, stomach spasm, appetite absence, anti-cough, paralich and epylepsy.

It is met in Azerbaijan around Gyanja of the botanical and geographycal region of Small Caucasus, in GekGyel, Dashkesan, all regions of the Nakhichevan AR, Talysh as well as towards Shamakhi and Guba-Gusar of the Great Caucasus. Only 1 species was spread in Azerbaijan.

People use its top with blossom in fresh and dry states. Amount of vitamin C in the plant is 56mg/%. In the phase of blossoming essential oil was obtained from the fresh mass 0,07-0,2% 1,4-2% and dry mass 0,2-0,7% of its surface part. Essential oil of the plant is a grayish and yellow substance. It is dissoluble (1:7) in the 90% spirit. When increasing amount of essential oils in spirit its colour changes and grows turbid. Essential oil of *Origanum vulgare* L. is plesant-smelled and has got a pritty bitter taste. Acid number is 0,8-1,28; essence number is 7,6; after acetillation essence number became 54,88.

The main components of oil are: timol – about 2,2-6,7%, bis-cyclic sesquiterpens – 12,5%, free spirits – 12,8-15,4%, heranila-cetat – 2,63% and other substances.

According to its antimicrobic property the essential oil obtained of *Origanum* is used in digestive violation and gall canals diseases. *Origanum* is effective in meat meals, in some specieri composition as food additives during “Tushonka” (stewed meet) canned processing.

***SALVIA OFFICINALIS* L.** Its leavs are used on the medicinal purposes. Leaf collection is required in September of the 1-st year vegetation, and the next years 3-4 times in the blossom period. The leavs contain: starch, resin, protein, tanning agents, mineral salts and essential oils. Its infusion is used as contrac-ting, bacteriocide and anti-inflammation at sore throat, mouth cavity and tooth diseases, respiratory catarrhal inflammation. It includes into the assortment used at: breast, throat, stomach and anti-diarrhea. Newly collected leavs have got a bactericide effect.

***SATUREJA HORTENSIS* L.** Its surface part is used on the medicinal purposes. Tannins, secretion substances and paracimol contained essential oils were ascertained in its content. It is investigated for its bacteriocide, anti-meteorism and spasmolitic effects. Besides, it is used at stomach-gut violations, liver and kidney diseases.

***PLANTAGO MAJOR* L.** On the medicinal purposes its leavs, grass, juice made by pressing method and dried leavs. Through drying its juice some powder is obtained; and a granula called "plantaglucide" is prepared of the powder that is used against stomach ulcer. The leavs contain: aucubine glucoside, vitamins A, C, K, sumpheraphen, polysacharides, a little amount of alcoloides, bitter substances and tanning agents of phytoncides, enzymes, kalium salt, lemon acid and carotine. There are a lot of secretion, fat oils, protein substances, planteoza polysacharid in the content of the seeds. The content of which consists of: glucose, fructose, galactose, saponins, tanning agents and olein acid. Its watery infusion and extraction are used at regulation of pancreas secretion, as well as at reduce and increase of gastric juice is appointed. Besides, it is used at: gastric and guts diseases, colitis, stomach ulcer and duodenal ulcer, against cough, enterite; thanked to its bacteriocide effect it is also used at a long time closing up ulcers, wounds, flegmonas, as cough preventing – at wooping cough, gut infections and dysentery. Its fresh leavs are used at wounds, burns, of purulent skin diseases, dislocations, cuts et al.

***RUBIA IBERICA* (FISCH.) C. KOCH.** For the medicine purposes its roots and rootstock are used. The roots and rootstock contain: antraxinon and its derivatives, galyozine, purpurin, psevido-purpurin, ribnadin, lemon acid, apple acid and vinegar acid, sugar, pectine substances, mineral salts, protein and pectine substances. In scientific medicine powder, infusion of its root

and its dry extraction like drugs are used at: gall-stone diseases, bile-stone and kidney diseases. Besides, it makes to melt: oxalat, phosphat and uretat salts, as well as it releases oxalat, phosphat, uretat and other salts out of organism.

SAMBUCUS NIGRA L. On the medicinal purposes its florescence and fruits are used. Its flowers contain: volatile alcoloids-choline, flavonoids, secretion substances, apple acid, vinegar acid and valerian acid, resin substances, thick essential oils, paraphin-like substances, terpene and glucosides possessing sweat releasing effect, rutine, vitamin C; its fruits contain: alcoloids, glucosides, antocian pygments, mineral salts, volatile acids, vitamin C et al. In scientific and folk medicines it is used at: colds as a sweat bearer, respiratory inflammation as a preparation, angina, gum inflammation, pharyngitis, avitaminosis, as a weak purgative preparation for infants, as means anti-malaria, at sacharic diabetis, fevers, scabs and German measles. At stomach gripes of malaria a watery-spirity destillate called “kəndəlaş arəğı” (in Azerbaijani) – “*Sambucus* (elder) vodka” made of its fruits is used. It is used in watery infusion made of its flowers, leaves and fruits. The fresh fruits are used at reumatizm and neuralgia. Use of *Sambucus* (elder) roots infusion is recommended at diabetes, kidney diseases and edemas. Jam is made of its flowers and fruits.

ACHILLEA MILLEFOLIUM L. Its leaves and flowers contain: vitamins K and C, essential oil, inuline, carotine, bitter substance, tanning agent, resin and achillein alcoloid. Besides, it has got bactericide and anti-inflammation properties. Watery infusion or extraction of its grass, flowers and leaves are used at gastritis, digestion improvement, ulcer disease, bloody diarrhea; thanks to its coagulation character it is used at internal bleedings, blood restoring, anesthesia and appetite improving. It is used as drugs, infusion, extraction and herbal assortment.

ARTEMISIA ABSINTHIUM L. Its surface part contain: essential oils (0,5-2%), organic acids (amber, amine, salicile), tanning agents, ascorbic acid, carotene, flavonoids, phytoncids, lactons, cadinen, sabinen, chamazulen, bitter substances (glucoside-anabsintin), protein and starch substances. Medical significance of the species is high, it improves the digestion appetite. It increases secretion of digestive glands by rousing taste receptors in the mouth cavity. Essential oil of *Artemisia absinthium* effects onto the central nervous system as a stimulator as well as it renders regulating and spasmolytic effects onto stomach secretion diaphragm and heart activity. Its essential oils have got bactericide, bacteriostatic, disinfection and anti-parasitic.

TANACETUM VULGARE L. Its floressence and leaves are used for the medicinal purposes. The flower group and leaves contain: flavonoids, oxyflavonine phenolcarbon acids, bitter substance of tanacetine, tanning agent and essential oil. Its flowers and essential oil obtained of them are used at ascariasis (as intestinal worm releasing), at tape-worms (in a powder form) and at giving an enema (infusion (1:10) and extraction forms). Its infusion is successfully used at: enterocolitis, duodenal ulcer and stomach ulcer, diarrhea, fever, sweat releaser, head-aches, joint pains, menstruations passing by bleeding at teenager girls, keen gut diseases, jaundice, liver and gall canals diseases, cure of festering wounds, ulcers, scab on the skin. *Tanacetum vulgare* has got a phytoncide effect.

CICHORIUM INTYBUS L. Its root contains inuline, bitter substance, sugar, resin, organic acids, vitamin C et al. An aromatic substance called cichoreol derived of carbohydrate and proteins contained in the roots when frying its roots through pyrogenetic reaction; the cichoreol contains vinegar acid, valerian acid, acrolein, furfural and furfural spirit. In the

scientific medicine it was ascertained by experimental way that interner reception of watery infusion of chicory pericarp calms the central nervous system, improves heart activity, reduces the rythm of cordial contractions. In folk medicine it is used as watery infusion to improve appetite and digestion, strengthen and stimulation the organism; at dysentery, stomach catharrah, anemia, jaundice, as gall releasing means, at liver, spleen and kidney deseases and diabetis. Besides, in folk medicine a destillate is obtained of chicory roots which is called “kashnı arağı” (in Azerbaijani) – “chicory vodka” that is rubbed on joints at reumatizm. Watery infusion and boiled of the plant’s surface part, root and seeds as well as the “kashnı arağı” destil-late are used at malaria and cold as a temperature reducing, cooling, anti-thirsty and sweat releasing means. They give a bath of its watery infusion to prevent children from sunstroke.

INULA HELENIUM L. There are 13 wild species of it in humid places of the forest zones, Samur-Davachi lowland and up to Great Caucasus Sub-Alpian Belt of Azerbaijan. Only one species of them is used on medicinal purposes. In medicine its roots and rootstocks are used. Its roots and rootstocks contain: about 40% inuline, 1-3% essential oil that is called helenin. It is yellowish crystallic substance. Besides, it contains saponines, proazulene, pseudoinuline and vitamin E. Infusion and boild *Inula* L.elecampane are used at cough, bronchitis, colds, stomach and gut diseases, doudenal ulcer and stomach ulcer. Thanked to the essential oil in the contain of *Inula* L.elecampane it has got anticeptic, anti-inflammation and worm releasing properties.

MATRICARIA CHAMOMILLA L. On the medical purposes its flowers are collected and dried at 40⁰ C temperature in a basket on the places where air can well changed. The flowers contain essential oils, terpene, cadinene, nonilin and isovalerian acids, apigenin, herniarin, cholin, phytosterin, salicil, nicotin,

ascorbin acids, carotene, glicerids of fat acids, secretion, sticky substance and flavonoids. In scientific medicine camomile preparations are internally recieved as a calming means at gut spasm and as an anti-inflammation means; at meteorism, as an anticeptic and anesesthesia at diarrhea cure; and are externally recieved as anticeptic and anti-inflammation means, garglings, baths, enemas/lavages, plaster bars. In folk medicine it is used in the form of tea as calming means, anti-cramp, iuredic, weak purgative and at menstrual volations. As an exterior use it is used for bath at furuncles, eye-washing, festering wounds, reumatisms. Besides, it is recommended to use at bronchial astmah, anti-swelling, gastritis, enterit, exema, hair scurf at teenagers.

HELICHRYSUM PLICATUM DC. Its flowers content essential oils, dye/colouring, tanning agents and bitter substances, carotene, vitamin C, K, ash elements, organic acids (apple acid), resin substances and flavonglucosides. New gallen preparation – flamine obtained of *Helichrysum plicatum* has adopted by the National Pharmacopy and is being applyied in scientific medicine at liver and gall canals' keen and chronical diseases. Besides, it is used at stomach, urinary canals diseases, as a worm releasing means (ascaridoz), as blood-restoring, stomach and gut diseases. As an exterior use its infusion and spirit extraction are used at cure of some dermo-diseases. Tea infusion of the grass, spirit extraction, dry concentrate (flamine) and fluid extraction.

CALENDULA OFFICINALIS L. On the medicinal purposes its anthodium, roots, and leavs of the top of its trunk are used. Anthodium and leavs contain essential oil, calenuline, bitter substances, a yellow-redish substance, phytoncids, salicile and apple acid, saponine, organic substances, secretion, flavonoids, resin substances, glucosides, carotinoids, nitrogen substances, vitamin C et al. It acselerates regeneration and has got a closing up effect. Its raw material is used as essence, hot watery infusion

and liniment. Besides, it is used at cure of burns, wounds, ulcers, for gargling of mouth cavity and throat, at angina, stomatitis, duodenal ulcer and stomach ulcer, gastritis, liver and gall canals diseases, at cordial diseases followed by rhythm violation, rachytis, furuncles, herpes, warts, callosities, phlebitis diseases, dislocations, eye diseases, frost-bites.

***TUSSILAGO FARFARA* L.** On the medical purposes its flower group and leaves are used. Its leaves are manually collected in the middle of spring months. Leaves and flowers contain secretion, tanning agents, essential oils, inuline, dextrine, saponins, ascorbic acid, apple acid, vinegar acid and the most significant effective substance – bitter glucoside-tussilage. In the folk medicine its leaves infusion is used at stomach and guts tract, inflammation of kidney and bladder, inflammation of respiratory catarrh and lungs, also as an expectorant. Its fresh juice mixed with sugar is used lungs tuberculosis. Besides, its fresh leaves and water obtained by pressing the leaves are externally used at cure of festering wounds, ulcers, cracks. It helps much at hair-fall and scab on the head-skin and scurf; it gives fine results when mixing it with stinging nettle infusion and washing hairs 3-times a week.

***TARAXACUM OFFICINALE* WIGG.** On the medical purposes its root and surface part are used. The root contains bitter substance, inuline, sugar, triterpene compounds, sterols, palmitine, olein, fat oils consisting of glyceridlinol acids, protein substances, caoutchouc, sign of essential oil, carotene, secretion and tanning agents. Its pericarps and leaves contain vitamins C, B₂, choline, nicotin acid, saponins, protein, ferrum, calcium, manganese, phosphorus elements, lutein, taraxantin, triterpene spirits. In folk medicine it is used to improve appetite, release gall, and as a purgative, calming, somnolent and expectorant. Bioactive substances containing it strengthens peristaltics of guts, on the result

fermentation and suppuration processes get reduced. Besides, it is used at chronical colitis, exema, frunculioz, cleaning of pygment spots; Its oily infusions are used at cure of burns, dermotic diseases, profilactics of malaria, anemia, bladder and kidney diseases and reumatism. Its thick extraction, broth, oily infusion, fresh juice and milk are used.

ACORUS CALAMUS L. On the medicinal purposes its rootstocks are used. The rootstock contain yevgenol, borneol, camfora, camfen, essential oils consisting of pynene, acoron glucoside, calyamen alcaloid, vitamin C, tanning agents, secretion, fytoncids, starch; and its leavs contain essential oil and tanning agents. *Acorus calamus* is used in medicine in boild, infusion, extraction and powder states. In medicine it is used to improve appetite, digestion improvement, release gases out of guts, enc-rease the tonuse of the central nervous system, as an expectorant, to release gall and diuretic; its spirit fluid is used to wash festering wounds, ulcers and diarrhea. In folk medicine it is used as a fine bactericide and insecticide means. During grippe epydemy it is required chewing this grass to privent the disease.

FUMARIA OFFICINALIS L. On the medicinal purposes its surface part is used. *Fumaria* L.fumitory contains several necessary alcoloids (protopin, cholidonin, sangvinarin et al), fumar acid; and its leavs contain 240-370 mg/% vitamin C. In the scientific and folk medicines its infusion, tincture and spirit fluid extraction are used at avitaminosis, stomach and gut diseases, swelling, meteorism, aenemia, jaundice, as a blood reduction at bleedings, to improve appetite. Delivery of fumitory plants spread in Azerbaijan and use on medicinal purposes is necessary.

VERBASCUM DENSIFLORUM BERTOL. On the medicine purposes its petals are used. They contain saponins, essential oil, secretion, tanning agents, sugar, flavonoids, dye/colouring subs-

tances, coumarins, vitamin C and caratinoids. In the scientific medicine it is used as a medicinal means for breast-softening, anti-inflammation, weak purgative; at herpes, exema, whooping cough, bronchitis, bronchial asthma, stomach and gut diseases; as anesthesia, anti-cramp, contracting and curtailing substances at pulmonary diseases and pleuritis.

ASPARAGUS OFFICINALIS L. It contains coumarin, sugar, saponins, asparagin, carotine, vitamin C, capsantin, fizalin, iodine fat oil, starch, tanning agents, signs of essential oils, flavanoids and chelidon acid. *Asparagus officinalis* is mainly used on the diuretic purposes in the nature. Besides, its watery infusion and spirit extraction improves liver fuction, effects onto heart's activity – strengthens heart contraction, slows its rythm, improves digestion as well as it is used at reumatizm, diabetis, pulmonary diseases, whooping cough, as an expectorant, reducing a high temperature, at kidney pains, bladder inflammation and epilepsy.

VACCINIUM MYRTILLUS L. On the medical purposes its berries and leavs are used. Its leavs contain glucosides: arbutin, flavanol; hidroxinon, erisinol, ericolin, lots of tanning agents, various acids, vitamin C, phytoncids, saponins; its fruits contain about 20-22% sugar, organic acids, pectine, tanning agents, vitamins, glucose and fructose, lemon acid, apple acid, a little vinegar acid and lots of kalium-permanganat (KMnO_4 -manganese). Arbutin has got a very strong anticeptic and disinfectioning effects; at the same time it regulates carbohydrat exchange in the organism, reduces amount of sugar in the blood. In the folk medicine its leavs are used in a boild state as diuretic, at night enuresis, reumatizm, form changing of joints. *Vaccinium myrtillus* wortleberry tea and its additives are used at gastiritis, chronical tonzillit and stomatits. Its fruits are used at vascular brittleness, small haemorrhages, gastiritis occured on the result

of acidity defficiency. The boiled dry fruits, watery infusion, kissel and jam of its matured fruits are used at keen and chronical violations of stomach and guts, children's diarrhea, enterocolit and dysentery.

VACCINIUM VITIS IDAEA L. On the medicinal purposes its leavs and ripened fruits are used. The leavs are collected before blossoming or in the early spring from the under snow. But the fruits are collected when they get matured. Cowberry (*Vaccinium vitis idaea*) has been spread in the forests and foot-hills of Great and Small Caucasus. Its leavs contain glucosids, arbutin, flavanol, hydroxinon, ericolin, lots of tanning agents, gallic acid, ellagon acid, chinic acid, tartaric acid and vitamin C; the ripened fruits contain about 7% sugar, glucose, fructose, lemon acid, apple acid and benzoic acid, a few amount of wine acid, tanning substances, a lot of cellulose, vitamin C, sign of carotine and mangan. Leavs of Cowberry (*Vaccinium vitis idaea*) have got the following effects: diuretic, antiseptic and contracting. And its ripened fruits are used to release worms and as anti-scurvy. In the folk medicine its leavs are used at liver diseases, hypoacid gastritis, joint form of reumatizm; its watery infusions are used at night enuresis. Watery infusions of its fruits are appointed for cooling drinks when thirsty, at fever and as a weak purgative. Its fresh fruits are applyed at diarrhea and as a diuretic. It can render even a negative effect onto kidneys in big doses.

HUMULUS LUPULUS L. Its bolls are used on the medicinal purposes. The bolls contain dye/colouring and secretion substances, chomulin alcoloid, bitter and fat substances, resin substances, organic acids, tanning agents and carotine. In medicine hop (*Humulus lupulus*) bolls are used as spasmolitic, anesesthesia and calming means of nervous system. Its watery infusion of 10:200 ratio is used as calming and somnolent

preparations. Its powder and spirit infusion are internally used to improve appetite. Besides, it is used as an anti-inflammation means at cystitis (diuretic), anti-cramp. And in the folk medicine hop (*Humulus lupulus*) infusion is used at gastritis, at worm invazias, at cystitis, iurethritis and as hair strengthening means.

HIPPOPHAE RHAMINOIDES L. One of the plants used in Azerbaijan as a medicinal one is Sea-Buckthorn (*Hippophae rhamnoides*). Oils obtained of its fruits are used at the most difficult closing up wounds and burns. Since 1972 first in Azerbaijan 65 wild forms of the Sea-Buckthorn have been achieved and were commenced to research at the Institute of Genetics and Selection (present Genetic Resources Institute) of the Azerbaijan National Academy of Sciences. The plant is a valuable food and medicinal means. After proving that Sea-Buckthorn contains the major vitamins on the result of chemical analysis of Sea-Buckthorn fruits the interest onto this plant has increased much more and scientists began to call it a tree of "Polyvitamins". Juice output and amount of oil, carotinoids and vitamins in its content is higher than the standard. Amount of oil in the content of fruit is 3,5-8,6%. Perspective forms also have been grown in the content of which amount of oil is 11,6%. At the same time according to quantity of its vitamin C it comes after dog-rose; according to quantity of its carotins it comes after carrot. It occupies the 2nd place after ginseng as a general strengthening means. As the amount of unsaturated oil acids in the content of its fruits are high enough its juice and oil can be used like a strategic product – *radioprotektor*. Some substances in its content can be used at closing up poisonous and toxic bullet wounds. At present research activities are being carried out on the direction of production of economical products, preparations and essences of medical significance on the base of the fruits wasteless technology. Technologies for production of pure Sea-Buckthorn oil and liquour have been worked out. Accli-

matization of Sea-Buckthorn into different ecological environment is being carried out on the purpose of soils' erosion protection, recultivation, restoration contaminated on different grades and planting of greenery as well as food production.

***GRAMMOSCLADIUM PLATYCARPUM* BOISS. ET HAUS-**

SKN. There is information concerning to its availability in Caucasus – Near Caucasus, Garabagh and the Nakhichevan AR.

It is a caucasian endemic plant being its sole spreading area in the Nakhichevan AR at present. Its essential oil is mainly accumulated in its seeds (1-2,34%). Essential oil is in the surface part of the plant too (1- 78%). Accumulation dynamics of the oil in the plant changes depending on the maturation of seeds. About 7% of oil's main content are essences, 83,1% spirits, 76,5% are independent spirits but phenols are 0,05%. Acid number is 1,2-1,3; essence number is 20,5-35,45; afterwards acetylation essence was 238-249.

During the carried out researches it was ascertained that this oil is active against several viruses and bacteria. It has got an antioxidant property that provides food conservation and saving them. Taking into account all of these and availability of a specific aroma in the content of the plants it is reasonable to conclude everyone can use this oil in both tea production and confectionary production. Essential oil of caropodium liquidates discomfort in digestive diseases; it releases flatulence and makes digestion better. It's enough adding a drop of essential oil to the food. Also upper part of Caropodium can be added into soup by milling together with seed. It would give a good aroma to the meal and liquidate alimentary canal disorder periodically met among soldiers.

***MELISSA OFFICINALIS* L.** It has naturally spread in Great Caucasus and Talysh zones of the Republic. It is cultivated in the private plots of our regions. Lemon and amber acids, about

5% tanning agent were found. 0,08-0,1% essential oil has been obtained from its surface part. Acid number was – 3,54; essence number – 19,4; after ascetillation essence number – 152,3. It is well dissolved (1:7) in the 90% spirit, when amount increases it sharply grows turbid. The main content of oil is cytral – 60%, besides, there are citronellal – 5%, mirsen, heraniol cineol et al. The plant and the essential oil obtained of it are fine-smelled and they have got a bactericid property. A wide range of these specifications use is being demanded in canned production. It prevents spoiling and there is no negative effect.

Espesially taking into account that Azerbaijan is a Country in the war situation everyone should know the necessity of use of canned food, teas, cooling beveradges in kitchens of military colledges, guards produced by means of essential oils and essential oil plants.

Besides, certain medicinal teas were made by using essential oil plants. Natural resource of the collected plants in the wild has been studied. During the experimental researches the plants with abonden resource have been widely used, more than 50 plant teas were prepared, as well as these additives were added into black and green Azerbaijan teas.

At first teas with ecologically pure plant additives were tested for diabetics. Here mainly laurel leaf, cornel, berberis and dog-rose/hips were used and new tea articles in the below-mentioned content were presented for production by adding them black and green teas.

Laurel tea: 1. Laurel leaf – 50gr and green tea – 50gr. Use of this tea as “tea bag” is more cosidereble.

2. As a dayli rate by adding 500ml hot water and 2-3 spoonful green tea onto 20 pieces of laurel leaf and holding it on fire for some 10-15 minutes an extraction is ready for use. It is possible to keep stable amount of sugar in the blood by means of these teas.

Berberis vulgaris tea: every diabetic can use a dayli tea rate through preparation a mixture of: *Berberis vulgaris* fruit – 25gr, laurel leaf – 10gr, black tea or green tea – 65gr. In this case green tea is more significant because its bitter taste deletes sourness of *Berberis vulgaris* in the extraction.

Dog-rose/hips tea: every day it can be drank a mixture of: hips – 20gr, laurel leaf – 10gr, *Berberis vulgaris* fruit – 10gr, black tea or green tea – 60gr through brewing/scalding.

Cornel tea: every time it can be drank a dayli tea norm through preparation a mixture of: cornel cherries – 20gr, *Berberis vulgaris* fruit – 10gr, laurel leaf – 10gr, black tea or green tea – 60gr.

Diabetic tea with herbal extraction: haricot – 20gr, *Hypericum perforatum* L. – 8gr, cornel cherries (released of its stones) – 8gr, Inula L. – *Inula helenium* L. root – 8gr, *Rosa canina* L. – 8gr, stinging-nettle grass – 8gr, Horstail – 8gr, *Sambucus nigra* – 8gr, tea – 24gr (green tea or black tea) can be drank as a dayli tea norm.

The produced teas were microbiologically researched and no contra-indication for human organism has been observed. During researches the activities carried out in the Scientific and Research Department 'Azersun' positive factors that could naturally and ecologically affect these teas to human have been proved as well as it was proposed to take appropriate measurements for its production.

Other researches are the "Form" teas that effect to liquidate abundaned fats accumulated in human organizms which was offered for production. These teas have also been prepared in the Scientific Research Department 'AZERSUN' holding. A new stage of ecologically pure phyto-tea production source of which is known and made of the Azerbaijan natural plant resources was presented. Production of more than 50 articles of herbal teas is planned. Qualitative and rational herbal tea products have been

produced based on broad scientific sources and recommendations of scientists with big experiences. In the phyto-tea preparation herbs experienced in folk medicine and mainly accessed into pharmacopy were used.

Apple tea: cut apple fruit – 20gr, stinging-nettle leaf – 10gr, *Rhamnus* L. buckthorn root – 10gr, senna leaf – 10gr, *Polygonum* L. – 10gr, Horsetail – 10gr, Cornhair – 10gr, green tea – 20gr. This tea reduces appetite, releases slags and toxins out of body, regulates alimentary canal, dissolves fats entered into body by food.

Rose tea: Rose-petals – 20gr, stinging-nettle leaf – 9gr, *Rhamnus* L. buckthorn root – 9gr, Cornhair – 9gr, senna leaf – 15gr, Horsetail grass – 9gr, *Polygonum* L. – 9gr, green tea – 20gr. It reduces appetite, releases slags out of an organism, restores vitamin balance, regulates metabolism organism.

Lemon tea: Lemon peel – 24gr, senna leaf – 8gr, *Rhamnus* L. buckthorn root – 8gr, Cornhair – 8gr, stinging-nettle leaf – 8gr, Hoarstail grass – 8gr, *Polygonum* L. – 8gr, *Rubia tinctorum* madder – 8gr and green tea – 20gr. Natural essential oil obtained of lemon peel also was added into this extraction.

Stinging-nettle tea: Stinging-nettle leaf – 35gr, *Rhamnus* L. buckthorn root – 10gr, Cornhair – 10gr, senna leaf – 15gr, *Polygonum* L. – 10gr, Hoarstail – 10gr, green tea – 10gr. This tea reduces appetite, releases slags and toxins out of organism, dissolve fats, strengthens body. Daily use is recommended to normalize weight.

Dog-rose/hips tea: hips – 52gr, orange peel – 12gr, Cornhair 12gr, *Echinacea purpurea* Moench grass – 12gr, green tea 12gr. There are vitamins: C, B₁, B₂, B₉ and P, organic acids and mikroelements: Ca, Mg, K, Fe in the content of this tea. Makes metabolism better, helps to seem healthy and fine. Releases organism of excessive oil and fat.

Quince tea: quince leaf – 40gr, rose-petal – 5gr, Cornhair – 5gr, Cornhair – 10gr, Hoarstail grass – 10gr, *Tilia* lime, linden –

10gr, green tea – 20gr. This tea is also usefull as the other ones especially it reduces appetite, releases slags out of organizm and regulates metabolizm in the organizm.

These herbal teas tested by physicians and scientists have got the folloving properties:

- Production and use are easy;
- Herbs and fruits in its content are possible to get;
- It may be drank several times during a day;
- Everybody can prepare it for himself;
- It is possible to arrange its trade easily as plants cotained

it are accessed into the National Pharmocopy.

Plant teas of known sources which have got enough resources in the Azerbaijan flora or are massively cultivated in agrophytocenoses are very useful for human use from the both medical and ecological points of view. Structure and content of the plants added into these teas have been periodically studied by world scientists and based on it ecoprotective effect of its use was attracted at present.

Tərcümə etdi: Məhəmməd Nəcəf-zadə

Istifadə olunmuş ədəbiyyat

1. Azərbaycanın faydalı bitkiləri. Bakı, Изд. Элм 1971, 185s.
2. Vəliyev I. Kütləvi tibb ensklopediyası. Bakı: 2000, 429 s.
3. Qasimov M.Ə. Azərbaycanın ədviyyat bitkiləri. Bakı: Azər. Döv. nəş. 1992, 174 s.
4. Qədimov Ş. Şəfa ensklopediyası. Bakı: 1997, 335 s.
5. Quliyev Z. Azərbaycanın zəhərli, zərərli və dərman bitkiləri. Kirovabad: 1970, 40 s.
6. Dəmirov I. Şəfalı bitkilər. Bakı: 1971, 95 s.
7. Dəmirov I. Tərəvəz bitkilərinin müalicə əhəmiyyəti. Bakı: 1974, 14 s.
8. Dəmirov I., Bağirov R. Azərbaycanın faydalı dərman bitkiləri. Bakı: Azərnəşr, 1969, 112 s.
9. Dəmirov I.A., Islamova N.A., Kərimov Y.B., Mahmudov R.M. Azərbaycanın müalicə əhəmiyyətli bitkiləri. Bakı:Azərnəşr, 1988, 175 s.
10. Dəmirov I.A., Manafov Ə.B., Islamova N.A. Formakoqnoziya. Bakı: 1984, 263 s.
11. Dəmirov I., Hüseynov D. Bitkilər və təbabət. Bakı: Gənclik, 1992, 126 s.
12. Dəmirov I.A., Şükürov C.Z. Bitkilər və sağlamlıq. Bakı: 1976, 44 s.
13. Dəmirov I.A., Şükürov C.Z. Azərbaycanın dərman bitkiləri. Bakı: Azərnəşr. 1976, 124 s.
14. Dəmirov I.A., Şükürov C.Z. Dərman bitkiləri. Məktəblilər üçün vəsait. Bakı: Maarif, 1979, 108 s.
15. Dəmirov I.A., Şükürov C.Z. Abşeronun şəfaverici inciləri. Bakı: Elm, 1981, 72 s.
16. Dəmirov I.A., Şükürov C.Z. Azərbaycanın meyvə və tərəvəz bitkilərinin müalicə əhəmiyyəti. Bakı: Maarif, 1990, 190 s.
17. Əliyev N. Azərbaycanın dərman bitkiləri və fitoterapiya. Bakı: Elm, 1998, 343s.
18. Əliyev R.K., Dəmirov I.A. Dərman bitkiləri. Bakı: Azərnəşr, 1954, 312 s.
19. İbadullayeva S.C. Baldırqan (*Heracleum* L.) bitkisinin tibbi əhəmiyyəti. "Müasir ekoloji əraitdə infeksiya-parazitar xəstəlik-

lərin diaqnostika, müalicə və profilaktikasi” Probleminə həsr olunmuş beynəlxalq konf. mat”. Bakı: 2000, səh.74.

20. İbadullayeva S. C. Çətirçiçəklilər fəsiləsinin faydalı bitkiləri. Bakı: Araz nəş. 2001, 147 s.
21. İbadullayeva S.C. Azərbaycan florasının Kərəvüzkimiləri. Bakı: Elm 2004, 321 s.
22. İbadullayeva S.C. Kərəvüz fəsiləsinin dərman bitkiləri. Hepar Elmi praktiki j. N3, 2006, səh. 16-31 .
23. İbadullayeva S.C., Cəfərli İ.Ə. Efir yağları və aromaterapiya. Bakı: Elm, 2007, 116 səh.
24. İbrahimov H.H., Əliyev N.I., İbrahimova S.A. Adi boymadərən və onun efir yağının antimikrob təsiri. Sağlamlıq (elmi -praktik j.), Bakı, 1997, №2, 44- 46 s.
25. İsmayılov Ə., Dəmirov İ. Azərbaycanın dərman bitkiləri. Bakı:1959, 60 s.
26. İsmayılova Z.M., Həsənov M.I. Azərbaycan Qərb Zonasında yayılan dərman bitkilərinin bioloji müxtəlifliyi. Azərbaycan MEA Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri, XXV cild. Bakı: 2004, 419-422 s.
27. Məhəmməd Yusif Şirvani. Tibbnamə. Xalq təbabəti. Məlumat kitabı. Bakı: Işıq nəşr, 1990, 191 s.
28. Məmmədova S.E. Azərbaycan florasında pediatriyada istifadə olunan dərman bitkiləri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Respublika elmi konfransının materialları, «Biologiyada inkişaf və müasirlik» mövzusunda. BDU: 2004, 213 s.
29. Məmmədova S.E. Pediatriyada istifadə olan dərman bitkiləri florası və onun analizi. Azərbaycan MEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, XXV cild. Bakı: 2004, 410-412 s.
30. Mehdiyeva N.P. Azərbaycanın dərman florasının biomüxtəlifliyi. Bakı, "letterpress" nəşr, 2011, səh. 188.
31. Mustafayev İ., Qasımov M. Azərbaycanın faydalı bitki sərvətləri. Bakı: Azərnəşr, 1992, 245 s.
32. Novruzov V.S., İsmayılova Z.M., Məmmədova S.E. Azərbaycan florasının narkotik tərkibi, növləri və istifadə olunma perspektivləri. Az.MEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzin «Xəbərlər» məcmuəsi, № 4. Gəncə: 2001, 128s.

33. Xalq təbabəti xəzinəsindən. «Azərbaycanın ensiklopediyası». Bakı: Poliqraf Birliyi, 1992, 223 s.
34. Rzayev C.Ə. Sarımsaq. Bakı: Azərnəşr, 1983, 50 s.
35. Rzazadə R.Y. Azərbaycanın dərman bitkiləri. Bakı: 1942, 50 s.
36. Абу Али Ибн Сина. (Авиценна) Канон врачебной науки Изд. 2-е Ташкент: изд. 2-е «ФАН», 1980, 210 с.
37. Агамалиев Т.С. Боярышник как антиаритмическое средство при мерцании предсердий: Научн. Труды, посвящ. 50-летию образ. АМИ, Баку: 1981, 257-258 с.
38. Алекперов Ф.У. Сравнительный анализ лекарственных растений средневекового (XIII-XVIII в.в.) и современного Азербайджана. Баку: 1992, 55с.
39. Алексеев Б.Д. Лекарственные растения Даг. Махачкала. 1971, 140 с.
40. Алтымышев А.А. Прикладные целебные средства. Кыргызыстан. 1985, 336 с.
41. Афанасьева Л.Ф. и др. Зеленая аптека. Сред. Урал. Свердловск. 1981, 159 с.
42. Альбом лекарственных растения. Универсальный справочник. Москва: 2003, 256 с.
43. Амирова Г.С. Солодка в Азербайджане. Баку: «Елм», 1993, 104 с.
44. Аммосова М.М. «Матьмачеха» как отхаркивающее. Тр. мед.инст: т. X 1951, 245-249 с.
45. Аничков С.В. Атлас лекарственных растений СССР. Ред. Н.В.Цицин, М.: Медгиз, 1962, 140 с.
46. Асенов И.И., Никонов С.Д. Фармакогнозия. София, 1988, 468 с.
47. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М.: 1983, 340 с.
48. Алимбаева П.К. Лекарственно-растительное сырьё Киргизии, применяемое в практической медицине. Фрунзе: «Илим»: 1982, 30 с.
49. Алуф М.А., Лейбман Б.Я. и Ивенский Я.Г. Лекарства растительного происхождения: Справочник для врачей и студентов (с рецептурой). М.: 1943, 107 с.

50. Бажецкая А.А., Шабаета Г.А. Полезнае растеня Киргизии (лекартсвенные). Фрунзе: Кыргызстан, 1983, 124 с.
51. Баймаков Н.Ф. К вопросу о действии шалфея при поте. «Врач. газ.», 1904. №23, 693-695 с.
52. Балов А.В. Целебные свойства крапивы. «Фельдшер», 1901, №14, с. 407-408.
53. Бараненко С. Подорожник (*Plantago ovata* Forcjh.). «Фармакия», 1941, №4, с. 41-43.
54. Батрак Г.Е., Попова Е.В. Новые лекарственные средства растительного происхождения. Госмедиздат УССР:, 1959, 160 с.
55. Безруков А. Черемуховая настойка против паноса. «Вет. фельдшер», 1903, №12, 51.
56. Бекетовский Д.Н. Введение в изучение лекарственных и ароматических растений. М.: Сельхозгиз, изд. 1937, 140 с.
57. Бернацкий А.А. Лекарственное, пищевое и кормовое значение рябины и некоторых других представителей нашей лесной флоры. «Звезда Вытегры», 1919, № 69, 24, IX; № 70, 26, IX.
58. Бессчетов В.П. и др. Облепиха. Шиповник. Черноплодная рябина. Алма-Ата: Кайнар, 1989, 236 с.
59. Благовещенский А.И. Лекарственные растения пастбищ Узбекистана. Ташкент: Мехнат, 1989, 134 с.
60. Блинков И.Л. Лекарственные растения в клинике. М.: Знание, 1983, 63 с.
61. Блюхер Л.Б., Колоскова Т.И. Лечебное применение лекарственных растений. Санкт-Петербург «Руди-Барс», 1992, 377 с.
62. Большая медицинская энциклопедия. М.: Медгиз, 1961, т.XV, 461 с.
63. Большая энциклопедия народной медицины. Изд.АНС, Олма Пресс, 2005, стр. 782-827.
64. Ботаника-фармакогностический словарь. / Под ред. Блиновой К.Ф. и Яковлена Г.П. М.: Высшая школа, 1990, 270 с.
65. Брюхоненко С.С. Отечественные лекарственные растения. М.: 1948, 212 с.

66. Букин В.Н. Шиповник природный концентрат витаминов. Бюлл. Всесоюзн. Акад. с.-х. наук им. Ленина, 1936, №1, с. 25-27.
67. Бурейко В.В. Роль лекарственных растений в лечении болезней. Саратов: 1912, 26 с.
68. Вандышева В.И., Юсупова А.А. Однолетние лекарственные растения в культуре. Фрунзе: «Илим», 1978, 44 с.
69. Варлаков М.Н. Лекарственные средства тибетской медицины. Бюлл. НИХФИ, 1931, №2.
70. Варлаков М.Н. О растительных кровоостанавливающих средствах. «Фармация», 1943, №1, 31-35 с.
71. Васильев В.Ф. Лекарственные растения Воронежской области, их сбор и применение. Воронеж: 1944, 68 с.
72. Васильев И.В. Лекарственные растения. М.-М.: 1931, 87 с.
73. Васильев С.М. Лечение земляникой (материалы к диетотерапии). Юрьев: 1901, 130 с.
74. Васильева В.Д., Шретер А.И. Современное состояние и перспективы химического изучения и медицинского использования барбарисов флоры СССР /В кн: Сб. научн. работ Всес.науч. -исслед. ин-та лек. растений. 1970, вып 1.
75. Васильков Б.П. Критический обзор новейшей литературы по сбору и заготовке дикорастущих лекарственных растений. «Природа», 1944, №3, 92-96 с.
76. Вережбицкий Т.И. Некоторые лекарственные растения, употребляемые простым народом Курской губернии. «Живая старина», 1898, № 3-4, т. VIII, 409-420 с (Отд.2).
77. Виноградова Т.А., Гажев Б.П. и др. Практическая фитотерапия. М.: Олма-Пресс, 1998, 117 с.
78. Воейков Л.Л. К фармакологии лекарственного растения девясила (*Inula helenium* L.). Изв. Акад. наук Казахск. ССР, № 91, серия физиол. вып.3, 1950, 106-124 с.
79. Выходцев И.В. Новые дикорастущие лекарственные растения Киргизии. Фрунзе: 1947, 98 с.
80. Волкова П.А., Долгова А.А. и др. Дикорастущие лекарственные растения Московской области. М.: 1963, 108 с.

81. Володарский Л.И. Практическое руководство по сбору и заготовке дикорастущих лекарственных растений. М.: Медгиз, 1959, 165 с.
82. Воробьев Р.Н. Питание и здоровье. М.: Медицина, 1990, 210 с.
83. Востоков В. Тайны тибетской медицины. Д.: Сталкер, 1999, 240 с.
84. Вульф В.В., Малеева О.Ф. Мировые ресурсы полезных растений. Справочник. – Л. : Наука, 1969, 564 с.
85. Гагельский И.Н. Растения здоровья и бодрости. Киев: 1990, 64 с.
86. Гаджиева Г.Г. Содержание витамина С и каротина в шиповниках, произрастающих на южном склоне Большого Кавказа (в пределах Азербайджанской ССР). «Изв. АН Аз ССР, сер.биол.», 1968, № 4.
87. Гаммерман А.Ф. и Шасс Е.Н. Карты распространения важнейших лекарственных растений СССР. Изд. АН СССР, 1954, 102 с.
88. Гаммерман А.Ф. Курс фармакогнозии. Л.: Медгиз, 1960, 210 с.
89. Гаммерман А.Ф., Шупинская М.Д., Яценко-Хмелевский А.А. Растения целители. М.: 1963, 230 с.
90. Гаммерман А.Ф. Дикорастущие лекарственные растения СССР. М.: «Медицина» 1976, 288 с.
109. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Яценко-Хмелевский А.А. Лекарственные растения (растения целители). М.: Высшая школа, 1983, 400 с.
91. Гасымов Г.З., Кулиев В.Б., Ибадуллаева С.Д. Дикорастущие пищевые растения в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана по материалам этноботанических исследований. Растительные ресурсы, Санкт-Петербург, вып.2, том 45, 2009, стр.109-115
92. Гарник Т.П.Бухтинская Н.Л., Исакова Т.И. Обзор официального и преспективного лекарственного растительного сырья. Фитотерапия в Украине, 1998, №1.
93. Геворкянц С.А., Педенко М.Е. Возделывание шалфея мускатного. М.: «Колос», 1967, 20 с.

94. Георгиевский В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений. Новосибирск: 1990, 327 с.
95. Георгиевский В.П., Коммисаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. Биологически активные вещества лекарственных растений. Новосибирски: Наука, Сибир.отделение, 1990, 332с.
96. Герман О. Ромашка и полынь. Вестн. садоводства и хмелеводства, № 36, 1894, 208 с.
97. Гольшшенков П.П. Лекарственные растения и их использование. Саранск: 1966, 180 с.
98. Гольшшенков П.П. Лекарственные растения и их использование. Саранск: Мордов, 1982, 311 с.
99. Головки Д.Н., Рожко Ф.М. Сбор, сушка, хранение и упаковка лекарственного сырья. (Справочник). М.: 1950., 212 с.
100. Горен М. Путь к здоровью и долголетию. М.: ПТО СЕЛФ. 1992, 88 с.
101. Городинская В.С. Тайны целебных трав России. М.: 1998, 252 с.
102. Государственная фармакопея СССР. Медгиз: IX изд. 1961, 310 с.
103. Государственная фармакопея СССР. М.: X изд., т. I-XXIX. 1986, 290 с.
104. Государственная фармакопея СССР. XX изд. «Медицина», 1990, 279 с.
105. Гозин А.А., Яснецов В.С. Лекарственные растения Смоленской области. М.: Моск.рабочий, 1991, 223 с.
106. Государственная фармакапея СССР БХ изд., Вып. 1, Общие методы анализа. МЗ СССР, Москва, 1987, 334с.
107. Гринер Б.М. Шалфей лекарственный. М.: 1941, 16 с.
108. Гриффит В. Витамины, травы, минералы и пищевые добавки: Справочник /Пер. с англ. К.Ткаченко. М.: ФАИР-Пресс, 2000, 210 с.
109. Гроссгейм А.А. Лекарственные растения Кавказа. Баку: 1943, 186 с.
110. Гроссгейм А.А. Растительные ресурсы Кавказа. Баку: АН АзССР, 1946, 671с.

111. Гроссгейм А.А., Исаев Я. и др. Лекарственные растения Азербайджана. Баку: 1942, 215 с.
112. Груздев В.Ф. Русские рукописные лечебники. М.: 1946, 72 с.
113. Губанов И.А., Ботманова Н.И. Лекарственные растения Киргизии. Фрунзе: 1963, 140 с.
114. Губанов И.А. Дикорастущие полезные растения СССР. М.: «Мысль», 1976, 564 с.
115. Губергриц А.Я., Соломченко Н.И. Лекарственные растения Донбасса. Донецк: 1966, 160 с.
116. Губергриц А.Я., Соломченко Н.И. Лекарственные растения Донбасса. Донбас: 1990, 278 с.
117. Дамиров И.А. К истории использования лекарственных растений в Азербайджане. Баку: 1970, 37 с.
118. Дамиров И.А., Прилипко Л.И., Шукюров Д.З., Керимов Ю.Б. Лекарственные растения Азербайджана. Баку: 1988, 319 с.
119. Джумагилиева Ф.Д., Турова А.Д. Пищевые и лекарственные растения. Алма-Ата: 1988, 125 с.
120. Демченко Ю.Т., Смирнова А.А., Болотова В.Ц. Противоспалительная активность извлечений, полученных методом двухфазной экстракции трех видов лекарственного растительного сырья. Санкт-Петербург, Раст. Ресурсы, вып.4, 2006, стр.61-70.
121. Долгова А.А., Ладыгина Е.Я., Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии., Москва, Медицина, 1978, стр.20-32.
122. Дубняков К. Лекарственные растения России. Список и краткое наставление к сбору, сушке и сбыту. Миргород: 1915, 32 с.
123. Ерлексов С.А. Руководство по сбору, сушке и сбыту лекарственных растений, дикорастущих в средней полосе России. М.: 1915, 24 с.
124. Ждан-Пушкин Н.С. Полевой хвощ как кровоостанавливающее. «Врач. газ.» № 40, 1902, 77-78 с. (Терапевт отд.)
125. Жохов В.Н., Жохова Е.В. 150 рецептов народной медицины. М.: ИКПА, 1991, 46 с.

126. Жученко А.А. Генетические ресурсы лекарственных и ароматических растений. Сборник научных трудов международной конференции, посвященной 50-летию Ботанического сада ВИЛАР, Москва, 2001, с.8.
127. Задорожный А.М., Кошкин А.Г., Соколов С.Я., Шретер А.И. Справочник по лекарственным растениям. М.: Изд. Лесная промышленность, 1988, 414 с.
128. Закусов В.В. Фармакология. М.: Медгиз, 1960, 210 с.
129. Зарайская Е.Н., Борисюк Ю.Г. К изучению жирных масел плодов тмина и аниса. В кн.: Некоторые вопросы фармации. Днепропетровск, 1956, 167 с.
130. Землинский С.Е. Лекарственные растения. М.:изд. Госмедпромторг, 1928, 215 с.
131. Землинский С.Е. Лекарственные растения, их сбор и сбыт. М.: Снабкоопгиз., 1931, 233 с.
132. Землинский С.Е. Лекарственные растения СССР. М.: 1949, 490 с.
133. Землинский С.Е. Лекарственные растения СССР. М.: 1951, 570 с.
134. Землинский С.Е. Лекарственные растения СССР. Медгиз, 1958, 700с.
135. Ибрагимов Г.Г., Касумов Ф.Ю. Сравнительная оценка бактерицидного эффекта эфирных масел чебреца. Баку: изд-во Красный восток, 1975, 587-589 с.
136. Ибадуллаева С.Д. Эфирномасличные растения сем. (*Ariaceae* Lindl.) зонтичных во флоре Азербайджана. Всероссийский научно-исследовательский Институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), Рос. Акад. Сельск. Наук, Москва, 2001, с.182
137. Ибадуллаева С.Д. Интродукция некоторых пряно-ароматические растений. Материалы X международного симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье», Симферополь, 2001, стр. 272.
138. Ибадуллаева С.Д. Кумарины некоторых видов сем. *Ariaceae* флоры Азербайджана. VI Международная конференция Биоантиоксидант. Москва, 2002. стр.206.
139. Ибадуллаева С.Д. Влияние экологических факторов на

- накопление биологически активных веществ в растениях. IV международная научно-практическая Конференция «Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений, Ульяновски, 2002, стр. 301
140. Ибадуллаева С.Д. Динамика накопления кумариновых соединений и эфирных масел в плодах растений на разных фазах их развития. XII Международного симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье». 2003, Симферополь, с.454
 141. Ибадуллаева С.Д. Интродукция нескольких видов эфирномасличных культур семейства Зонтичных в условия Нахчыванской АР. Спорник научных трудов. Генетические Ресурсы лекарственных и ароматических Растений (ВИЛАР). В 2-Х томах, том 1, Москва, 2004, стр.95-96
 142. Ибадуллаева С.Д. Влияние экологических факторов на метаболизм кумаринов некоторых видов *Heracleum* L. (*Apiaceae* Lindl.) Современные проблемы фитодизайна. Материалы международной научно-практической конф., Белгород, 2007, стр.214.
 143. Ибадуллаева С.Д., А.Ш.Ибрагимов, Г.Ш.Ширалиева, Ф.З. Талыбова. Субальпийское высокотравье Нахчыванской АР и его использование в народном хозяйстве. Бот. журнал, Санкт-Петербург, 2008, №5, стр. 737-743.
 144. Ибадуллаева С.Д., Мовсумова Н.В., Сеидов М.М., Мамедли Т.Б. Структура ценопопуляций и урожайность вида *Daucus carota* L. (*Apiaceae* Lindl.) во флоре Азербайджана. Растительные ресурсы, Санкт-Петербург, №5, 2010.
 145. Ибрагимов Ф.И., Ибрагимова В.С. Основные лекарственные средства китайской медицины. М.: Медгиз, 1960, 412 с.
 146. Иванов В.И. Сбор, сушка, хранение дикорастущих лекарственных растений. М.: 1947, 175 с.
 147. Иванова С.Д. Дубильные вещества, сапонины, антраценпроизводные и флавоноиды в лекарственных растениях. М.: 1967, 61 с.
 148. Иванова Г.Н., Сорокина А.А. Легенды и быль о лекарственных растениях. М.: Наука, 1988, 173 с.

149. Иценский Я.Г. Применение растительных лекарственных средств. М.: 1949, 128 с.
150. Израэл Р. Руководство по натуральным лекарственным средствам. Пер. с англ. Д.П.Алексеевой. М.: Крон-пресс. 1996, 193 с.
151. Ильинский В.П. Главнейшие лекарственные растения Волгоградской губернии. 1919, 190 с.
152. Инструкция по сбору и сушке травы и листьев полыни горькой. В сб.: Инструктивные материалы. Вып. 3. М.: Изд. Всес. Конъюктурно-информ. бюро Минздрава СССР, 1970, 76 с.
153. Инструкция по сбору и сушке соцветий ромашки аптечной. В сб.: Инструктивные материалы. Вып. 4. М.: Изд. Конъюктурно-информ. бюро Минздрава СССР, 1971, 93 с.
154. Инструкция по сбору и сушке цветков бузины черной. В сб.: Методические рекомендации и указания по организации, учету и планированию аптечного дела. Вып. 6. М.: Изд. Всес. Конъюктурно-информ. бюро Минздрава СССР, 1972, 79 с.
155. Инструкция по сбору и сушке сырья тысячелистника обыкновенного. // В сб.: Методические рекомендации и указания по организации, учету и планированию аптечного дела. Вып. 6. М.: Изд. Всес. Конъюктурно-информ. бюро Минздрава СССР, 1972, 102 с.
156. Инструкция по сбору и сушке плодов рябины обыкновенной. В сб.: Методические рекомендации и указания по организации, учету и планированию аптечного дела. Вып. 5. М.: Изд. Всес. Конъюктурно-информ. бюро Минздрава СССР, 1973, 94 с.
157. Исмаилов Н.М.Алкалоидоносные растения Азербайджанской ССР. Баку: 1975, 199 с.
158. Исаев Д.И. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Загатальского района (Азербайджан). Растит. ресурсы, 2005, том 41, вып.2, с.73-79.
159. Казакевич Л.И. Дикорастущие лекарственные растения Юго-Востока. В кн: Краткий обзор опытно исследователь-

- ской деятельности Саратовской областной сельскохозяйственной опытной станции. Саратов: 1923, 105-114 с.
160. Казакевич Л.И. Лекарственные растения Сталинградской области. Сталинградское книжное изд.: 1954, 109 с.
161. Калабин И.С. Крапива (*Urtica dioica*) при маточных кровотечениях. «Врач», 1901, №35, 1063-1064 с.
162. Камелин Р.В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. Л.: Наука, 1973, 335 с.
163. Кант К. Фитотерапия. Способ лечения болезней безвредными растениями по основным законам натурального метода / Перевод с 5-го немецкого издания К.П.Александрова. М.: 1913, 165 с.
164. Касумов Ф.Ю., Алиев Н.Д., Аббасов Р.М. Содержание эфирных масел и антимикробное действие некоторых эфиреносов флоры Азербайджана. Изв. АН АзССР, сер.биол.наук, 1977, №4, 72-78 с.
165. Касумов Ф.Ю., Абдуллаев М.И., Исмаилов Н.М., Кязимов И.М. Изучение антивирусного и антибактериального действия некоторых эфирномасличных растений флоры Азербайджана. Симферополь: В Всесоюз. симпозиум, 1990, 176-177с.
166. Касумов Ф.Ю. Эфирномасличные виды рода *Thymus L.* Флоры Кавказа и пути их рационального использования (вопросы ресурсоведения). Автореф. Док. Дисс., 2006, Баку, 49 стр.
167. Катина А. Природная аптека. Москва: «Из-во АСТ», 2000, 304 с.
168. Керимов Ю.Б., Исламова Н.А., Халилов Д.С., Джафарова Р.Э., Сулейманов Т.А., Исаев Д.И., Агаев Э.М. Перспектива использования лекарственного растительного сырья и производства фитопрепаратов в Азербайджане. Баку:1996, 84 с.
169. Киселева В.С., Волхонская Т.А., Киселев В.А. Биологически активные вещества лекарственных растений Южной Сибири. Новосибирски, 1991, 136с.
170. Кириллук Ж.И. Лечение гнойной инфекции препаратами зверобоя и каланхоэ. Вестн.хир., 1977, №9, 112-116 с.

171. Ковалева Н.Г. Дикорастущие отечественные лекарственные растения, применяемые при болезнях почек, почечных лоханок и мочевого пузыря. // «Врач.дело», 1953, №1, 79-80 с.
172. Ковалева Н.Г. Лекарственные растения в фармакопее СССР. Аптечн.дело, т. II, 1953, 48-49 с.
173. Ковалева Н.Г. Лечение растениями. М.: Медицина, 1971, 350 с.
174. Ковалева Н.Г. Лечение растениями. М.: Медицина, 1978, 298 с.
175. Кобзор А.Д. Фармакогнозия в медицине: 1 Клиническая фармакогнозия. 2.Фитотерапия. Киев, 2004, 478с.
176. Ковальев В.М., Павлий О.Н., Исакова Т.И. Фармакогнозия с основами биохимии растений. Харьков, 2000, 704.
177. Коновалова Е.Ю. Флористическое разнообразие лекарственных растений// Фитотерапия, 2005, №3, с.42-45.
178. Козьяков С.Н., Козьяков А.С. Лекарственные ягодные растения. Киев: Урожай,1991, 88 с.Косметические препараты и теоретическое основы современной практической косметики. Пер. с немецкого, Киев, Высшая школа, 1990, 382с.
179. Комаров В.Л. Сбор, сушка и разведение лекарственных растений в России. Справочник. Пг., тип.А.Бенке, 1916, 210 с.
180. Комаров В.Л. Использование крапивы. «Природа», 1917, №1, 105-106 с.
181. Конопля Е.Ф., Николайчук Л.В., Баженова Л.А. Целебно-пищевые растения. Минск: Полымя, 2000, 190 с.
182. Корсун В.Ф. Растения и здоровье. Минск: Наука и техника, 1983, 104 с.
183. Корсун В.Ф., Корсун Э.В., Захаров Ю.А. Лекарственные растения в педиатрии. Изд.«Русский врач», М.:2003,216 с.
184. Котелина Н.С., Маргынченко В.А. Целебные растения Севера. Сыктывкар: Коми кн.изд-во, 1988, 109 с.
185. Котуков Г.Н. Культивируемые и дикорастущие лекарственные растения. Киев: «Наук. дулека», 1974, 175 с.
186. Кудрявцев Д.Г. О боярышнике и шиповнике. Клинич. медицина, т.XIV, №10,1936, 1540-1541 с.

187. Курамысова И.И., Аксенова В.Ф., Татимова Н.Г. Лекарственные растения. Алма-Ата: Кайнар, 1988, 302 с.
188. Куреннов П.М. Знахарские рецепты. Ташкент: 1991, 142 с.
189. Кукес В.Г., Сычев Д.А. Механизма фармакокинетического взаимодействия лекарственных средств и безопасность фармакотерапии / Лекции для практикующих врачей. XII национальной конгресс «Человек и лекарство» Москва, 2004, стр.317-330.
190. Крылова И.Я., Шретер А.И. Методические указания по изучению запасов дикорастущих лекарственных растений. М., ВИЛАР, 1971, с.21
191. Крылова И.Я., Шретер А.И. Методические указания по изучению запасов дикорастущих лекарственных растений. М., ВИЛАР, 1971, с.21
192. Лавренов В.К., Лавренева Г.К. Полная энциклопедия лекарственных растений. Москва: Олма Прес, 1999, в 2 томах, 1980.
193. Лавренов В.К., Лавренева Г.К. Полная энциклопедия лекарственных растений. М.: Олма-Пресс, 1999, 417 с.
194. Лавренко Е. М. Основные закономерности растительных сообществ и пути их изучения. Полевая геоботаника. М., 1959, т. 1, с. 13-75.
195. Левин А.Л. В сб. Фармакотерапия при нарушениях свертывающей системы крови.// Науч.тр. Кубанского мед.ин-та, Краснодар: 1960, 18 с.
196. Лекарственные растения научной и народной медицине. Изд. Саратовского Университета: 1974, 382с.
213. Лекарственные растения (Каталог). М.: Медицина, 1985, 256 с.
197. Лекарственное растительное сырье. МЗ СССР, Москва, 1989, 398с.
198. Лекарственное растительное сырье. Издательство стандартов. Москва, 1980, 299с.
199. Лекарственные растения Азербайджана: Справочник – Баку, Азернешр, 1972, 196 с.

200. Линд А.Э. Лекарственные растения Башкирии. Уфа: 1930, 117 с.
201. Ляликов С.И. Лекарственные растения Молдавской ССР. Кишинев: 1955, 197 с.
202. Малеев В.П. *Pinus L.* – Сосна / В кн.: Деревья и кустарники СССР. т.I, М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949, 1030 с.
203. Малова А.В. К фармакологии чеснока. Фармакол. и токсикол., т.VIII вып.1., 1950, 9-10 с.
204. Мамедова С. А., Мехтиева Н. П., Ибадуллаева С. Дж., Мустафаева С. Дж. Полезные свойства эфирных масел. V Международная конференция «биоантиоксидант». Москва, 1998, с. 3
205. Махлаюк В.П. Лекарственные растения в народной медицине. Саратов: 1964, 210 с.
206. Махалюк В.П. Лекарственные растения в народной медицине. Саратов: 1967, 559 с.
207. Машанов В.И., Покровский А.А. Пряно-ароматические растения. М.: 1991, 285 с.
208. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.:Медгиз , 1960, 49 с.
209. Машковский М. Д. Лекарственные средства. М.: 1977, ч. 2, 560 с.
210. Медведев П.Ф. Крапива СССР. Видовой состав, распространение и использование. М.: 1934, 67 с.
211. Меншикова З.А., Меншиков И.Б., Попова В.Б. Лекарственные растения в каждом доме. Москва: Олма Пресс, 2005, 464с.
212. Мехтиева Н.П. Результаты анализа компьютерной базы данных лекарственных растений Апшерона. Труды Института ботаники Академии Наук Азербайджана, Баку, «Элм», 2006, стр. 316.
213. Методика полевого исследования сырьевых растений. (Кн. ред. М.М.Ильин) М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948, 252 с.
214. Мерклин К.Е. Лекарственные растения русской флоры. Справочная книга для врачей, издаваемая Медицинским департаментом Мин. внутр. дел, кн. 2,СПб,1893, 433-528 с.

15. Миндел Э. Справочник по витаминном и минеральным веществам. Пер. с англ., М.: 1997, 97 с.
16. Музарев М.А. Сбор, заготовка и использование дико-растущих плодов и ягод. М.: 1934, 107 с.
17. Мультиановский М.Н. История медицины. М.: 1967, 75с.
18. Муравьева Д.А. Фармакогнозия. М.: «Медицина», 1978, 264 с.
19. Муравьева Д.А. Фармакогнозия. М.: «Медицина», 1991, 560 с.
20. Муравьева Д.А., Гаммерман А.Ф. Тропические и субтропические лекарственные растения. М.: Медицина, 1974, 310 с.
21. Муравева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Т.П. Фармакогнозия. Москва, Медицина, 2002, 654с.
22. Мусаев С.Г. Злаки Азербайджана. Баку : Элм, 1991, 412 с.
23. Мусаев С.Г., Фаталиев Р.А. Флора Азербайджана: Новые данные. Труды Института Ботаники Национальной Академии Наук Азербайджана. т. XXV, Баку: 2004, 16-22 с.
24. Мустафаева С.Д. Биологические особенности и эфирномасличность видов рода *Achillea* L. флоры Азербайджана: Автор. канд. диссер., Баку, 1989, 24с.
25. Носаль М.А., Носаль И.М. Лекарственные растения и способы их применения в народе. Киев: Здоровья, 1959. 114 с.
26. Носаль М.А., Носаль И.М. Лекарственные растения и способы их применения в народе. Киев: 1960. 192 с.
27. Онтогенетический атлас лекарственных растений. Йошкар-Ола, 1997, с. 1-27.
28. Ошанин М. Полынь. «Сельск. вестн.», №17, 1896, 213с.
29. Ошанин М. Шалфей. «Сельск. вестн.», №11-12, 1896, 129-130 с.
30. Пантюхов И.И. Лекарственные растения южной России. К.: 1869, 39с.
31. Пастушенков Л.В. Растения - друзья здоровья. Л.: Лениздат. 1989, 190с.
32. Пашук А.Ю., Кострикова Э.В., Шрайбер М.С. Лекарственные препараты облепихи. Врач. дело, 1979, №9, 7 с.
33. Першин Г.Н., Гвоздева Е.И. Учебник фармакологии. М.: Медгиз, 1961, 142с.

234. Иименов М. Г. Перечень растений – источников кумариновых соединений. Л.: изд. Наука, 1971, 189 с.
235. Пищальников Е. Шалфей лекарственный. // «Хим. фармац. журнал», 1972, №4, 6 с.
236. Плеханова М.Н. Облепиха. Л.: 1988, 77 с.
237. Покровский А.А. Метаболические аспекты фармакологии и токсикологии пищи. М.: Медицина, 1979, 193 с.
238. Попов Л.П. Лекарственные растения в народной медицине. Киев: Здоровья, 1969, 316 с.
239. Попов В.И., Шапиро Д.К., Данусевич И.К. Лекарственные растения. Минск: Полымя, 1984, 240 с.
240. Попова Н.В., Ильина Т.В., Ковалев В.Н. и др. Лекарственные средств России. Энциклопедия лекарств. Москва, 2000, 1520с.
241. Пояркова А.И. Жимолостные – *Caprifoliaceae* Vent. / Вкн.: Флора СССР. т. XXIII. М.: -Л.: Изд-во АН СССР, 1958, 71 с.
242. Пояркова А.И. Боярышник – *Crataegus* L. / В кн.: Флора СССР. т. IX. М.: -Л.: Изд-во АН СССР, 1939, 44 с.
243. Прилипко Л.И. Растительный покров Азербайджана. Баку: 1970, 194с.
244. Прилипко Л.И. и др. Лекарственно-растительные ресурсы природно-экономических зон Азербайджанской ССР. Баку: 1965, 134 с.
245. Раппопорт Д.М. Лекарственные растительные ресурсы Удмуртии./ Тр.Мед.инст., т. VIII, 1951, 492-500 с.
246. Растительные ресурсы СССР. Л.: Наука, 1984, 470 с.
247. Растительное сырье СССР. АН СССР, БИ. Им. В.Л. Коморова от рас.рес. под. общ.редак. проф. М.М.Ильина, том 2, 19, с.46
248. Рогов А.П. Краткое руководство по лекарственным растениям. М.: Медгиз, 1944, 340 с.
249. Романовский В.Е., Синькова Е.А. Витамины и витаминотерапия. Ростов Н/Д: «Феникс», 2000, 70 с.
250. Российский Д.М. Отечественные лекарственные растения и их врачебное приложение. М.: Медгиз, 1944, 90 с.
251. Российский Д.М. Лекарственные растения в народной медицине./ «Фельдшер и акушерка», 1945, № 7-8, 33-35 с.

52. Российский Д.М. Изыскание и изучение новых тонизирующих и стимулирующих средств из отечественных лекарственных растений. М.: Медгиз., 1947, 65 с.
53. Российский Д.М. Лекарственные растения нашей страны. М.: 1953, 24 с.
54. Руководства по медицине / Под ред. Р. Беркоу /Пер.с англ. М.:1997, 60 с.
55. Рябчинский А.Е. Экологическая эффективность комплексного использования липняков / В кн.: Вопросы рационального использования растительных ресурсов Южного Урала. Уфа: Изд-во Башкирск, фил. АН СССР, 1963, 210 с.
56. Сабатин Е.Ю. Полезные народные медицинские растения (Аджарской АССР). / Блю. Глав. бот. сада., 1950, вып.6, с.85-89.
57. Сацыперов Ф.А. Лекарственные растения России. СПб, 1919, 74 с.
58. Семенова С.Б. Оздоровительные добавки в питании / Справочник. М.: ДеКА, 1998, 144 с.
59. Середин Р.М. Лекарственные растения Дагестанской АССР /Уч.зап. Пятигорск. Гос. Формац. Инст., т.1.Ставрополь, 1952, 23-47 с.
60. Середин Р.М. Лекарственные растения Дагестана. Махачкала: 1961,143с.
61. Серкеров С.В.Терпеноиды и фенолпроизводные растений семейств Asteraceal и Ariaceal, Баку-2005, 331 с
62. Современная фитотерапия / Под ред.В.Петкова, София, 1988, 976с.
63. Соколов С.Я. Фитотерапия и фитофармакология. Москва, Мед.Инфарм.агенство, 2000, 971с.
64. Соколов В. Лечение морковным соком. М.: 1911, 46 с.
65. Соколов С.Я., Замотаев И.П. Справочник по лекарственным растениям (фитотерапия). М.: Медицина, 2-е изд., 1988, 462 с.
66. Соколов С.Я., Замотаев И.П. Справочник по лекарственным растениям. (фитотерапия). М.: Медицина, 1990, 173 с.

267. Суров Ю.П. Биологические основы использования полезных растений Северо-Восточного Алтая. / «Изв.Сибир.отд-ния АН СССР, сер.биол.-мед.наук», 1967, вып. 1-3, 47 с.
268. Суслов М.А., Бугов К.Н., Обидина Е.Ф. Выращивание лекарственных растений на школьном учебно-опытном участке. Ростов: 1987, 59 с.
269. Степанчук Д.С. Тайная мудрость знахаря. Санкт-Петербург МП «Азия» 1992. 117 с.
270. Турова А.Д. Лекарственные растения СССР и их применение. М.: Медицина, 2-е изд., 1974, 424 с.
271. Турова А.Д., Сапожникова Э.Н. Лекарственные растения СССР и их применение. М.: Медицина, 1984, 230 с.
272. Турова А.Д., Сапожникова Э.Н., Вьен Дыок Ли. Лекарственные растения СССР и Вьетнама. М.: Медицина, 1987, 463 с.
273. Федченко Б.А. Лекарственные растения. Л.: 1943, 75с.
274. Флоря В. Лекарственные растения. Кишинев: Картя Молдовенясы, 1975, 150 с.
275. Фурентов Н.К. Лекарственные растения Дальнего Востока. Хабаровск: Хабаровское кн. изд-во, 1972, 398 с.
276. Убашев И.О., Назаров-Рыгдылан В.Э., Батарова С.М. и др. Раны и их лечение в тибетской медицине. Новосибирск. Наука, Сибирское отделение, 1990, 192с.
277. Хашимов Х.Н., Тележенецкая М.В., Шарахимов Н.Н., Юнусов С.Ю. О динамике накопления алкалоидов в *Reganum harmala*. «Химия природ. Соед.», 1971, г.изд. 7-ое, № 3, 60 с.
278. Халматов Х.Х. Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана. Ташкент: изд. АН Узбек.ССР, 1964, с 310.
279. Чектан И.С., Хинкан Т.Н. Растительные лекарственные средств. Киев: Колос. ИТЭМ, 1983, 384 с.
280. Ченцова Т.Ф. Донник (буркун), борьба с ним и его использование. Ростов -на – Дону: Азчерниздат, 1936, 230 с.
281. Чиков П.С. Лекарственные растения. Справочник. М.: Изд.2-е, Агропромиздать, 1989, 428 с.
282. Чижевская В.А., Журба О.В., Бурба К.В. Лекарственные, ядовитые и вредные растения. М.: Изд-во МГАВМиБ, 1999, 62 с.

83. Шалыт М.С. Дикорастущие полезные растения Туркменской ССР. М.: 1951, 230 с.
84. Шанью Ли. Лекарственные растения. Т. VI -VIII. Черновцы: «Митець», 1992, 210 с.
85. Шассе Е.Ю., Варлаков М.Н. Тысячелетник. «Фармация», 1944, №4, 33-35с.
86. Шассе Е.Ю. Фитотерапия. М: изд.АМН СССР, 1952, 216 с.
87. Шретер А.И. Лекарственная флора Советского Дальнего Востока. М.: «Медицина», 1975, 197 с.
88. Шретер А.И., Муравьева Д.А., Пакалн Д.А., Ефимова Ф.В. Лекарственная флора Кавказа. М.: Медицина, 1979, 368 с.
89. Эфендиев И.К. История медицины в Азербайджане. Баку: 1964, 230с.
90. Юдина М.В. Крапива как источник витамина А. Усп. зоотехн. наук, т.3, вып.2, 1937, 223-227 с.
91. Юркевич И.Д., Мишенин И.Д. Лекарственные растения и их применение. Минск: Наука и техника, 1976, 180 с.
92. Яковлев Г.П., Блинова К.Ф. Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов животного происхождения. С.-Петербург, 2002, 407 с.
93. Ярусова Н. Сушеная черная смородина как противоготный витамино-носитель. Вопр. питания, т.3, №2, 1934, 42-44 с.
94. Abrol B.K., L.D. Kapoor. Plant medical. J. II, H.2, s. 128, 1963.
95. Asahara T. A., Sakakibara J., Okuyama T. Planta Medica. 1994, v. 50, N6, p. 488-492.
96. Ibadullayeva S.J. Vegetational characteristios of the types of *Heracleum* L. in the Republic of Azerbaijan. XVI International Botanical Congress s.t Louis, USA August 1-7,1999, p.342/328.
97. Ibadullayeva S.J. Cumarin derivates *Heracleum trachyloma*. Second Balkan Botanical Congress, 2000, Istanbul-Turkey, p.131.
98. Ibadullayeva S.J. Influence of ecological factors to
99. metabolism of coumarins bn *Heracleum* L. (*Apiaceae* Lindl.) species. 50 Years of Phytochemical society of Europa. Abstract, 2007 Cambridje, UK, p. 126
00. Ibadullaeva S.J., Gasimov H.Z., Movsumova N.V., Mammadli T.B. Protection of some rare and dangerous vegetable plants in

- the flora of the Nakhichevan AR. International Journal of Biodiversity and Conservation Vol. 3(5), 2011, pp. 178-183.
301. İbadullaeva S.J. Medicinal plants of Azerbaijan. Diversity, characterization and utilization of plant genetic resources for enhanced resilience to climate change” 2011, Baku, p. 69.
 302. İbadullaeva S.J. About ethnobotanical history of medicinal plants. “Actual problems of use of useful plants”. Materials of International Scientific Conference. 2011, p.14-17;
 303. İbadullaeva S.J. Flora and vegetation of Azerbaijan: ecoprotectif effect of the useful plants. “Actual problems of use of useful plants”. Materials of International Scientific Conference. 2011, p.8-13;
 304. Leclerc H. *Precis de phytotherapie* Paris: Masson, Cie, 1976.
 305. Мамедова Z., İbadullayeva S.C. Antimicrobe characteristics of essential oils of some species of the *Nepeta* L. genus. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5(17), pp. 4369-4372
 306. Marinescu J., Tamas M., Areazu D. et al. *Produs medicamentos cu actiune antiherpedica destinat terapiei dermatovirozelor*. Patent. Pol., N77214, MKI, 61 K35.78, RSX, 1983, N9, p.0185
 307. Rewerski W.C, Ozarowski A. In: *Zioloolecznictwo*,
 308. Susan Curtis. *Essential oils*. “Haldane Mason”, London. 2002, 142 p.
 309. Weiss R.F. *Lehrbuch der Pytotherapie*, IV Aufe. Stuttgart. Hippokrates Verlag:, 1974.

MÜNDƏRİCAT

ÖN SÖZ.....	3
GİRİŞ.....	5
Annab – <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.....	15
Ərik- <i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.....	16
Heyva – <i>Cydonia oblonga</i> Mill.	17
Zeytun – <i>Olea europaea</i> L.....	17
Badam – <i>Amygdalus communis</i> L.	18
Yəndə ağacı – <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	18
Ağ tut – <i>morus alba</i> L.	19
Turş albalı – <i>Cerasus austera</i> (L.) Borkh.	20
Şərq küknar – <i>Pinus silvestris</i> L.	21
Ağ söyüd – <i>Salix alba</i> L.	22
Sallaq tozağacı - <i>Betula pendula</i> Roth.	23
Ağ tozağacı – <i>Betula alba</i> L.	24
Adi palıd – <i>Quercus robur</i> L.	25
Yunan qozu – <i>Juglans regia</i> L.	26
At şabalıdı – <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	27
Ürəkşəkilli çökə – <i>Tilia cordata</i> Mill.	28
Adi ardıc – <i>Juniperus communis</i> L.	29
Şərq tuyası – <i>Thuja occidentalis</i> L.	30
Şərq fıstığı – <i>Fagus orientalis</i> Lipsky.	30
Üzüm – <i>Vitis vinifera</i> L.	31
Nar – <i>Punica granatum</i> L.	32
Limon – <i>Citrus limon</i> Burm.	33
Moruq – <i>Rubus idaeus</i> L.	34
Bozumtul böyürtkən- <i>Rubus ceasius</i> L.	35
Gənəgərçək – <i>Ricinus communis</i> L.	36
Qafqaz quşarmudu – <i>Sorbus caucasigena</i> Kom.	36
Adi quşarmudu – <i>Sorbus aucuparia</i> L.	37
Qarameyvə quşarmudu – <i>Aronia melanocarpa</i> (Minch.).....	37
Adi yasəmən – <i>Syringa vulgaris</i> L.	38
Qara qarağat – <i>Ribes nigrum</i> L.	39

Meşə gilası – <i>Prunus padus</i> L.	40
Çılpaq biyan – <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	41
Beşyuvallı yemişan - <i>Crataegus pentagyna</i> W. Et Kit.	42
Qafqaz yemişanı – <i>Crataegus caucasica</i> C.Koch.....	43
Çaytikanı – <i>Hippophae rhamnoides</i> L.	44
Armud - <i>Pyrus communis</i> L.	45
Qara gəndəlaş – <i>Sambucus nigra</i> L.....	45
Əncir- <i>Ficus carica</i> L.	46
Zoğal – <i>Cornus mas</i> L.	46
Adi zirinc – <i>Berberis vulgaris</i> L.	47
Adi qaragilə – <i>Vaccinum myrtillus</i> L.	48
Mərcəngilə – <i>Vaccinum vitis idaea</i> L.	49
Ağacşəkilli aloe (yüzillik, əzvay) – <i>Aloe arborescens</i> Mill.....	50
İşlədici murdarça – <i>Rhamnus cathartica</i> L.	51
Meşə çiyləyi – <i>Fragaria vesca</i> L.	52
Adi başınağacı – <i>Viburnum opulus</i> L.	53
Qəhvəyi itburnu – <i>Rosa cinnamomeae</i> L.	54
Qızılgül – <i>Rosa damascena</i> Mill.	55
Bataqlıq mərcanı – <i>Oxycoccus quadripetalus</i> Galib.	56
Ovalşəkilli murdarça – <i>Frangula alnus</i> Mill.	57
Adi ayıqulağı – <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.....	58
Qara quşüzümü – <i>Solanum nigrum</i> L.	59
Çin cırlimonu – <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	60
Böyük pıtraq – <i>Arctium lappa</i> L.	61
Adi kasnı – <i>Cichorium intybus</i> L.	62
Şərq küncütü – <i>Sesamum indicum</i> L.	63
Zaqafqaziya kəkotusu – <i>Thymus transcausicus</i> Ronn.....	64
Kəklikotu – <i>Thymus serpyllum</i> L.	65
Acı yovşan – <i>Artemisia absinthium</i> L.	67
Adi yovşan - <i>Artemisia vulgaris</i> L.	68
Üzərlik – <i>Peganum harmala</i> L.	69
Küstüşam – <i>Bryonia alba</i> L.	69
Çaqa – Ağac göbləyi – <i>Inonotus obliquus</i> (Pers.) Pil.....	70
Acılıqotu- <i>Ephedra</i> L.	71

Şərq alması – <i>Malus orientalis</i> Uglitzk.	72
Jenşen – <i>Panax ginseng</i> C.A. Mey	73
Eleuterokokk – <i>Eleutherococcus senticosus</i> Maxim.	74
Dərman gülxətmi – <i>Althaea officinalis</i> L.	75
Gecəvər – <i>Acorus calamus</i> L.	76
Dağ öküzotu – <i>Arnica montana</i> L.	77
Solmazçiçək - <i>Helychrysum arenarium</i> (L.) Moench.....	78
Dərman valerianı – <i>Valeriana officinalis</i> L.	79
Dərman qulançarı (mələçüyd) – <i>Asparagus officinalis</i> L.....	81
Yoncayarpaq menyanta – <i>Menyanthes trifoliata</i> L.....	82
Dəniz kələmi – <i>Laminaria sacharina</i> (L.) Lamour.....	82
Minaçiçəyi – <i>Veronica officinalis</i> L.	83
Qırxbuğum – <i>Polygonum bistorta</i> L.	83
Subibəri - <i>Polygonum hydropiper</i> L.	84
İran qırxbuğumu- <i>Polygonum pesicaria</i> L.	85
Quşdili – <i>Polygonum aviculare</i> L.	86
Hündür andız – <i>Inula helenium</i> L.	84
Dərman xəşəmbülü – <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	89
Tikanlı pıtraq – <i>Xanthium spinosum</i> L.	90
Adi qaraqınıq – <i>Origanum vulgare</i> L.	91
Dızıotu – <i>Hypericum perforatum</i> L.	92
Göyçiçək isitməotu - <i>Centaurea cyanus</i> L.	94
Kiçik isitməotu – <i>Centaurium minus</i> Moench.	95
Dərman gülümbaharı – <i>Calendula officinalis</i> L.	96
Yağıotu – <i>Chamaenerium angustifolium</i> L.	97
Üçyarpaq yonca (qırmızı) – <i>Trifolium pratense</i> L.	98
Dəvədabanı – <i>Tussilago farfara</i> L.	99
Sığırquyruğu – <i>Verbascum thapsiforme</i> Schrad.	100
İkievli gicitkan – <i>Urtica dioica</i> L.	101
Sincanotu – <i>Sanguisorba officinalis</i> L.	102
Dərman zəncirotu – <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	103
Adi quşəppəyi – <i>Capsella bursa - Pastoris</i> (L.) Medik.	105
Bahar xoruzgülü – <i>Primula veris</i> L.	107
Qaz qaytarma – <i>Potentilla anserina</i> L.	108

Düzqaytarma – <i>Potentilla erecta</i> Raeusch.	109
May inciçiçəyi – <i>Convallaria majalis</i> L.	109
Gəvən – <i>Astragalus dasyanthus</i> Pall.	110
Dərman çatılotu – <i>Euphrasia officinalis</i> L.	110
Adi toppuztikan – <i>Echinops ritro</i> L.	111
Dağtərxunu – <i>Tanacetum vulgare</i> L.	112
Böyük bağayarpağı – <i>Plantago major</i> L.	114
Böyrək çayı (ortosifon) – <i>Orthosiphon stamineus</i> Benth.....	115
Tükcüklü damotu – <i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib.	116
Ürək damotu – <i>Leonurus cardiata</i> L.	117
Ayriqotu – <i>Agropyron repens</i> (L.) Pal.-Beauv.	118
Rəvənd – <i>Rheum ribes</i> L.	119
Qaya rəvəndi – <i>Rheum rupestre</i> Litv.	120
Sədo – <i>Ruta graveolens</i> L.	120
Aptek çobanyastığı – <i>Matricaria chamomilla</i> L.....	121
Adi zirə – <i>Carum carvi</i> L.	122
Adi boymadərən – <i>Achillea millefolium</i> L.	123
Üçrəng bənövşə – <i>Viola tricolor</i> L.	125
Ətirli bənövşə – <i>Viola odorata</i> L.	126
Əməköməci – <i>Malva sylvestris</i> L.	126
Üçbarmaq – <i>Bidens tripartita</i> L.	127
Çöl qatırquyruğu – <i>Equisetum arvense</i> L.	128
Adi mayaotu – <i>Humulus lupulus</i> L.	130
Böyük dəmrovotu – <i>Chelidonium majus</i> L.	131
Dərman sürvəsi – <i>Salvia officinalis</i> L.	133
At əvəliyi – <i>Rumex confertus</i> Willd.	134
Ağ ballıbabə (dalamaz) – <i>Lamium album</i> L.	135
Şüvərən – <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	136
Boyaqotu – <i>Rubia tinctorum</i> L.	136
Acıyonca – <i>Coronilla varia</i> L.	137
Üskükotu – <i>Digitalis ferruginea</i> L.	137
Öküzboğan – <i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	138
Balıca – <i>Pulmonaria officinalis</i> L.	138
Ətirşah – <i>Geranium robertianum</i> L.	139

Erkək ayıddöşəyi – <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.)Schott	140
Çöl qatırquyruğu – <i>Equisetum arvense</i> L.	141
Gücotu – <i>Agrimonia eupatoria</i> L.	141
Mavi süsən – <i>Iris germanica</i> L.	142
Dərman şahtərəsi – <i>Fumaria officinalis</i> L.	142
Qara çörəkotu – <i>Nigella sativa</i> L.	143
Qitiqotu – <i>Armoracia rusticana</i> Gaertn et. Mey-Scherb.	145
Qırmızı naz – <i>Genista tinctoria</i> L.	145
Dişqurtlayan – <i>Visnaga daicoides</i> = <i>Ammi visnaga</i> Lam.	146
Qarpız – <i>Citrullus Lanatus</i> L.	147
Dərman badımcanı – <i>Fumaria officinalis</i> L.	148
Bostan kələmi – <i>Brassica oleracea</i> L.	149
Adi qarğıdalı – <i>Zea mays</i> L.	150
Zəyərek – <i>Linum usitatissimum</i> L.	151
Nanə – <i>Mentha piperita</i> L.	152
Vələmir – <i>Avena sativa</i> L.	153
Əkin cəfəri – <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.)A.W.Hill.	154
Bostan şüyüdü – <i>Anethum graveolens</i> L.	154
Adi lobya – <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	156
Adi rəzyana – <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	157
Çöl turpu – <i>Raphanus sativus</i> L.	158
Sarımsaq – <i>Allium sativum</i> L.	159
Soğan – <i>Allium cepa</i> L.	161
Soğan – <i>Allium ursinum</i> L.	162
Çuğundur – <i>Beta vulgaris</i> L.	163
İstiot – <i>Capsicum annum</i> L.	163
Balqabaq – <i>Cucurbita pepo</i> L.	164
Xardal- <i>Sinapis alba</i> L.	165
Pomidor- <i>Solanum lycopersicum</i> L.	165
Əkin kökü – <i>Daucus sativus</i> Roehl.	166
Reyhan – <i>Ocimum basilicum</i> L.	167
Kartof – <i>Solanum tuberosum</i> L.	167
Çəltik – <i>Oryza sativa</i> L.	168
Dərman bədrənci – <i>Melissa officinalis</i> L.	168

AZƏRBAYCANLILARIN QƏDİM XALQ TƏBABƏTİ MÜALİCƏ ÜSULLARI	169
Anemiya (qanazlığı)	169
Angina (boğaz ağrısı).....	169
Aritmiya (ürək döyüntüsü)	170
Arterial hipertenziya (təzyiq)	170
Artrit.....	171
Artroz.....	171
Bronxial astma.....	171
Ateroskleroz.....	171
Bağırsaq qurdlarının (helminthozlar) qovulması.....	172
Baş ağrısı.....	172
Boğaz uru (zob)	173
Böyrəkdaşı xəstəliyi.....	173
Bronxit (öskürmə)	173
Vegetativ damar distoniyası (damar xəstəliyi)	174
Virus hepatiti (qara ciyər xəstəliyi)	174
Qastrit (mədə xəstəliyi)	175
Qəbizlik.....	175
Qrip.....	175
Dəri xəstəlikləri.....	176
Diş ağrısı.....	176
Ziyil.....	176
Zökəm.....	177
Impotensiya.....	177

AZƏRBAYCANLILARIN UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ İSTİFADƏ ETDİKLƏRİ DƏRMAN BITKİLƏRİ.....	178
Ağ ciyər və tənəffüs yolu xəstəlikləri.....	178
Anemiya.....	178
Angina və tonzillit.....	179
Artrit.....	179
Astma.....	179

Avitaminoz və hipovitaminoz.....	179
Bəlgəmgətiricilər.....	180
Bişməcə.....	180
Böyrək xəstəlikləri.....	180
Bronxit.....	181
Çiban (frunkulyoz)	181
Dərinin irinli və müxtəlif xəstəlikləri.....	181
Dəri yaralanmaları.....	182
Dəmrov.....	182
Diatez.....	182
Dizenteriya.....	182
Dispepsiya.....	182
Ekzema.....	183
Enterebioz.....	183
Enurez (gecə)	183
Epilepsiya.....	183
Faringit.....	183
Göy öskürək.....	183
Hemorragik diatez.....	183
Həzmi yaxşılaşdırıcı.....	184
Xolesistit.....	184
Ishal.....	184
İşlədici.....	185
İştahartirici.....	185
Kolit.....	185
Qara ciyər xəstəlikləri.....	185
Qastrit.....	186
Qəbzlik.....	186
Qicolmalar.....	186
Qizilca.....	186
Qizdirmasalıcı, tərəqovucular.....	186
Qizil yel.....	187
Qoturluq.....	187
Qrip.....	187

Qurdqovucular.....	187
Qusma əleyhinə.....	188
Laringit.....	188
Maddələr mübadiləsinə təsir göstərənlər.....	188
Malyariya.....	188
Meteorizm.....	188
Mədə-bağırsaq yolu xəstəlikləri.....	188
Məxmərək.....	189
Mərkəzi sisnir sistemini sakitləşdiricilər.....	189
Orqanizm möhkəmləndiriciləri.....	189
Otit.....	190
Ödqovucu.....	190
Piylənmə.....	190
Raxit.....	190
Revmatizm.....	190
Sarıliq.....	191
Sistit.....	191
Skarlatina.....	191
Stomatit.....	191
Spazmolitiklər.....	191
Şəkərli diabet.....	192
Teniidozlar.....	192
Ürək-qan-damar sistemi xəstəlikləri.....	192
Vərəm.....	192
Virus hepatiti.....	193
Yanıqlar.....	193
Yuxusuzluq.....	193
Zəhərlənmələr.....	193
Ziyil.....	193
UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN	
DƏRMAN BITKİLƏRİNƏ AID RESEPTLƏR.....	194
Ateroskleroz əleyhinə fitoterapiya.....	207
Hipertonik tipli neyrosirkulyar distoniya və hipertoniya	
əleyhinə fitoterapiya.....	209

Neyrosirkulyar distoniyanın kardial tipində aparılan fitoterapiya.....	213
Tənəffüs orqanı xəstəliklərinin fitoterapiyası.....	219
Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin fitoterapiyası.....	223
Xroniki enterkolit xəstəliklərinin fitoterapiyası.....	229
Helmint xəstəliklərinin fitoterapiyası.....	236
Qaraciyər, öd yolları və xroniki pankreatitin fitoterapiyası...	237
Böyrək və sidik yolları xəstəliklərinin fitoterapiyası.....	241
Xroniki pielonefrit və xroniki sistitin fitoterapiyası.....	243
Böyrəkdaşı xəstəliyinin fitoterapiyası.....	246
Oynaq xəstəliklərinin (revmatizm və revmatoid artrit) fitoterapiyası.....	248
Metabolik artrit fitoterapiyası.....	249
Endokrin xəstəliklərin fitoterapiyası.....	252
Zobun (difüz toksiki uyan) fitoterapiyası.....	254

ABOUT ETHNOBOTANICAL HISTORY OF MEDICINAL PLANTS.....	256
--	------------

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT.....	301
--	------------

Azərbaycan Respublikası "TƏHSİL" Mərkəzi

"Borçalı" Nəşriyyat-poliqrafiya Müəssisəsi

Baş direktor: Müşfiq BORÇALI

Nəşriyyat redaktoru: Aysel MƏDƏDLİ

Ədəbi redaktor: Əli ABBAS, Bəhram MEHDİ

Texniki redaktor: Nizami MƏMMƏDZADƏ

Korrektorlar: Aytac MƏDƏDLİ, Xatirə ƏHMƏDOVA

Operator: Leyla QARAYEVA

Dizayn: Etibar OVÇUYEV

Yığılmağa verilib 04.12.2012. Çapa imzalanıb 06.03.2013.

Şerti çap vərəqi 20. Fiziki çap vərəqi 20,75.

Ofset çap üsulu. Əla növ kağız. Sifariş 19. Sayı 200.

Qiyməti müqavilə ilə.

Bakı, Mətbuat prospekti, 529-cu məhəllə,

"Azərbaycan" nəşriyyatı, IV mərtəbə,

"Şərqi səsi" redaksiyası.

E-mail: M-Borcali@mail.ru

Telefonlar: (012) 438-10-95; (040) – 250-25-55 ;

(050) - 322-05-55 ; (055) – 692-05-55.

«BORÇALI»

Bakı-2013